





ROBERT W. CHANLER

Bequest

June 1933



RECUEIL
DE
DIVERS
OISEAUX
ETRANGERS ET PEU COMMUNS
QUI SE TROUVENT
DANS LES OUVRAGES
DE MESSIEURS
EDWARDS ET GATSFORD

REPRESENTÉS EN TAILLE DOUCE
ET
EXACTEMENT COLORIÉS
PAR
JEAN MICHEL SELIGMANN.



Huitième Partie.

A NUREMBERG,
Chez les Heritiers de Seligmann.
1 7 7 6.

277



fol
674
1768
ptie 8-9
CHMRB

P R E F A C E.

On trouvera, dans l'Indroduction suivante bien de choses qui regardent proprement mon Histoire Naturelle, ou qui servent à l'expliquer: mais le lecteur ne doit pas s'y attendre à un ordre régulier; car elle consiste en insinuations & en avis reçus d'amis d'ici, aussi bien que de plusieurs correspondants des pays étrangers, & en pensées ou idées qui me sont venues dans l'esprit en différent temps, & que je n'avois fait que toucher légèrement. J'y ai aussi fait entrer des choses qui n'ont qu'un rapport éloigné à cet ouvrage, & d'autres qui y sont tout-à-fait étrangères; mais je me flate que l'exemple de plusieurs auteurs de réputation, qui m'ont précédé dans ce genre d'écrire, rendra ce procédé très excusable.

Il y a actuellement plus de vingt ans que je traçai le plan de mon Histoire Naturelle des Oiseaux; je l'ai exécuté assez paisiblement, n'ayant point eu de compétiteurs; & je ne vois pas qu'on y ait fait de grandes difficultés, ou qu'on y ait relevé de fautes considérables. Je vois aussi que cet ouvrage s'est répandu dans presque toute l'Europe; car il n'y a point d'Histoire Naturelle des Animaux, qu'on ait publiée depuis huit ou dix ans, dans les pays étrangers, où il ne se trouve cité plusieurs fois. Lorsque mon Histoire des Oiseaux fut achevée j'avois résolu de ne plus rien publier, vû que j'avançois en âge, & que les infirmités me survenaient; mais, voyant que mes amis avoient la bonté de me fournir de nouveaux sujets très curieux, & qu'ils étoient fort empressés d'en voir paroître des figures, je ne pus raisonnablement me refuser à leur importunité: j'ai donc gravé, durant ces neuf dernières années, cent planches, où il y a près de deux cents différents sujets représentés, & comme j'en suis redevable à la bonté & à la générosité de mes amis, je saisis cette occasion pour leur en faire, comme je le dois, mes très humbles remerciements, & leur en témoigner ma juste reconnoissance.

Durant la publication de mon Histoire des Oiseaux, je fus assez heureux pour être honoré de la protection de quatre grands hommes, qui étoient, peut-être, les plus zélés promoteurs des sciences & des arts, qu'il y eût dans ce siècle; mais, hélas! l'inexorable mort me les a tous enlevés dans un très court espace.

Le premier de ces grands Personnages étoit feu l'Illustre Duc de *RICHEMONT*, noble dans son extraction, puisqu'il descendoit de la maison Royale de ces royaumes, mais encore plus noble &

plus grand par les sentiments de bonté de generosité & de magnificence, qu'il avoit dans l'ame. Quoique les postes éminents, dont il étoit revêtu, l'obligeassent à donner son temps aux affaires les plus importantes de l'état, sa porte ne laissoit pas, d'être toujours ouverte aux personnes de genie & de sçavoir.

Le second étoit l'excellent Chevalier Hans Sloane, qui m'a employé, durant un grand nombre d'années, à dessiner & à peindre à l'eau des animaux en mignature, d'après les sujets mêmes, pour augmenter sa superbe collection de desseins exquis faits par d'autres mains, qui sont tous déposés à présent dans le Museum Britannique, pour l'aide & l'instruction de ceux des générations futures, qui seront curieux de l'Histoire Naturelle, & qui voudront l'étudier. Le Chevalier Hans Sloane quitta Londres sur la fin de ses jours, & se retira à Chelsey à sa maison seigneuriale, ou il a demeuré environ quatorze ans, jusqu'à sa mort. Après qu'il se fut retiré à Chelsey, il me pria comme par grace, (quoique sa demande fût réellement un honneur pour moi) de venir lui faire visite toutes les semaines, pour le divertir pendant une heure ou deux, soit en l'informant des nouvelles publiques, ou en lui rapportant ce qui se passoit de particulier parmi ses amis de la Société Royale, & d'autres personnes de genie, plusieurs desquels je voyois toutes les semaines; de sorte qu'il m'arrivoit rarement de manquer à aller boire du café avec lui tous les Samedis, durant tout le temps de sa retraite à Chelsey. Il étoit devenu si infirme, qu'il étoit entièrement relégué à la maison, excepté qu'il ne prit quelquefois l'air dans son Jardin par le moyen d'une chaise roulante. Cette retraite lui faisoit fort souhaiter de voir quelques uns de ses anciens amis, pour s'amuser. Il avoit toujours grand soin, que les voyages, que je faisois de Londres à Chelsey à son occasion, ne me coutassent point de frais, sachant bien que je n'abondoïs pas en dons de la fortune: il calculoit donc à combien pouvoit se monter la depense que je faisois en carosses, en bateaux, ou en quelque autre chose, que mes voyages d'aller & de venir pouvoient occasionner, & il m'obligeoit d'en accepter la petite somme tous les ans, quoique j'eusse autant aimé n'en rien prendre. Durant cette dernière partie de sa vie, il recevoit souvent des requêtes de personnes necessiteuses, appartenant à des familles de gens célèbres, qui avoient été de sa connoissance, & qui s'étoient rendus recommandables par leurs sçavants ouvrages &c. il recevoit constamment ces requêtes, & les consideroit avec attention; & pourvu qu'elles n'exposassent que la verité, il y repondoit toujours par de charitables donations: il me prioit souvent de m'informer du mérite de ceux qui le sollicitoient; & si j'en étois content, il me chargeoit de transmettre sa bénéfice aux affligés. La dernière fois que je le vis, je fus fort surpris de trouver un si excellent homme à l'agonie: ce fut le dixième Janvier, 1753, sur les quatre heures après midi, & il mourut le lendemain à quatre heures du matin. Je restai avec lui plus tard qu'aucun de ses parents; mais enfin je fus obligé de me retirer, la violence de son agonie étant au de là de ce que je pouvois supporter; quoique malgré les douleurs qu'il souffroit, & la foiblesse de son corps, il parut retenir une grande fermeté d'ame. & une entière resignation à la volonté de Dieu.

Le

DES

Le troisième de mes patrons étoit le célèbre *RICHARD Mead*, Docteur en Médecine. Il avoit certainement une grandeur d'ame au dessus du commun, & il méritoit à cet égard le nom de Grand, dans un sens aussi étendu qu'aucun homme de sa condition. Il est mort, aussi bien que le Chevalier *HANS SLOANE*, dans les plus hauts postes de la médecine, où il put parvenir, l'un & l'autre ayant été Médecins Ordinaires du Roi: il est vrai que Mr. *MEAD* n'a jamais été à la tête du Collège des Médecins de Londres, mais c'est parce qu'il l'a toujours absolument refusé; car il a bien été élu à ce poste honorable, mais on n'a jamais pu le persuader de l'accepter: il a toujours contribué, autant qu'il lui a été possible, par ses services personnels, son ample fortune, sa maison, & tout ce qui étoit en son pouvoir, à l'avancement des arts & des sciences, des mécaniques, et, en un mot, de tout ce qui tendoit au bien public & à l'honneur de sa patrie, ou qui pouvoit être de quelque usage à des membres particuliers du peuple parmi lequel il demouroit: bref, sa générosité étoit si étendue, qu'on peut le regarder avec justice comme le bienfaiteur de toute la société; puisque au lieu d'accumuler les grands richesses, que sa pratique lui procuroit, ou d'acheter de vastes possessions, comme il auroit pu le faire aisément, son inclination pour le bien public n'avoit point de bornes, & il s'est contenté de ne laisser après lui qu'une fortune médiocre. Le digne Mr. *ASKER*, Médecin, par une louable vénération pour la mémoire & pour le caractère public d'un si grand patron des sciences &c. a fait faire de lui un magnifique buste de marbre, par un des plus habiles sculpteurs de ce siècle, & qu'on a placé à Londres, dans le Collège des Médecins. Je ne puis m'empêcher, à cette occasion, d'apprendre aux générations futures, que chacun peut voir, dans ce buste, les traits mêmes de Mr. *MEAD*; car moi même, qui connoissois son visage aussi bien qu'un homme du monde, je déclare que ce buste est si ressemblant, que toutes les fois que je le considère, mon imagination est remplie d'une forte idée de l'original. J'avois dans le seul Mr. *MEAD* une famille entière de patrons: son fils, & deux des Médecins Ordinaires du Roi qui ont épousé mes Dames ses filles, & Mr. *MEAD* son frère, sont tous de mes meilleurs amis & protecteurs.

Mr. *MARTIN FOLKES*, le dernier de mes défunts & principaux patrons, étoit ami des trois autres. Il avoit fait le grand tour de l'Europe, non dans sa jeunesse, mais après s'être marié. Il voyageoit avec une partie de sa famille & de ses domestiques, dans un âge où il étoit en état de faire de justes observations, & de recueillir ce qu'il trouvoit de bon dans les sciences, les coutumes, & les mœurs des pays par où il passoit, afin de s'en servir à perfectionner & à polir celles de sa patrie. Il ne voyageoit pas à la hâte, comme on fait en général à présent, mais il marchoit lentement, & il employoit tout le temps nécessaire à s'informer de tout ce qui méritoit d'être sçu: en effet, il sembloit être parvenu à la science universelle; car dans bien des occasions, que j'ai eues de me trouver en compagnie avec lui, presque toutes les sciences ont été mises sur le tapis, & il les traitoit chacune à part, comme s'il en eût été maître. Il étoit extrêmement poli dans ses

manières, exempt de pedanterie & d'orgueil, &, à tous égards, un vrai gentilhomme accompli, sans la moindre affectation. Il laissa, à sa mort, une liste des noms de ses amis, à qui il destinoit des bagues de deuil, dans laquelle il lui plut d'insérer mon nom.

La perte de quatre protecteurs si illustres, si célèbres, & si accomplis en toute manière, arrivée dans l'espace de trois ou quatre ans, m'humilia beaucoup: je m'imaginai, qu'après une si grande perte pour les arts & les sciences en général, & pour moi en particulier, tous les efforts que l'on feroit, pour exceller dans quelque branche de science que ce fût, seroient infructueux, & de peu d'utilité aux auteurs, manque de protecteurs illustres pour inspirer la génération naissante; ainsi je résolus de cesser de travailler davantage à l'Histoire Naturelle: mais je vois par l'établissement de ce fond immense de sçavoir, je veux dire le Museum Britannique, que le goût de la nation pour l'avancement des sciences & des arts, a en quelque sorte, fait renaître la passion pour le sçavoir & les connoissances utiles, même dans ces temps dépravés de libertinage, de sensualité; & de dissipation, j'espère que ces semences déposées par autorité publique, s'enracineront, croîtront, & produiront une abondante moisson.

Le Museum Britannique me fait ressouvenir d'un catalogue abrégé des sujets naturels & artificiels qu'il contient, que le Chevalier Hans Sloane me montra environ un an avant que de mourir, & dont il me permit, de tirer copie. Je crois que quoiqu'il soit extrêmement général, il ne laissera pas, faute d'un plus parfait, de faire plaisir au lecteur. Je le donnerai de la manière suivante:

Notice des noms & du nombre des différentes espèces
de choses contenues dans le Cabinet du Chevalier *HANS SLOANE*,
qu'on a déposées, depuis sa mort, dans le Museum Britannique pour
l'usage du public.

	Vol.
<i>La Bibliothèque, y compris les Livres de Dessins, Manuscripts, & Tail-</i>	
<i>les - douces, montant à environ.</i>	— 50000.
<i>Médailles & Monnoyes, anciennes & modernes.</i>	— 23000.
<i>Camées, & Pierres Gravées.</i>	— 700.
<i>Cachets, &c.</i>	— 268.
<i>Vaisseaux, &c. d'Agate, d'Jaspe &c.</i>	— 542.
<i>Antiquités.</i>	— 1125.
<i>Pierres Précieuses, Agates, Jaspes &c.</i>	— 2256.
<i>Metaux, Minéraux, Mines, &c.</i>	— 2725.
<i>Christaux, Spates.</i>	— 1864.
<i>Fossiles, Cailloux, Pierres &c.</i>	— 1275.
<i>Terres, Sables, Sels &c.</i>	— 1035.
<i>Bitumes, Souphres, Ambres &c.</i>	— 399.
<i>Talcs, Mica &c.</i>	— 388.
<i>Coraux, Eponges &c.</i>	— 1421.
<i>Testacées, ou Coquillages &c.</i>	— 5843.
<i>Oursins, Echinites &c.</i>	— 659.
	<i>Asteries,</i>

	Vol.
<i>Asteries, Trochites, Entrochites &c.</i>	241.
<i>Crustacées, Crabes, Ecrevisses de Mer &c.</i>	363.
<i>Stella Marina, Etoiles de Mer.</i>	173.
<i>Poissons, & leurs parties</i>	1555.
<i>Oiseaux, & leurs parties, Oeufs & Nids de différente espèce.</i>	1172.
<i>Quadrupedes &c.</i>	1886.
<i>Viperes, Serpents &c.</i>	521.
<i>Insectes &c.</i>	5439.
<i>Végétaux</i>	12506.
<i>Hortus Siccus, ou Volumes de Plantes Séches.</i>	334.
<i>Choses appartenant à l'Homme, comme Pierres, Preparations anatomiques &c.</i>	756.
<i>Mélange de diverses Choses, naturelles &c.</i>	2098.
<i>Instrument de Mathématique.</i>	55.
<i>Portraits & Dessins mis en cadre.</i>	471.

Chaque sujet particulier, de tous les articles ci dessus est numéroté & couché dans un livre, avec une courte explication, & des renvois à divers auteurs, qui en avoient traité jusqu'alors, en trente huit tomes en folio, & huit tomes en quarto. Il y a eu des additions faites, à cette précieuse collection, depuis qu'elle est déposée à l'Hostel de Montaigu, principalement aux Fossiles, dont Mr. Gustave Brander y a fait un riche présent.

Les plus excellentes choses sont toujours les plus rares. L'Etre suprême, éternel, infini, & tout parfait, est Unique, & il ne peut y en avoir Plusieurs. Parmi le genre humain, il y en a si peu qui soient éclairés de connoissances supérieures, qu'il se passe quelquefois un siècle, sans qu'on voye paroître un seul homme remarquable par une profonde pénétration dans les causes naturelles des choses: même les hommes doués de sens commun sont en très petit nombre, si on les compare avec le gros du genre humain: il y en a beaucoup en qui la faculté de raisonner se montre à peine avant que d'avoir eu le secours de l'éducation, de l'expérience, & de la réflexion. Si l'on retranchoit le pouvoir de comparer une chose à l'autre, ce qui est le fondement de l'expérience, nous ne serions guere plus avancés que les brutes, qui se gouvernent par le seul instinct, & par les desirs sensuels; & si l'on compare les Sauvages les plus brutes de notre espèce avec un Newton & un Locke, je crois que la disparité paroîtra plus grande que celle qu'il y a entre ces Sauvages mêmes, & quelques unes des brutes qui leur tiennent compagnie dans les forests & les montagnes.

Qu'il me soit permis de rapeller à la mémoire de plusieurs des curieux & des sçavants du temps présent, avec qui j'ai l'honneur d'être en liaison, que j'ai présenté, en différents temps, la plupart des sujets rares, que j'ai gravés & représentés, tant dans mes ouvrages précédents que dans celui-ci, non seulement à nos academiës publiques, mais à des particuliers curieux, qui demeurent à Londres, dont plusieurs ont de jours fixés dans la semaine pour assembler des personnes de génie, qui s'attachent, à sonder la nature. Je crois que j'ai été si exact, & si soigneux, dans les desseins & les descriptions de chaque sujet, dans le cours de mes

ouvrages, qu'on peut les distinguer avec certitude d'autres sujets de différente espèce d'animaux, tant qu'il subsistera des copies coloriées de mes ouvrages. La plupart des planches de celui-ci ont été dessinées & gravées sur le cuivre immédiatement d'après les sujets qu'elles représentent; & plusieurs des impressions en ont été coloriées directement d'après nature, & de leurs exactes couleurs, par mes propres mains de sorte qu'elles peuvent mériter le titre de desseins originaux. Il n'y a que quatre planches dans cet ouvrage qui sont faites par des graveurs payés, savoir Tab. 61. dans la quatrième partie, & Tab. 66. 75. & 76. dans la huitième partie; j'ai gravé tout le reste. A l'égard des descriptions que j'ai faites de choses, qui avoient déjà été décrites par d'autres auteurs, & où je ne me suis proposé que de perfectionner, j'ai donné exactement les noms de ces auteurs, autant qu'il a été dans mon pouvoir de les découvrir; mais si j'ai omis quelque ancien auteur, qui ait traité les mêmes sujets que moi, mes figures & mes descriptions ne laissent pas d'être tout-à-fait nouvelles. Quand on donne des figures très exactes, on peut s'épargner bien de la peine à l'égard des descriptions, en renvoyant aux figures, qui expriment linéalement les moindres parties, telles que des mots ne feroient qu'indiquer très obscurément: en effet, les figures de cet ouvrage ne peuvent être réputées parfaites sans leurs descriptions, & les descriptions sont très peu de chose sans les figures, car souvent elles ne disent rien quant à la taille générale, la proportion des parties, le nombre des doigts &c. que l'on trouve pleinement exprimés dans les figures. Dans des ouvrages enluminés de cette sorte, le prix de l'exécution dépend de l'habileté, de la diligence, & des soins de l'auteur, car il y a une très grande difficulté pour ne pas dire une impossibilité, à exprimer précisément par des mots, tous les différents degrés, les nuances, & les mélanges des couleurs, de manière à transmettre exactement vos idées aux autres: cela ne se peut faire qu'en donnant les couleurs mêmes. Les planches de cet ouvrage exactement enluminées peuvent se considérer comme un livre, que les personnes de toute langue & de toute nation peuvent lire, tant les savants que les ignorants: des représentations vraies d'animaux &c. bien dessinées, & bien coloriées, sont des caractères, que la nature a appris à tous les peuples à entendre; & de bonnes figures faites d'après nature, surpassent infiniment, pour ainsi dire, les meilleures descriptions verbales. Dans le cours de mes œuvres, j'ai eu en général l'avantage de travailler d'après la nature même; la plupart de mes sujets étoient en vie, & en pleine perfection, & d'autres étoient très bien conservés, pour nous être apportés des pays étrangers: de sorte que, si mes desseins sont au dessous du naturel, comme il ne se peut qu'ils ne le soient, ce n'a pas été manque de soins de ma part, ou de sujets propres à être dessinés; mais c'est à cause de la différence infinie qu'il y a entre le Créateur Souverain des productions naturelles, & de foibles & vaines créatures, qui osent essayer d'imiter les œuvres du Toutpuissant. Quelquefois, oubliant pour un moment la Grande Source de la nature, je me suis vainement imaginé, que mes foibles imitations de ses œuvres étoient en quelque degré parfaites; mais, revenu tant soit peu à moi-même, il m'a semblé

enten-

entendre une voix secrète, redoutable & majestueuse, qui me reprenoit en ces termes: Vain & présomptueux mortel! crois tu que tes foibles efforts peuvent être comparés, le moins du monde, avec les oeuvres de celui qui t'a créé toi même & toutes choses?

J'ai taché de finir mes desseins avec tant d'exactitude, à l'égard du dessein & du coloris, que les seules figures peuvent donner une idée passable des sujets qu'elles expriment, & épargner à des curieux, qui sont obligés d'employer leur temps ailleurs, la peine d'en lire les descriptions.

Cet ouvrage a aussi un avantage que peu d'autres de cette sorte possèdent; car on peut toujours supposer, que celui qui grave ses propres desseins d'après nature, en peut plutôt corriger les erreurs en les travaillant sur la planche, que de demeurer au dessous de leur perfection, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on donne des desseins à copier à des graveurs ordinaires; car, quoiqu'ils puissent les exprimer plus délicatement sur le cuivre, ils demeurent d'ordinaire au dessous de la vérité de l'original: de sorte que c'est toujours un grand avantage à toute sorte d'ouvrages d'Histoire Naturelle, lorsque l'auteur peut exécuter de sa main les parties qui concernent le dessein & la gravure.

Nous avons aujourd'hui à Londres quatre corps savants, fixés & établis, à chacun desquels j'ai présenté des copies authentiques coloriées de ce que j'ai déjà publié, & j'ai dessein de les compléter tous, en leur présentant ce que je pourrai publier dans la suite; Ces corps savants sont le College Royal des Médecins, la Société Royale, la Société des Antiquaires, & le Museum Britannique, où l'on peut trouver des copies de mes oeuvres. Je les ai aussi présentées à l'Académie Royale des Sciences de Paris, & j'ai dessein de lui envoyer ce présent ouvrage, dès que le rétablissement de la paix rétablira la communication libre entre les deux nations. Je crois qu'il convient que je témoigne ici ma reconnoissance à cette illustre Académie d'une lettre très obligeante de remerciements, qu'il lui a plu de me faire écrire par son Secrétaire Mr. *DEFOUCHET*, de Paris, le 13. Mars, 1753.

Parmi les animaux il y en a qui à l'égard de leur vuë & du temps où ils agissent, sont de jour, de nuit, & des crépuscules, c'est-à-dire; qui agissent durant le crépuscule du matin, & celui du soir. On peut ranger dans la première classe l'Homme & le Singe, depuis l'Homme Sauvage jusqu'à la plus petite espèce de Singes proprement ainsi nommés. Il n'y a pas long temps que j'avois un petit Singe de S. Jago, de la même espèce que celui qui est représenté dans la septième partie de cet ouvrage Tab. XI. il étoit si alerte, que, quand il étoit libre dans une petite chambre, il m'étoit impossible de le prendre; mais, dès qu'on avoit ôté la lumière, je pouvois le saisir d'abord. Les oiseaux qui vivent de grain, sont, à ce que je crois, tous de jour. Les oiseaux de proie se divisent en oiseaux de jour, & en oiseaux nocturnes; quoique ceux, qu'on regardé comme oiseaux de jour, saisissent leur proie durant les crépuscules du matin & du soir, comme sont la plupart des Aigles & des sortes de Tiercelets. Le Hibou ne peut supporter la lumière, & ne vole

VIII. Partie. C que

que quand le crépuscule s'avance vers la nuit mais je ne fais s'il vole dans les nuits obscures. Je crois que la plupart des oiseaux aquatiques sont nocturnes, car le Heron, le Butor, & quelques autres, volent durant les crépuscules du matin & du soir. Beaucoup de bêtes à quatre pieds voyent la nuit & le jour, mais le Chat est remarquable en cela; car non seulement il chasse & saisit sa proie dans la nuit, mais il se plaît aussi à s'ébattre à l'ardeur du soleil à midi, quoique ses yeux ne soient pas faits pour supporter une lumière si forte; mais la nature lui a donné la faculté de contracter la prunelle de l'oeil, de sorte qu'il n'admet pas plus de lumière qu'il n'en peut supporter. La Chauve-Souris est un quadrupède tout-à-fait nocturne ne se montrant jamais de jour. Tout le bétail, qui pâit dans les prairies, est de jour, &, en quelque sorte, nocturne, car il se promène & pâit la nuit. Les bêtes carnassières sont nocturnes, dans un sens plus restreint, parceque la nuit est principalement le temps où elles cherchent leur proie; cependant, la plupart se montrent occasionnellement, & font ravage en plein jour.

Il y a une grande difficulté à tracer précisément les chaînons de la chaîne de la nature, dans ses diverses gradations depuis les animaux jusqu'aux plantes. Quand on vient au dessous de ce que les hommes croient généralement animaux, & qu'on passe aux polypes & aux espèces de corallines, on ne fait à quoi s'en tenir, vu qu'il y a une variété d'opinions parmi nos curieux modernes, touchant ces productions: quelques uns les font de vrais animaux, & d'autres les réduisent à de purs végétaux. Pour moi, je crois qu'il y en a beaucoup, qu'on peut regarder comme d'une nature moyenne, participant des deux: car quoique les polypes paroissent être attachés par des racines, & croître comme des végétaux, en poussant de jeunes polypes de leur côtés, & que des parties divisées ou coupées d'autres polypes deviennent de parfaits polypes à leur tour, ce qui est des marques de végétations; ils ont en même temps le pouvoir de remuer leurs parties, & d'étendre leurs branches ou leurs bras, avec les quels ils saisissent de petits insectes, dont ils se nourrissent: ce qui montre qu'ils participent de la nature animale*) Les animaux se multiplient dans la nature par différents moyens: il y en a qui font mâle & femelle de la même espèce; d'autres sont hermaphrodites, chaque individu de l'espèce participant des deux sexes, comme la plupart des Limaçons &c. Presque tous les animaux terrestres engendrent par attouchement; mais il y a beaucoup de poissons femelles, qui déposent simplement leurs oeufs dans l'eau, quand elles se trouvent près du mâle, qui repandent en même temps dans l'eau sa semence, qu'on appelle laite; elle se mêle avec les oeufs, les imprègne, & les vivifie, sans qu'il touche à la femelle. Tous les oiseaux se multiplient par le moyen des oeufs, qu'ils couvent, & qu'ils font éclore. Les quadrupèdes à poil produisent tous leurs petits vivants; comme font aussi quelques uns à écaille, telle est l'espèce Armadille: mais toutes les sortes de Lézards, tant d'eau que de terre, ou qui fréquentent l'une & l'autre depuis le Crocodile jusqu'à la plus petite espèce, font des oeufs que la chaleur

*) V. M. Backer sur les Polypes, & M. Ellis sur les Corallines.

eur du soleil échauffe & qu'elle fait éclore. Il y a quelques poissons, qui font leurs petits vivants. On remarque dans une grande espèce de Crapaut, qui est venu de Surinam, une étrange, & peut-être, singulière manière d'engendrer: son dos est rempli de petites cavités, dans chaque des quelles se trouve un jeune Crapaut: quelques uns de ces jeunes Crapauts paroissent sortir de leurs cellules, pendant que d'autres sont encore couverts d'une membrane fort mince, & que des cellules sont vuides en même tems. Il y a dans le Museum Brittanique un de ces Crapauts, qui est un excellent sujet préservé dans l'esprit de vin. Les vegetaux se multiplient en diverses manières: la plus générale c'est par le moyen des semences; mais il y en a beaucoup, qui se perpétuent par le moyen de petites branches, que l'on coupe où que l'on ecuisse, ou par des rejettons qui sortent des racines, &c. Ce que j'ai remarqué de plus singulier, c'est ce qui arrive au sommet ou à la couronne de l'Ananas qui, si vous la séparés du fruit, & que vous la metties dans un pot plein de terre, prend racine & devient une nouvelle plante. Ajoutez le Lis Printanier, qui a des racines à toutes les jointures de la tige, qui supporte la fleur; ces racines tombent en automne, poussent des fibres dans la terre, & produisent des fleurs au bout de deux ou trois ans. Nous ne savons presque rien de la génération des Mine-raux, parce qu'ils sont cachés à nos yeux.

Les Insectes non seulement se dévorent les uns les autres, mais encore peuvent prendre des oiseaux & les devorer. Les grandes Araignées d'Amerique attrapent souvent des Colibris dans leurs toiles. *) Les Mouches détruisent aussi des Moutons & d'autre bétail, en déposant leurs oeufs parmi la laine ou le poil, ce qui produit des vers qui percent la peau, & font périr la bête, à moins qu'on n'y apporte du remède. La génération des insectes est plus variée, & plus surprenante, que celle des autres parties de la creation animale; il y en a plusieurs qui paroissent & qui agissent comme divers animaux, & qui sont faits fort différemment les uns des autres, quoiqu'ils soient absolument les mêmes,

Il y a des très grandes difficultés à ranger les animaux par classes. A l'égard des oiseaux, on met ensemble les diverses espèces du même genre; mais, quand nous avons fait cela le mieux qu'il nous a été possible, nous sommes incertains quel genre placer au premier rang & ainsi de suite, jusqu'au dernier: car je ne crois pas qu'il se trouvât dans le monde deux hommes, qui, sans avoir consulté personne auparavant, les missent dans le même ordre. On peut dire la même chose des quadrupèdes, des poissons, & de tous les petits animaux. On diroit; au premier coup d'oeil, que les quadrupèdes déclinent graduellement en oiseaux; car la Chauve Souris paroît avoir des ailes étenduës, & voler réellement; & le Gerbo. **) saute comme un oiseau sur ses pates de derrière, & il ne se sert jamais de ses jambes de devant ou de ses mains, dans son mouvement progressif, qui se fait par une action laquelle appartient en général aux oiseaux: cependant après un mûr examen, ces deux animaux

B 2

n'ont

*) V. Mariamne, Hist. des Insects.

**) Tab. XIX. Part. VII.

n'ont du tout, ni l'un ni l'autre, aucune relation aux oiseaux; car ils font leurs petits vivants, & les nourrissent de leur lait; ils sont couverts de poil, ils ont des dents, &, enfin, quatre pieds, comme les autres quadrupèdes. A la vérité, la Chauve Souris a les doigts de ses bras, ou de ses pattes de devant fort alongés, & attachés l'un à l'autre par des membranes très fines, par le moyen desquelles elle vole dans l'air; le Gerbo a aussi des mains ou des pattes de devant, avec des doigts, dont il se sert pour tenir sa proie, quoiqu'il ne les pose jamais à terre pour marcher.

D'un autre côté les quadrupèdes semblent se joindre aux poissons; car on ne fait si l'on doit ranger les différentes sortes de Veaux Marins avec les poissons, ou avec les quadrupèdes; ils ont du poil & des dents comme ceux-ci; mais je ne fais, si l'on doit appeler, avec propriété, leurs extrémités pieds ou nageoires. Parmi les oiseaux, le Pingouin du Détroit de Magellan, & celui du Cap de Bonne Espérance *) sont regardés par nos matelots comme demi oiseaux & de demi poissons; mais après avoir examiné la chose de près, je crois qu'ils doivent maintenir leur rang parmi les parfaits oiseaux, puisqu'ils n'ont rien de toute autre nature animale: car, quoiqu'au premier coup d'oeil, leurs petites ailes paroissent couvertes d'écailles, cependant, lorsqu'on les observe avec le microscope, on découvre qu'elles sont couvertes de vraies petites plumes, qui ont leurs tuyaux, leurs tiges, & leurs barbes, tout comme de grandes plumes.

Je crois que le plus habile naturaliste entreprendroit en vain de travailler à ranger toutes les productions de la nature, tant les animaux, que les végétaux, & les minéraux, dans un ordre si vrai, & si naturel, que chaque corps particulier se trouvoit placé précisément dans son propre rang, c'est à dire, entre deux autres corps dont l'un devroit justement le précéder, & l'autre le suivre. Il survient des difficultés insurmontables, quand on se met à considérer la relation qu'un corps a avec un autre corps: à la vérité, la chaîne de la connexion peut se continuer en chaînons d'une apparente régularité, jusqu'à un certain point; mais on s'apperçoit bientôt, qu'il est impossible à l'esprit humain de la continuer à une grande longueur. L'homme est une créature trop bornée, & trop imparfaite, pour tracer, dans leurs justes & naturelles gradations, les ouvrages de l'Etre immense; cependant, il doit avouer, avec toute l'humilité, & toute la reconnoissance possible, qu'entre toutes les créatures visibles de Dieu, il a les plus grandes obligations à son Créateur, de lui avoir donné le premier rang parmi les êtres créés de ce bas monde, avec la supériorité, le commandement, & la domination sur tous les autres êtres au dessous de lui, qui couvrent la surface de ce globe terrestre, & à qui Dieu a refusé même les moyens d'échapper à la volonté & à la tyrannie sans bornes de l'homme. Le genre humain est non seulement ainsi supérieur à toutes les autres créatures sur la terre, mais chaque homme en particulier semble destiné, par son Créateur, à être également libre, sans être sujet à la volonté arbitraire d'aucun autre homme. Les tyrans
des

*) Tab. XCVII. Part. II.

des nations sont l'effet de la dépravation populaire, du vice, & d'une ambition démesurée; mais, quand la puissance usurpée persécute, opprime, & tourmente le genre humain, il y a pour s'échapper une porte ouverte, que la Providence a refusée aux brutes. La bonté de Dieu pour l'homme est un mystère, que notre foiblesse ne pourra jamais expliquer. Nous sommes tous naturellement tyranniques; nous tachons, & nous nous efforçons tous à nous emparer du pouvoir & de la domination l'un sur l'autre. Nous nous soumettons avec regret au pouvoir supérieur de ceux qui sont plus forts, ou plus puissants que nous. Les contrats, que nous faisons l'un avec l'autre, naissent de nos jalousies mutuelles, & du soupçon que chacun a de l'injustice de son prochain. Si quelque être créé, juste, sublime, & très raisonnable, fort au dessus de la condition de l'homme, vouloit bien condescendre à nous donner la vraie histoire de quelques uns de nos plus grands héros, de nos plus sages législateurs, & de nos saints canonisés, quelles scènes choquantes de violence injuste, de cruauté brutale, d'artifice, de supercherie, de fourberie, de basse hypocrisie, & des fraudes sacrilèges, une telle histoire fidelle ne decouvriroit elle pas? Elle feroit, sans doute, paroître les hommes plus abominablement méchants, qu'eux mêmes n'ont décrit les esprits infernaux, dans les histoires aériennes qu'ils en ont composées. Si l'on veut savoir ce que les hommes sont dans l'état de nature, on n'a qu'à jeter les yeux sur les princes despotiques, on les verra agir sans loi, ou sans conscience, qui les empêche de faire ce que leur dictent leurs passions naturelles. Voulez vous rassembler dans un tout les facultés de l'homme; Il faut que vous examiniez toute la création animale, & que vous preniez toutes les qualités des brutes, c'est à dire, celles qui passeroient pour vertus ou vices dans l'homme; cela vous donnera les différens mélanges de vices & de vertus dans l'espece humaine, dans quelques individus de laquelle les vertus prédominent, & dans d'autres les vices; quoiqu'il n'y en ait aucun sans quelque mélange de l'un & de l'autre: de sorte que l'homme est plus ou moins vertueux ou vicieux, à proportion de la nature de ce mélange.

Si l'homme eût été créé bienfaisant, à l'égard de tous ceux de son espèce, sans avoir la volonté ou le desir de subjuguier les autres, & de regner sur eux, ou de s'emparer de ce qui leur appartient; mais que tout, au contraire, il eut eu l'inclination d'aider & d'assister son foible prochain, & que la paix & la tranquillité eussent été inviolablement maintenües parmi tout le monde, il y a longtemps que la terre auroit été si remplie de gens, qu'il leur eut été impossible d'y subsister; & les animaux, que Dieu a donnés pour la nourriture de l'homme, & pour la subsistance les uns des autres, auroient été, si non entièrement, du moins à peu près éteints; car on fait que plusieurs bêtes sauvages requièrent de vastes plaines inhabitées, des forêts, & des montagnes, pour engendrer, nourrir, & élever leurs petits. Mais la Providence a ordonné les choses autrement, en mettant inimitié entre l'homme & l'homme, aussi bien qu'entre nation & nation, afin de prevenir le trop grand accroissement du genre humain, qui auroit diminué, pour ne pas di-

re entièrement extirpé plusieurs espèces d'animaux, avant que le nombre des hommes toujours croissant devint leur propre destruction, ce qui auroit enfin dû être le cas: mais il est raisonnable de croire que la Providence a également égard à tous les animaux qui ont été créés.

Des états sages, qui ont des sujets ignorants & superstitieux, sont souvent forcés de faire des loix, qui ne s'accordent guère avec la raison, & le sens commun, ou avec les libertés naturelles du genre humain. Ils sont souvent obligés d'user de cette méthode pour arrêter le cours des clameurs du peuple, qui ne manqueroit pas de réduire à un état d'anarchie & de confusion le gouvernement le mieux établi. Le remède contre de tels inconvénients consiste dans l'exécution relâchée de ces mauvaises loix. Je ne crois pas que les plus sages des hommes s'attendent à trouver la justice & la rectitude morale & absolue parmi les plus expérimentées de leur espèce; car on établit le droit & l'injuste, la vertu & le vice &c. selon les différentes modes, coutumes, & religions de différents pays; quoique dans l'immuable volonté de Dieu, ce seroit à nous une grande témérité de supposer la moindre variation, ni le moindre ombre de changement. La justice & la véracité de Dieu doivent absolument être toujours les mêmes; mais comme de notre nature nous sommes des êtres très imparfaits, il doit y avoir de l'imperfection dans nos pensées, nos paroles, & nos actions, tellement que si dix des plus sages d'entre les hommes, vivant en même temps, & sous le même gouvernement, entreprennent de former un plan de rectitude morale, universelle & absolue, pour la conduite de la vie humaine, ils différeront prodigieusement les uns des autres.

Mr. *WILLUGHBY*, parlant des Perdrix en général dans l'*Hist. des Oiseaux* pag. 168. dit, que ce sont des oiseaux fort lascifs, abominables par leurs conjonctions masculines &c. Je pris ce récit pour une fable, jusqu'à ce qu'ayant chez moi, il y a quelques années, de la volaille de Bentham de la petite espèce, les poules se perdirent, & il ne resta que trois ou quatre jeunes coqs, qui demeuroient dans un endroit où ils ne pouvoient avoir aucune communication avec des poules: bientôt ces coqs déposèrent leur animosité précédente, cessèrent de se battre, & chacun tâchoit à cocher son camarade, quoiqu'aucun ne parut bien aise d'être côché. Les réflexions que je fis sur cette étrange circonstance, me firent découvrir la raison pourquoi les desirs naturels, à l'égard de quelques uns de notre espèce, sont détournés dans d'injustes canaux. C'est la coutume chez nous d'envoyer les enfants aux écoles, aux collèges &c. où plusieurs demeurent jusqu'à l'âge d'homme; & un article du soin mal entendu de leur gouverneurs, c'est de leur interdire tout commerce avec des filles de leur âge, sous prétexte de les garantir du vice. Les jeunes filles sont aussi rassemblées dans un même lieu; de là même manière, sous des maitresses, dont la plupart ont des idées trop rigides à l'égard des hommes, & mettent dans la tête de leurs pupilles des pensées très défavorables des garçons, qui sont constamment

ment éloignés avec soin des limites de l'école de filles; ou si l'on est obligé de les y introduire, on les veille exactement: car on n'accorde point aux jeunes hommes, même la plus innocente familiarité avec les jeunes dames, dans les limites d'une école de pension. En séparant de cette manière la jeunesse des deux sexes, & en les mettant chacun en différents séminaires pour leur éducation, où ils demeurent jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à l'âge où les sexes découvrent une inclination naturelle l'un pour l'autre: cette contrainte, précisément dans le tems que le sang & les esprits, qui forment les passions, sont à leur plus haut degré d'émotion, doit interrompre le cours de l'affection naturelle, & le fixer, quoique contre le cours de nature, à des objets, dont ils peuvent jouir: & quand le cours de l'affection naturelle est détourné de son vrai sentier, il n'est pas facile à le remettre dans le droit chemin.

Je m'imagine que ce sont là les causes d'où procède l'indifférence, que plusieurs personnes des plus qualifiées d'entre nous font paroître pour l'état de mariage, ce qui fait qu'il y en a beaucoup des deux sexes, qui quoique fort riches, parviennent à un grand âge, & meurent sans avoir été mariés. C'est évidemment par la faute de notre politique que les jeunes gens des deux sexes sont enfermés séparément, & qu'ils sont privés d'avoir ensemble cette conversation libre & innocente, à laquelle ils ont naturellement droit de prétendre, dans un temps de la vie où les inclinations naturelles se fixeroient sur leur véritable & naturel objet si on ne les pervertissoit pas par une contrainte hors de saison. Cette éducation mal entendue en détourne plusieurs de notre espèce du cours vrai & naturel, qu'ils devroient suivre dans l'économie de la vie humaine, & les porte à des actes dénaturés, qu'elle introduit en la place des naturels. Nos législateurs sont obligés d'y apporter du remède; pour cet effet ils font des loix, qui condamnent les coupables à des punitions corporelles, & même à la mort. Il y a des cas, où ces remèdes sont plus pernicioeux que le mal; car l'expérience journalière montre, qu'il y a nombre d'abominables & rusés coquins, sous la forme de gentilhommes, de valets de chambre, & des simples domestiques, tenus dans les maisons de notre principale noblesse, & de nos plus riches citoyens, qui, par de fines insinuations, & des desseins trompeurs, s'introduisent dans la confiance des jeunes gens, & quelquefois dans celle de gens plus âgés; & s'ils peuvent venir à bout par leur scélérates propositions de les engager à la pratique de quelque sottise, qui ait une relation éloignée à des actes honteux ou dénaturés, ils s'imaginent que dès ce moment ils ont atteint leur but; car ils commencent alors à s'arroger l'autorité de maîtres, & ils prétendent se servir du bien de leurs maîtres, comme si c'étoit le leur propre, & cela en considération de leur prétendue discrétion & de leur confiance. Il y a aussi beaucoup de ces fourbes abominables dans les autres pays, épiant les occasions de se fourrer dans la compagnie d'étrangers, qui leur paroissent être des objets propres à leurs pernicioeux desseins; & s'ils les trouvent d'un naturel craintif & timide, quoiqu'ils n'ayent

en effet, rien de criminel de quoi les accuser, cependant ces effrontés coquins menaceront ces personnes innocentes de les accuser d'actes ou d'attentats criminels pour leur extorquer de l'argent; & la crainte subite, & la surprise d'un trop grand nombre, les porte à se soumettre à leurs impudentes demandes. De cette manière, ceux qui ont de quoi tenter ces infames excroes sont exposés à des dangers, dont le commun peuple est exempt; car il n'est pas vraisemblable, que les plus scélérats des hommes mettent leurs exécrationnelles machinations en pratique où il n'y a point d'apparence de profit: de sorte qu'il n'y a que les gueux qui soient à couvert de leurs pièges. Les principaux chefs de toute société civile devraient constamment faire leurs premiers soins du bien-être du genre humain, sur tout de ce qui peut tendre à sa préservation & à sa propagation.

Dans tout pays, soit que l'agriculture y florisse, ou qu'elle y soit négligée par les habitants, la nature même aide à semer & à planter aussi bien qu'à fertiliser la terre. Les semences des grandes arbres sont pour la plupart ailées; &, lorsqu'elles sont mûres, les vents d'automne les soufflent & les dispersent à une grande distance des sujets, dont elles se separent: d'autres sont dans des étuits ou des gouffes, qui ne sont pas propres à être portés çà & là par le mouvement de l'air; mais la Providence les a donnés pour nourriture aux oiseaux, qui les transportent au loin; & en mangeant la semence, ils en répandent une partie dans des terres, où elles germent & prennent racine. Les sécheresses mêmes de l'automne contribuent à augmenter & à multiplier les arbres & les plantes; car, en occasionnant des crevasses & des découpures dans la terre, les semences d'arbres & de grandes plantes, qui demandent à être avant, sont placées à une juste profondeur pour croître, pendant que par ce même moyen, elle se trouvent garanties des animaux, qui s'en nourrissent. Les semences des plantes annuelles sont, pour la plupart, garnies d'un léger duvet, par le moyen du quel le vent les élève à une grande hauteur, d'où elles se répandent au large & au loin, pour multiplier leur espèce dans des terres éloignées. Le soleil, par ses visites annuelles aux tropiques du nord & du sud, donne alternativement, de l'action & du repos à la végétation. Les torrents, qui dans plusieurs pays tombent des montagnes en certaines saisons, couvrent les plaines, & enrichissent la terre par le limon que leurs eaux y déposent. Les gelées d'hiver contribuent aussi à la végétation; car en dilatant l'humidité de la terre, elles relâchent les mottes suffisamment pour donner passage aux racines des végétaux qui s'étendent. Les Cochons, les Taupes, & quelques autres animaux, fouissent & remuent la terre, & la rendent propre à recevoir les semences des plantes.

Mr. ROBINSON, Ministre d'Ousby, dans la province de Cumberland, dit, dans son *Histoire Naturelle de Westmorland & de Cumberland*, part. II. p. 97. „ que les Oiseaux sont les planteurs naturels de toute sorte de bois & d'arbres: ils sement les noyaux „ sur

„sur la terre, qui les fait croître, comme des pépinières, jusqu'à
 „ce qu'ils soient parvenus à leur cruë & à leur perfection natu-
 „relle. Il y a, dit il, environ vingt cinq ans, que revenant du
 „Chateau de la Rose du bon matin, j'aperçus un grand nombre
 „de Corneilles fort occupées à l'ouvrage sur un terrain penchant,
 „qui étoit couvert de mousse: je m'écartai de mon chemin pour
 „examiner leur travail, & je trouvai qu'elles plantoient une
 „chénaye. Voici la manière dont elles plantoient: elles com-
 „mençoient par faire de petits trous en terre avec leur bec, en
 „tournant & retournant tout au tour, jusqu'à ce que le trou
 „fût assez profond; & alors elles y laissoient tomber le gland, &
 „le couvroient de terre & de mousse: cette plantation devient
 „actuellement un bois épais de chênes propres à s'en servir, &
 „assez hauts pour que les Corneilles y puissent bâtir leurs nids.
 „J'en avertis le propriétaire du terrain, qui les vit lever, & qui
 „prit soin de les protéger & d'encourager leur accroissement.
 „Cela arriva vers la fin de l'automne, quand toutes les semences
 „sont parfaitement mûres. „

Mr. ROBINSON paroît croire, que la Providence a donné cet instinct aux Corneilles simplement pour la propagation des arbres, mais je m'imagine, qu'il leur a été donné principalement pour leur propre conservation, en ramassant de la provision dans le temps d'abondance, afin de s'en servir dans la disette; car on voit que les Pies & les Geais privés, que l'on a dans les maisons, cachent leur manger quand ils en ont beaucoup, & retournent le chercher quand ils en manquent: de sorte que l'instinct de ces oiseaux peut remplir un double but, c'est à dire, leur propre conservation en temps de disette, & la propagation des arbres qu'ils plantent: car on ne peut guère supposer qu'ils retrouvent tous les grains, & toutes les noix, qu'ils cachent dans la terre; mais on peut conjecturer au contraire, qu'il en reste dans les endroits qu'ils ont choisis, autant qu'ils en faut pour garnir la terre. La nature a été extrêmement bien faisante à l'égard de la multiplication prodigieuse des semences de plusieurs végétaux; de sorte que, moyennant une culture convenable, toute la surface de la terre seroit en peu d'années couverte des semences, que peut produire une seule plante. La faculté féminale dans les animaux égale du moins, si même elle n'excède pas celle des plantes: qu'on examine quelques poissons & quelques insectes, on verra quel nombre prodigieux d'individus de leur espèce ils peuvent produire. Mais ces grands multiplicateurs sont sujets à une perpétuelle destruction, vu qu'ils sont la nourriture d'autres animaux, aussi bien que les uns des autres: les grands animaux de proie, qui ne sont pas exposés à être détruits de cette manière, multiplient très lentement,

Il y a bien des gens qui supposent qu'il y a des terres au nord de la grande mère des mers, c'est à dire, l'Océan Pacifique, & qu'elles joignent ensemble les parties occidentales de l'Amerique Septentrionale, avec les limites orientales de la Tartarie. Ces terres ne peuvent guère produire d'oiseaux, que ceux qui y demeurent

toute l'année, parcequ'elles n'ont point de terres à leur sud, pour servir de retraite à des oiseaux de passage: de sorte que, s'il y en avoit, il faudroit qu'ils fissent de longs détours vers l'est ou l'ouest, avant que de pouvoir trouver des terres plus méridionales, dans une latitude plus chaude, que celles qu'ils laisseroient derrière eux. Je crois qu'il est raisonnable de supposer, que plusieurs oiseaux qui habitent constamment des pays chauds, passent d'un pays chaud à un autre, à cause des grosses pluies, qui tombent en abondance en certaines saisons de l'année, & continuent sans interruption durant plusieurs mois, pendant que des pays voisins, qui n'en sont peut-être séparés que par une chaîne de montagnes, jouissent d'un temps sec & serein. On en trouve des exemples sans nombre dans les voyageurs: de sorte que les oiseaux peuvent bien en prendre avantage; car il n'est pas aisé de concevoir comment des oiseaux d'un magnifique plumage pourroient subsister durant trois mois dans une grosse pluie continue.

Je trouve, dans une Dissertation de Mr. *REDI*, la figure d'un oiseau qui ressemble à peu près au Grand Pierrot Noir *), qui est représenté dans mon Histoire Naturelle, Part. IV. Tab. LXXIII.

Mr. *CLINEVS* dit, que les Martinets, ou oiseaux de rivage, demeurent tout l'hiver dans leurs trous; mais Mr. *COLINSON* de Londres, Membre de la Société Royale, a examiné cette affaire dans ce présent mois d'Octobre 1757. après que les Martinets étoient tout - a - fait disparus, en priant un ecclésiastique de ses intimes amis, qui demeure dans le voisinage d'une place propre à cette expérience, de faire creuser dans un endroit où l'on avoit vû un grand nombre de Martinets faire leurs nids durant l'été précédent. On a donc ouvert la terre près du penchant d'une fosse, où ils avoient fait beaucoup de trous; & en creusant jusqu'aux nids, on n'y a point trouvé d'oiseaux, quoique les nids se soient trouvés parfaits: il y avoit dans quelques uns de ces nids des oeufs blancs pourris & dans d'autres il s'étoit réfugié des mouches à miel. Pour rendre la chose encore plus certaine, on a examiné très exactement les passages qui conduisoient aux nids, & qui étoient environ d'un pied & demi de long, on les a trouvés ouverts & vuides: en fin, on a examiné & tracé d'un bout à l'autre plusieurs trous, sans y trouver d'oiseaux.

Les couleurs demandent un certain degré de lumière pour se faire voir dans toute leur perfection, & pour montrer ce qui les distingue proprement les unes des autres: car comme la lumière décline & se change en ténèbres, de même toutes les couleurs se perdent dans le noir; & si l'on augmentoit la lumière au plus haut degré possible, en réduisant par le moyen d'un verre convexe toutes les rayons du soleil à un point, & que l'on fit tomber cette lumière sur des corps de diverses couleurs, ils paroissent

*) Dissertat. de Ave Diomedea, Amst. 1674.

roient tous de la même couleur, parceque l'excès de la lumière absorbe entièrement les couleurs *).

Il y a des cas où l'excès du froid & du chaud produisent le même effet: le feu cause des empoules à la peau; & à la Baye de Hudson, de même que dans les parties septentrionales de l'Europe, il est dangereux de toucher à du fer froid: car les métaux sont plus froids que la glace, à proportion de leur gravité, & si on y touche de la main, ils causeront des empoules & enlèveront la peau. Il se peut faire une espèce de chimie par le froid aussi bien que par le feu. Un de mes amis, qui a demeuré quelques années dans nos établissements à la Baye de Hudson, dans l'Amerique septentrionale, m'a raconté, que perçant un baril de jus de citron pour l'usage de la compagnie, il se trouva gelé, ce qui fit qu'on fut obligé de defoncer le baril, & de casser la glace pour s'en servir; mais quand elle fut fondue on la trouva presque aussi fade que de l'eau, & l'on en conclut, que tout le baril étoit gâté, & ne valoit plus avant, ils trouvèrent au centre une petite quantité de jus qui étoit encore liquide; c'étoit un acide si piquant, qu'il étoit presque impossible d'en endurer une goutte sur la langue; on conserva cette petite quantité pour assaisonner les liqueurs, & elle fit presque autant de service qu'en auroit fait tout le baril, s'il ne se fut point gelé. On dit que l'huile d'olive devient si dure dans ce pays-là par la forte gelée, qu'on est obligé de la couper dans les vaisseaux avec le ciseau & le maillet, & il est dangereux de se tenir exposé aux coupeaux qui en rejaillissent, & qui coupent les yeux comme un verre. Ce même curieux me donna aussi un détail des grandes îles flottantes de glace (car c'est ainsi qu'on les appelle) qui paroissent fréquemment dans ces parages, que nos vaisseaux parcourent entre le nord d'Ecosse & le cap le plus méridional de Groenlande, en allant à la Baye de Hudson, ou en en revenant. On prendroit volontiers, dit-il, ces masses de glace pour des terres couvertes de neige, si l'on ne les trouvoit pas dans des endroits, qu'on fait par une longue expérience être des mers ouvertes. Quelques unes de ces îles paroissent hautes, inégales & raboteuses comme des rochers, ayant des endroits bas ou des plaines: quand les saisons chaudes sont venues, le soleil fond la neige & la glace, ce qui fait tomber des cascades des parties les plus élevées dans les plus basses, où l'eau se tient dans des fosses, & se forme en ruisseaux & en lacs. On est quelquefois obligé dans les voyages d'aller à ces îles chercher de l'eau douce & du gibier, qu'on y tue en abondance, les réservoirs étant remplis de plusieurs sortes d'oiseaux de mer. On y trouve aussi des quadrupèdes des pays voisins, comme des Ours blancs, qui sont de ces pays septentrionaux. Ces îles se trouvent dans des mers très profondes, & il y en a qu'on suppose avant dans l'eau de plusieurs centaines de pieds; car autrement le sommet ne s'élèveroit pas au dessus de l'eau aussi haut qu'il paroît l'être: en effet, si l'on fait flotter de la glace, on n'en verra qu'une petite partie de l'épaisseur qui s'élève au dessus de l'eau. Ces masses

E 2

énormes

*) Voi. l'Hist. de l'Acad. des Sciences de Paris, pour l'année 1711.

énormes de glace sont certainement cassées & détachées, de quelque manière que ce puisse être, des rivages ou des terres des grandes latitudes du nord; autrement je ne conçois pas comment on y pourroit trouver des animaux terrestres; mais comment, & de quelle manière cela se fait, c'est ce que je ne prétends pas conjecturer. Il y en a qui s'étendent plusieurs lieues en long & en large. Je crois que ces îles de glace ont souvent trompé des voyageurs au nord, qui ont prétendu avoir découvert des îles dans des certaines latitudes, que d'autres voyageurs n'ont jamais pu trouver, quoiqu'ils les aient soigneusement cherchées dans les latitudes indiquées.

J'ai remarqué, que plusieurs manufactures, où l'on imite les marchandises des Indes, plusieurs vendeurs d'images, plusieurs imprimeurs de toiles de lin & de coton, ont rempli les boutiques de Londres d'images, de peintures, & de tailles douces, faites, copiées, & coloriées d'après les figures de mon Histoire des Oiseaux, dont la plus part sont misérablement représentées, tant pour les proportions que pour le coloris. La plupart de ceux qui revendent par mois de l'esprit, de la science, & des événements publics, en ont aussi agi sans façon avec mes figures & mes descriptions d'animaux, en les prenant pour embellir leurs brochures; mais les figures sont en général si cruellement estropiées & contournées dans leurs copies, que les personnes judicieuses ne peuvent que former un pauvre jugement de l'ouvrage d'où on a copié ces figures, à moins qu'ils ne prennent la peine d'examiner l'original même.

Il n'est point du tout nécessaire, ni convenable, ni possible, qu'une société civile, ou une république entière soit savante, c'est-à-dire, que tous les sujets qui la composent aient chacun beaucoup de science & d'expérience: à la vérité, il faut que ceux qui sont destinés à l'étude & à la pratique des hautes sciences, apprennent plusieurs des langues mortes, pour les mettre en état de joindre les connoissances & l'expérience des siècles passés & des pays éloignés, à celles de leur temps & de leur pays. Les politiques, le clergé, les medecins, les jurisconsultes, les historiens &c. ne peuvent parvenir à aucun degré de perfection sans ce fond de science qui est conservé dans les anciens auteurs. Les marchands de la première classe de la société n'ont pas besoin d'apprendre aucune des langues mortes, à moins que ce ne soit par gout; mais trois ou quatre des langues viventes leur suffiront pour les mettre en état de faire un commerce étendu, & pour les élever à la fortune & à la réputation, dont ils jouissent parmi nous; car, je crois, qu'on peut assurer de nos marchands, qu'ils sont des princes, avec autant de raison, qu'on ait pu le dire d'aucun des marchands de l'antiquité. La même éducation peut servir à des marchands d'un ordre inférieur; mais, pour ce qui est de ceux de la classe mitoyenne, qui professent des arts mécaniques, & qui ont des métiers, tels que sont les ouvriers, les fermiers &c. leur langue naturelle doit leur suffire pour tout ce qu'ils ont à faire; mais il faut qu'ils la sachent bien lire, & qu'ils

qu'ils possèdent assez l'arithmétique, pour tenir leurs livres en ordre, & faire des memoires. Pour ce qui est de la dernière classe, qui renferme les journaliers, les payfans, & les pauvres, il est inutile qu'ils aient aucune sorte de savoir, excepté en ce qui peut les instruire & les avancer dans leurs différents travaux: il leur suffit d'être instruits des droits religieux & moraux de leur pays, par ceux que le gouvernement, sous lequel ils vivent, a établis pour cet effet. De cette manière les différentes conditions des hommes seroient maintenues distinctes dans la société, & l'on n'y manqueroit point de manoeuvres pour en faire les plus villes fonctions. Une mauvaise politique prévaut aujourd'hui chez nous sous le nom de charité. Nos gens de l'état mitoyen, par un aveuglement extraordinaire, donnent aux enfants de ceux de la plus basse classe une education fort au dessus des emplois à quoi ils devroient être destinés: cela prive le public de manoeuvres, & met ces enfants au niveau de ceux de leurs bienfaiteurs, ce qui doit par conséquent porter préjudice aux enfants des bienfaiteurs mêmes, en augmentant le nombre de ceux de leur état; car, lorsque plusieurs des enfants des pauvres ont reçu cette éducation, ils trompent, dépouillent, & déplacent les enfants de leurs bienfaiteurs, dans un temps où peu des bienfaiteurs même survivent pour voir la funeste conséquence de leur aveugle charité. C'est une charité réelle dont les conséquences tendent au bien de la société, de maintenir les pauvres dans le temps de disette, & d'instruire & former leurs enfants à l'habitude d'un travail assidu. Je crois que des gens qui ont de gros biens doivent être élevés à proportion de leur fortune, d'une manière qui soit au dessus des personnes d'un état mitoyen; parceque c'est en général parmi les premiers, que l'on choisit les gouverneurs & les directeurs des états, aussi bien que ceux qui font l'office de magistrats dans leurs différents départements. Ces personnes doivent avoir de la science, & de l'expérience au dessus des peuples qui sont destinés à être sous leur gouvernement. Pour ce qui est des Gentilshommes qui ne trouvent de plaisir qu'à la chasse, & qui ont dessein d'élever leurs enfants à la même occupation, il seroit inutile, qu'ils eussent une meilleure éducation que leurs fermiers, qui sont en général leurs camarades; car il n'est pas nécessaire qu'un homme en sache beaucoup, pour être en état de se casser le cou à la poursuite des chevreuils, des lièvres, des renards &c. en sautant par dessus les hayes, les fossés et les barrières.

Quoique je n'aye pas dessein de rien publier d'avantage en Histoire Naturelle; cependant quand il s'offre quelquefois des sujets nouveaux & curieux, mon inclination prédominante pour cette étude me fait naître le desir d'en tirer des desseins, quoique je ne puisse plus le faire sans peine. C'est pourquoi la requête que je fais à Dieu, s'il n'y a pas de présomption à présenter des requêtes à cet Etre Suprême, c'est qu'il daigne me guerir de toute inclination à continuer l'Histoire Naturelle, ou toute autre étude, & m'inspirer autant de la connoissance de sa Nature Divine, que mon état d'imperfection est capable d'en recevoir, pour

être en état de me conduire, le reste de mes jours, de la manière la plus conforme à sa volonté, & par conséquent la plus propre à faire mon bonheur. Quand à ce que sera mon état dans la futureté des temps, il n'est connu que du Sage Dispensateur de toutes choses. Cependant les desirs que je forme aujourd'hui, & qui peut être sont incompatibles avec la nature des choses, ce seroit de devenir un esprit intelligent, dégagé de matière grossière, de gravité & de légèreté, doué de la faculté de se mouvoir à volonté, pour percer à l'infini dans ces espaces etherées immenses, ou pour pénétrer dans les corps solides; afin d'observer & d'apprendre comment les parties de ce vaste univers sont liées l'une à l'autre, & par quel mécanisme étonnant elles ont été mises & sont maintenues dans un mouvement régulier & perpétuel. Mais que ces pensées sont vaines, téméraires & présomptueuses! Je soumetts donc humblement mon existence future à la volonté de l'Etre suprême & seul Tout Puissant.

Si les Savants d'aujourd'hui se vantoient de l'immortalité, & se la promettoient à la conclusion de leurs ouvrages, soit historiques, poétiques, ou autres comme il semble que plusieurs des anciens ont fait, cela ne serviroit qu'à les rendre ridicules, & loin de rehausser le prix de leurs ouvrages, cela ne feroit que les avilir. Je ne crois pas même que les anciens fussent si ouvertement vains & infatués que de se promettre l'immortalité d'un air aussi fanfaron. Je m'imaginerois plutôt que ces vaines rodomantades ont été ajoutées par leur enthousiastes admirateurs dans les copies qu'on a faites des ouvrages de ces célèbres auteurs, depuis leur mort. Notre incomparable Shakespear étoit bien éloigné de s'attendre à une réputation immortelle, témoin ce beau passage d'une de ses tragédies.

Les Tours cachées dans les nuës,
 Les Palais superbes,
 Les Temples solennels,
 Le vaste Globe même,
 Oui! tout ce qu'il renferme,
 Tout périra;
 Et comme le vain édifice d'un songe,
 Ne laissera pas le moindre débris après soi.

Je ne prétends pas décider quel sera la destinée de cet Essai, mais je l'abandonne aux Critiques, aux Correcteurs, aux Réformateurs, aux Graveurs, & enfin à l'obscurité & à un parfait oubli.



Der Manakin mit blauen Rücken,
und
Der roth und schwarze Manakin.

Tab. LI.



G. Edwards ad viv. delin.

*J. M. Seligmann excudit.
Cum Priv. Sac. Caes. Majestatis.*

Joh. Sebast. Leitner sculps.

*Parus dorso-cæruleo.
Parus ruber et niger.*

N^o 51. VIII^{ter} Theil.

*Le Manakin à dos bleu; et
Le Manakin rouge et noir.*



TAB. LI.

Le MANAQUIN À DOS BLEU; & Le MANAQUIN ROUGE ET NOIR.

Ces deux oiseaux sont dessinés de leur grandeur naturelle.

Le Manaquin à dos bleu est l'Oiseau du haut de la planche. Le bec est d'un brun foncé; la pointe en est noirâtre: les plumes d'autour de la base de la mandibule supérieure du bec sont noires: le sommet de la tête, depuis un oeil jusqu'à l'autre, est couvert de plumes languettes d'un beau rouge, ou écarlate, qu'il peut élever en forme de huppe: le dos est d'un beau bleu; tout le reste du plumage est d'un noir, qui éclatte par la beauté de son lustre; les jambes & les pattes sont brunes, excepté que le dehors de la jambe, est jaune: les pattes sont faites comme celles de tous les oiseaux de cette espèce, ayant l'orteil extérieur de chaque patte joint à celui du milieu vers le bas: il y a douze plumes dans sa queue.

La figure qui est au bas de la planche représente le Manaquin rouge & noir. Le bec est blanchâtre: il a toute la tête, le cou, l'estomac, une partie du ventre, & les cuisses d'un beau rouge, ou écarlate: le dos, la queue & les ailes sont d'un noir verni de pourpre: le bas ventre, & les plumes qui couvrent le dessous de la queue, sont d'un noir brunâtre, qui s'insinue & se mêle parmi le rouge du ventre & des cuisses: les jambes & les pattes sont faites comme celles de celui qu'on vient de décrire; mais elles sont d'un brun rougeâtre: les couvertures du dessous des ailes, & les barbes intérieures des pennes sont d'un orange pâle vers le bas.

Je prends l'oiseau dernier décrit pour le mâle, & celui dont j'ai donné la figure dans mon Histoire Naturelle, Part. IV. Tab. LXI. & que j'ai appelé le Manaquin noir & jaune, pour la femelle de la même espèce. Petiver a donné une figure de mon Manaquin rouge & noir, dans son GAZOPHYL. p. 46. fig. 12. qu'il appelle, *Avicula, forte Surinamensis, e nigro rubroque mixta*; c'est-à-dire, *Petit oiseau mêlé de rouge & de noir, qui paroît bien être de Surinam*. Le Manaquin à dos bleu appartient à mon bon ami, M. Jean Leman, qui le garde enfermé dans une très belle boîte de verre, & qui a bien voulu m'en permettre l'usage, pour le dessiner. Mr. Millan m'a fait le plaisir de me prêter l'autre, qui l'accompagne: on suppose qu'ils sont tous deux de Surinam; & je crois qu'on n'a point encore publié de figure de l'Oiseau du haut de la planche. Il y avoit des desseins de ces Oiseaux dans le cabinet de feu le Chevalier Hans Sloane. Ceux-ci ont été gravés sur la planche immédiatement d'après les sujets mêmes.



La MESANGE VERTE TACHETÉE & la MOUCHEROLLE ARDOISE ET JAUNE.

Ces Oiseaux sont représentés de leur grosseur naturelle. L'Oiseau d'en haut a exactement la sorte de bec commun aux Mesanges. L'Oiseau d'en bas a le bec d'une façon particulière, & il y en a peu d'autres qui lui ressemblent: il est comprimé ou aplati, & ressemble, un peu à celui du Canard, comme on le verra en jettant les yeux sur sa partie supérieure, représentée dans un coin de la planche.

La Mesange a le bec court, & d'un noir bleuâtre: le plumage de tout l'oiseau est d'un beau vert de Perroquet; & comme le milieu de chaque plume est noir, cela fait paroître l'Oiseau magnifiquement bien marqueté: les plumes, qui couvrent la gorge & l'estomac, sont un peu plus claires, & tirent sur le bleu pâle: les couvertures du dessous des ailes sont d'un vert clair: le dessous des pennes est aussi bien que le dessous de la queue d'une couleur de cendre foncé, les jambes & les pattes sont d'un brun obscur.

La figure d'en bas représente la Moucherolle: son bec est assez long, & assez large; il est comprimé comme celui du Canard, & il y a sur la partie supérieure une espèce de moulure, qui regne d'un bout à l'autre: il est noirâtre à la pointe, & il devient graduellement rougeâtre vers la base, qui est entourée de poils ou foyes roides, dont la pointe se tourne en avant: le devant de la tête est noir; mais le derrière de la tête & du col, le dos le croupion sont d'un couleur de cendre foncé: tout le dessous de l'Oiseau, & ses côtés sous les ailes sont d'un jaune vif: les ailes sont d'un brun très foncé tirant sur le noir, & toutes les plumes en sont bordées de jaune: les couvertures de dessous les ailes sont jaunes: le dessous des pennes est couleur de cendre, & les bords de leurs barbes intérieures sont blanchâtres: la queue a douze plumes; celles du milieu sont les plus longues de toutes: les autres vont en diminuant de chaque côté, jusqu'à la dernière: Les plumes du milieu sont entièrement noires ou très brunes; les autres sont obscures avec la pointe blanche: les jambes & les pattes sont faites comme celles de la plupart des petits oiseaux; mais elles sont d'un couleur de chair foncé.

Ces Oiseaux sont partie des curiosités du cabinet de M. Jaq. Leman, qui m'a dit qu'ils venoient de Surinam: les figures & les descriptions, que j'en donne, faites d'après les oiseaux en nature, sont à ce que je crois, les premières, qui en ayant été publiées.



Die grün gefleckte Meise,
und
Der grau und gelbe Fliegensänger.

Tab. LII.



G. Edwards ad viv. delin.

J.M. Seligmann excudit.
Cum Priv. Sac. Caes. Majestatis.

Joh. Sebast. Leitner sculps.

Parus viridis maculatus, et
Muscicapa cinerea et lutea.

Nº 52. VIII^{ter} Theil. La Mésange verte tachetée, et
La Moucherolle ardoise et jaune.





J. Edwards ad viv. delin.

*Parus aureus, et
Parus coeruleus.*

*J. M. Seligmann executit.
Cum Priv. Sac. Caes. Majestatis.
N^o 53. VIII.^{ter} Theil.*

Joh. Sebast. Lechner sculps.

*La Melange dorée, et
Le Manakin bleu.*

La MESANGE DORÉE & le MANAQUIN BLEU.

Les deux figures ci-jointes représentent ces Oiseaux de leur grosseur naturelle.


L'Oiseau d'en haut, par son bec, qui est petit & court, mais fort, semble appartenir à la classe des Mesanges. L'Oiseau bleu appartient, à ce que je crois, à une classe d'Oiseaux, dont il y a plusieurs espèces, que les Hollandois de Surinam appellent Manaquins: on en trouvera fix dans ce volume; & il y a en^davantage dans mon Histoire des Oiseaux, finie en 1751.

La Mesange dorée est représentée par la figure du haut de la planche: le bec est noir: le derrière & les côtés de la tête, le cou, la gorge, le dos & les ailes sont d'un pourpre bleuâtre foncé & luisant; ou d'un noir relevé de pourpre: le devant de la tête, l'estomac, le ventre, les cuisses, & les plumes qui couvrent le dessous de la queue sont d'une couleur d'or éclatant: le dessus de la queue & les plumes du fouet de l'aile sont noirâtres, sans avoir le vernis de pourpre: les couvertures du dessous des ailes, & les barbes intérieures des pennes sont blanches vers le bas: les barbes intérieures des plumes extérieures de la queue sont blanches vers l'extrémité: les jambes & les pattes sont faites comme à l'ordinaire; mais quand à la couleur, elles sont d'un brun foncé. Avec cet Oiseau on en avoit apporté un autre de la même espèce, qui n'en différoit qu'en ce qu'il étoit la moitié moins gros, & que la tache orange du devant de la tête étoit moins grande à proportion, ne s'étendant pas jusques sur les yeux: il étoit parfait quant au plumage, de sorte que ce ne pouvoit pas être un jeune, c'est à dire un petit nouvellement forti du nid: d'ailleurs, cela ne se peut connoître par la grosseur; car à l'égard des petits Oiseaux, les jeunes sont, à très peu de choses près, aussi gros que les vieux, des qu'ils sont en état de voler.

La figure inférieure de cette planche représente le Manquin bleu: son bec est d'un rouge blanchâtre, ou couleur de chair: il a tout le dessous du corps bleu, de même que la tête, le cou, & le croupion: le dos est noir, aussi bien que le dessus des ailes & de la queue, mais les plumes en sont frangées de bleu: il a aussi une longue marque noire sur la gorge, qui prend depuis la base du dessous du bec: il a encore une bande noire, qui passe d'un oeil à l'autre, tournant autour de la base du dessus du bec: le dessous des ailes & le dessous de la queue est d'une couleur de cendre rembruni: les jambes & les pattes sont d'un brun très foncé.

Les Marques qui caractérisent le Manquin consistent, en ce qu'il n'a pas le bec si long ni si menu, que l'espèce *Muscicapa* (Moucherolle) ni si court & si arrondi par le bout, que le *Parus* ou Mesange, mais entre les deux, & tant soit peu recourbé: il diffère encore de ces Oiseaux, en ce qu'il a l'ergot extérieur de chaque patte joint à celui du milieu vers le bas, ce qui est représenté plus distinctement dans les Tab. XXXI. & L. Part. VII. de cet ouvrage, que dans celle-ci; & en ce qu'il a la queue plus courte à proportion, que ne l'ont la plupart des autres petits oiseaux.

Ces oiseaux preservés dans l'esprit de vin sont venus de Surinam, colonie Hollandoise dans l'Amerique méridionale. Je les ai eus de Mr. Milan, Libraire, près de l'Ambassade, à qui ils appartiennent, qui m'a fait l'amitié de me les prêter, pour les dessiner. Je crois que personne n'avoit encore publié de figures, ni description de ces Oiseaux.




Le GRIMPERAU NOIR ET BLEU, & Le WIDDEHOP.

Ces oiseaux sont dessinés de leur grandeur naturelle, mais le Widdehop est imparfait; vu que je n'en ai que la tête, & autant du cou, qu'on en voit dans la figure.

L'Oiseau d'en haut représente le Grimperau noir & bleu: le bec est noir, assez long, menu à proportion, pointu par le bout, & fait en forme d'arc tant la machoire supérieure que l'inférieure qui est la plus courte: le bout de la langue se partage en plusieurs filets: le sommet de la tête est d'un vert pâle: il y a autour de la base du dessus du bec des plumes noires faisant deux bandes, qui s'étendent sur les côtés de la tête; les yeux sont placés au milieu de ces bandes noires: les côtés de la tête, le derrière du cou, le bas du dos, le croupion, les couvertures de la queue, deux barres qui traversent le haut des ailes sont, de même que tout le dessus de l'Oiseau, d'un beau bleu d'outremer: il y a une large barre noire sur le bas du cou par derrière, ou sur le haut du dos: la queue est noire: le dessus des ailes est de la même couleur, excepté une barre bleue, qui traverse chaque aile obliquement: le dessous des ailes est d'un très beau jaune, excepté les bords, qui sont brunâtres, aussi bien que le haut des penes: les jambes & les pattes sont orange. Je crois que cet Oiseau est le Guira Coereba de Markgrave*). Et je ne sache pas qu'il y ait encore eu aucun auteur, qui ait donné la figure d'un Oiseau de cette sorte, qu'il appelle, *Tomineo capensis major capite luteo*.

Le Widdehop a le bec blanchâtre, fait à peu près comme celui de nos poules communes: la tête est revêtue, comme le cou, de plumes d'un orange vif, ou couleur d'or: il a une crête de plumes étendues en forme d'éventail, qui est fort mince: il y a sur le haut des plumes de cette crête, tant soit peu au dessous de l'extrémité, de petites barres noires transversales; & ces plumes sont plus épaissies au sommet, qu'elles ne le sont au dessous des barres noires. C'est toute la description que je suis en état de donner de cet Oiseau; mais en voici un détail, qui est venu d'Amerique avec la tête, & que je vais copier mot pour mot: „Le Widdehop est un Oiseau jaune, tirant sur l'orange par le dessus du dos, „de la gorge & de la tête: sa crête qui est extrêmement belle & de la même couleur, „est couverte d'une petite couronne brune. Le bas de sa gorge & le ventre est blanc, „& quelquefois gris blanc: ses pieds sont bruns à trois fourches, & un petit pouce, comme le coq: il sent très fort le musc. Cet Oiseau se trouve en Amerique, dans le continent, sur tout à Surinam; mais il est assez rare, & difficile à approcher.„

Le Grimperau m'a été prêté par Mr. Millan, qui l'a entre ses mains, conservé dans une grande perfection, & à qui j'ai obligation de cette figure. La tête du Widdehop m'est venue de M. Edward Byam d'Enfield, qui l'avoit reçue des Indes Occidentales, avec la description ci dessus. Je suppose que les Hollandois de Surinam, d'où on m'a dit que cette tête étoit venue, donnent à l'oiseau le nom de Widdehop, à cause de la ressemblance de sa crête à celle de l'Upupa (Hupe) Oiseau d'Europe, qu'on appelle en Hollande Widhopff. Je crois que personne n'a donné jusqu'à présent de figure, ou de description de cet Oiseau rare. Je m' imagine qu'il doit être de la grosseur d'une poule commune. Le petit Papillon représenté dans la planche se trouve dans la campagne des environs de Londres. Il est d'un blanc de lait, excepté la tête & la partie postérieure du corps, qui est brune.



*) Voi son Hist. du Bresil, pag. 212. & l'Ornithol. de Willughby en Angl. p. 229.

Der schwarze und blaue Zaunhacker
und
der Wiedehopf.

Tab. LIV.



G. Edwards ad viv. delin.

J. M. Seligmann excudit.
Cum Priv. Sac. Caes. Majestatis.

Joh. Sebast. Lechner sculps.

Certhia caerulea et nigra.
Upupa.

N^o 34. VIII^{ter} Theil. Le Grimpereau noir et bleu;
et Le Wiedehopf.





G. Edwards ad viv. delin.

*J. M. Seligmann excudit.
Cum Priv. Sue. Cæs. Majestatis.*

Joh. Sebast. Leitzner sculps.

Certhiæ Indicæ purpureæ.

Nº 55. VIII^{ter} Theil. Grimpereaux pourpre des Indes.

GRIMPEREAUX POURPRE DES INDES.

Ces Oiseaux sont représentés sur la planche de leur grandeur naturelle: ils y ont été gravés immédiatement d'après les sujets mêmes: leur grande ressemblance me fait croire, que l'un est le mâle, & l'autre la femelle de la même espèce.

L'Oiseau d'en haut, que je prends pour le mâle, a le bec noir, assez long, voûté en forme d'arc, allant fort peu en diminuant depuis la base jusqu'au bout, mais plus fort que celui de l'Oiseau d'en bas: la tête, le cou, le dos, le croupion, & les plumes qui couvrent les ailes, sont d'un pourpre foncé tirant sur le bleu: la queue est noire: le ventre, les cuisses, les plumes qui couvrent le dessous de la queue, & les grandes plumes des ailes sont d'un brun obscur: le dessous des ailes & le dessous de la queue est d'un couleur de cendre rembruni: l'estomac est teint de vert; & il y a de chaque côté un bouquet de plumes jaunes ou couleur d'or, qui tombent en partie sur les ailes, quand elles sont fermées: les jambes & les pattes sont noires.

L'Oiseau inférieur, qui est le moins gros, ne diffère du premier par le plumage, qu'en ce qu'il a le ventre, les cuisses, & les plumes qui couvrent le dessous de la queue, du même pourpre bleuâtre que le dessus, & en ce qu'il n'a point de marque verte sur le milieu de l'estomac.

Ces Oiseaux sont d'une classe particulière, différente du Colibri, en ce qu'ils ont le bec extrêmement courbé, & les jambes beaucoup plus longues; mais ils ont la même sorte de langue que le Colibri, divisé vers le bout en plusieurs filaments. Ainsi je suppose, qu'ils subsistent de la même manière, en enlevant le miel ou le suc des fleurs par le moyen de leur longue langue, si propre à cet usage. Le Colibri, proprement ainsi nommé, ne se trouve qu'en Amérique; mais cette famille-ci, se trouve également en Amérique & aux Grandes Indes. Le Grimpereau bleu, représenté Part. I. Tab. XLI. de cet ouvrage, est de ce genre: celui que j'ai décrit dans l'article précédent, est encore de la même espèce. Ces Oiseaux sont dans le cabinet de curiosités de Mr. Le-man, au Collège des Médecins à Londres. J'ai découvert qu'ils sont de Bengale dans les Grandes Indes, par le moyen de quelques dessins d'Oiseaux colorés, qu'un Anglois, qui y demouroit, avoit envoyés au feu sçavant M. Rich. Mead. M. D. & digne promoteur de sciences.



Le COLIBRI GORGE ROUGE, le COLIBRI GORGE VERTE & le LOIR.


Ces Oiseaux de même que le Loir sont dessinés de leur grandeur naturelle; mais je crois que le Loir étoit jeune, n'ayant pas encore fait toute sa cruë, quoique il ne s'en fallût pas beaucoup.

Le Colibri gorge rouge est représenté dans la planche par la figure supérieure: son bec est noir, & beaucoup plus recourbé, que ne l'ont communément les Oiseaux de cette espèce; il approche même de la forme de celui du Grimpereau dernier décrit: les côtés de la tête avec la gorge, jusqu'à l'estomac, sont d'un beau rouge; ou carmin: il a le sommet de la tête, le dessus du cou, le ventre, les cuisses & la queue d'un brun très obscur tirant sur le noir, excepté un léger mélange de bleu au bord des plumes, qui forme comme une frange tout autour: le croupion, & les couvertures tant du dessus que du dessous de la queue sont d'un beau bleu: les ailes sont d'un beau vert foncé, avec un lustre éclatant semblable à celui de l'or poli, quand le soleil donne dessus: le dessous des ailes est de la même couleur, mais moins brillant que le dessus: les jambes sont courtes à proportion du reste: tous les Oiseaux de cette espèce ont les jambes & les pattes brunes ou noirâtres.

Le Colibri gorge verte est celui que représente la figure inférieure de la planche: le bec est noir & droit: il a le sommet de la tête, le dessus du cou, le bas du dos, les ailes, le ventre & la queue d'un brun obscur: le devant du cou, ou la gorge est, d'un beau vert, avec le lustre d'or: la couleur rembrunie des ailes a aussi une reflexion ou un changeant d'or: il a autour du corps une ceinture, ou un baudrier d'un beau bleu, qui comprend l'estomac, les côtés, & le dessus du dos: il a une tache blanche autour de l'anus: les couvertures du dessous des ailes sont vertes, avec un mélange de bleu: les jambes & les pattes sont noirâtres.

Le Loir est représenté au bas de la planche: il est d'un jaune rougeâtre, ou couleur de renard, par le dos & la queue, & blanc sur la gorge & le ventre: il a quatre doigts aux pattes de devant, & cinq à celles de derrière: Il a les dents semblables à celles d'Ecureuil, du genre du quel je le crois une espèce. Ce petit animal est commun en Angleterre. On le trouve dans les bois taillis, & dans les hayes où il y a beaucoup de coudriers, car il se nourrit principalement de noisettes. Il dort durant plusieurs mois en hiver. Il y a bien des personnes qui en gardent dans de petites huttes attachées chacune à une petite cage de fil d'archal: pendant qu'ils dorment on ne leur découvre ni respiration, ni poulx, ni chaleur sensible.

Les deux Oiseaux, ci-dessus décrits sont venus de Surinam séchés, & sont actuellement entre les mains de M. Milan, qui m'en a permis l'usage, pour les dessiner, & en enrichir mon Histoire Naturelle. M. Browne, M. D. qui a demeuré long temps à Jamaïque, & qui a donné depuis peu l'Histoire Naturelle de cette isle, m'a assuré que les Colibris chassent tous les Oiseaux, qui approchent de leurs nids; même les plus grands & les plus redoutables, en bourdonnant ou faisant du bruit, en passant & repassant avec une extrême rapidité devant leurs yeux; ce qui les jette dans une si grande frayeur & une telle confusion, qu'ils s'envolent au plus vite, pour éviter cet inconvénient. Quand le Colibri revient de ce combat, son mouvement est si rapide, qu'il est impossible de l'apercevoir: la course de ces Oiseaux ne se découvre que par le bruit qu'ils font de leurs ailes, en s'élançant au travers de l'air: ils bâtissent leurs nids de mousse fine de coton, & du duvet de plantes, sur de petites branches d'oranger, de citronier, ou de quelque autre arbre, dont le feuillage épais les met suffisamment à couvert. Ni l'un ni l'autre de ces Oiseaux n'a encore été, que je sache, dessiné ou décrit.



Der Colibri mit rother Brust, der Colibri mit grüner Brust,
und der Fiebenschläfer.

Tab. LVI.



J. Edwards ad viv. delin.

*J. M. Seligmann exaukt.
Cum Priv. Sac. Caes. Majestatis.*

Joh. Sebaft. Lechner sculps.

Mellivora pectore rubro.
Mellivora gutture viridi.

N^o 56. VIII^{ter} Theil. Le Colibri gorge rouge, Le Colibri-
gorge verte, et le Loir.

Mus Avellanarum minor.



J. Edwards. ad viv. delin.

Merula pectore rubro.

*J. N. Solignac. exaudir.
Cum Priv. Sac. Caes. Majestatis.
N^o 37. VIII Theil.*

Joh. Sebast. Leuten. sculpsit.


Le Merle à gorge rouge.

Le MERLE À GORGE ROUGE.

Cet Oiseau a été dessiné d'après un sujet desséché qui est venu de Surinam : il est représenté sur la planche de sa grosseur naturelle. Il est fort extraordinaire par la structure de son bec, dont la mâchoire inférieure s'étend fort avant dans les côtés de la tête, & est plus large & plus épaisse, que la base de la mâchoire supérieure. Voyez dans un coin de la planche la figure du bec vu d'en bas.

Le bec est grand & gros à proportion de l'Oiseau, & d'une couleur rembrunie tirant sur le noir, excepté les bases de la mâchoire inférieure, qui sont d'une couleur de cendre bleuâtre : les naseaux sont placés à la base de la mâchoire supérieure, joignant les plumes du devant de la tête : l'Oiseau entier est revêtu de plumes d'un noir obscur, sans aucun lustre, excepté le devant de la tête, la gorge & le commencement de l'estomac, où les plumes sont frangées d'un beau rouge de vin ou cramoisi, & qui paroissent tout-à-fait rouges à l'extérieur ; mais cette couleur diminue graduellement sur les côtés du cou, & de l'estomac, & sur le ventre, jusqu'à ce qu'elle se confonde & se perde dans le noir : le dessous des ailes est noir aussi : la queue est d'une longueur médiocre ; elle est composée de douze plumes, celles du milieu étant plus longues que les autres de chaque côté : les jambes & les pattes sont faites comme à l'ordinaire & noirâtres.

Cet Oiseau bien conservé est dans le cabinet de M. Leman. Je suis embarrassé à quelle classe le rapporter, parceque je ne connois aucune sorte d'Oiseaux qui y ressemblent par la forme du bec. Je ne crois, pas que jusqu'à présent on l'ait représenté ou décrit ; mais il y a quelque chose qui en approche dans l'Histoire du Brésil de Markgrave. Voyez le Jacapu. Il le fait de la grosseur d'une Alouette : il dit qu'il est partout d'un noir luisant, mais qu'il a sur la gorge des taches de vermillon mêlées avec le noir ; que le bec est noir ; un peu recourbé, & d'un demi pouce de long. Willughby l'a inséré dans son Ornithologie, pag. 194. de l'édition Angloise, imprimée à Londres en 1678.



La CALANDRE & une TAUPE TACHETÉE.


L'Oiseau représenté dans cette planche est dessiné de sa grosseur naturelle : il paroît appartenir à la famille des Alouettes, par sa couleur en général & par la longueur de ses éperons ou ergots de derrière, quoique le bec soit plus gros, que de bien des fortes d'Alouettes.

Le bec est d'un brun jaunâtre; mais il est obscur le long du milieu de la mâchoire supérieure : les yeux sont rembrunis : de la base du dessus du bec s'étend au travers des yeux, de chaque côté une barre noire, passant en même temps dessus & dessous, & bordée de blanc du côté qui est vers le sommet de la tête : il y a aussi aux côtés de la tête, au dessous des yeux de petites barres noirâtres interrompues : il a sur le bas du cou, vers le commencement de l'estomac un colier noir très remarquable : la gorge & le devant du cou est blanchâtre, mêlé de brun clair : le sommet de la tête, le derrière du cou, le dos, les ailes, & la queue sont d'un brun rougeâtre, le milieu des plumes étant noir : l'estomac au dessous du colier est d'un brun clair marqueté de brun foncé : le ventre est blanc de même que les cuisses & les plumes qui couvrent le dessous de la queue : les jambes, les pattes, & les ergots sont couleur de chair : les éperons de derrière sont longs, à peu près comme ceux des Alouettes : le dessous des ailes, & le dessous de la queue, incline vers le couleur de cendre.

La Taupe tachetée est représentée un peu plus petite que le naturel; comme c'est un animal très connu, il n'est pas nécessaire de s'y étendre beaucoup; je me contenterai de dire que celle ci est de l'espèce noire commune, & qu'elle s'est trouvée par hasard variée & marquetée de taches d'un jaune d'argile clair, comme on le voit par la figure; laquelle, à ce que je crois, fera mieux comprendre que des mots, la forme des pattes, & des dents de cet animal : il a une rangée de très petites dents, tant dessus que dessous, dans le devant de la gueule & vers le bout du museau, entre ces dents longues & pointues, qu'on appelle communément canines. On trouve quelquefois des Taupes toute blanches ou couleur de crème. Celle-ci avoit été prise dans les environs de Londres, & donnée à M. Fothergill, M. D. Klein, des Quadrupedes, pag. 60. décrit plusieurs sortes de Taupes.

La Calandre appartient à M. Brooks, qui demeure dans Holborn, & y fait un grand commerce d'Oiseaux étrangers & de volaille curieuse : il a cet Oiseau actuellement en vie 1755. Il dit qu'il vient de la Caroline, dans l'Amerique septentrionale : c'est une femelle, selon sa methode de distinguer les mâles d'avec les femelles; ce qu'il fait en prenant l'Oiseau dans sa main, le ventre en haut, & en soufflant de la bouche sur l'estomac; car alors, si c'est une femelle, les plumes se séparent de côté & d'autre, & laissent l'estomac tout nud : cette expérience ne réussit, dit il, que dans la saison où les petits Oiseaux couvent.

Quoique cet Oiseau ait été apporté de l'Amerique septentrionale, il ressemble si exactement à tous égards, à la Calandre de G. P. Olina *) sa figure & sa description sont si semblables à ma figure & à ma description, que je n'ai pas fait difficulté de l'appeller du même nom, & de regarder la Calandre d'Amerique comme la même que celle d'Europe, sans la moindre différence spécifique. J'ai découvert avant ceci, que plusieurs espèces d'Oiseaux étoient communes à ces deux parties du monde, & j'en découvre encore tous les jours de nouveaux, qui sont dans ce cas. Notre compatriote, M. Willughby, a donné une traduction d'Olina, & les descriptions de Bellonius de la Calandre; *) mais il croit que cet Oiseau est le même que notre Traquet, quoique sans raison, à ce que je crois; puisque Olina a donné les figures de la Calandre, & du Strillozzo, qui est le Traquet. Or je suis convaincu par l'évidence de mes sens, que ces Oiseaux sont deux espèces très différentes. M. Russel, M. D. m'a dit que la Calandre se trouve très communement dans les environs d'Alep.



TAB. LIX.

*) Olina Ucelliera p. 230. Roma 1622. **) Ornithol. en Anglois. p. 208.



g. Edwards. ad viv. delin.

J. H. Seligmann excudit.

Jo. Seb. Lechner sculp.

Cum Priv. Sac. Caes. Majestatis.

Calandra . Talpa maculata. N^o 38. VIII Theil. La Calandre; et Une Taupe tachetée.



G. Edwards delin.

J. M. Seligmann sculpsit.
Cum Priv. Sac. Caes. Majestatis.

Joh. Sebast. Lechner sculpsit.

Passer montanus, mas et foemina. N° 59. VIII. Theil.

Moineaux de Montagne,
Mâle et Fémelle.


MOINEAUX DE MONTAGNE MÂLE ET FÊMELE.

Ces Oiseaux sont dessinés de leur grosseur naturelle, & ne diffèrent que très peu du Moineau domestique commun, quoiqu'ils n'habitent que dans des endroits montagneux & solitaires.

L'Oiseau du haut de la planche, que je suppose être le mâle, a le bec noir, & semblable à celui du Moineau commun: il a le sommet & le derrière de la tête couverts de plumes d'un rouge obscur: il a la gorge noire depuis le bec tirant en bas l'espace d'un bon pouce: il a aussi une tache noire de chaque côté de la tête, en partie sous les yeux, & en partie par de là: les côtés de la tête & du cou sous les yeux sont blancs: il a un colier blanc autour du derrière du cou: il a aussi l'estomac blanc, de même que le ventre, les cuisses, & les plumes qui couvrent le dessous de la queue, mais un peu ombragé de brun sur le bas ventre: les ailes sont couvertes aussi bien que le dos, des plumes d'un brun rougeâtre, mais dont le milieu est noir: la première rangée de plumes qui couvrent les ailes sont brunâtres avec la pointe blanche: les plumes de la seconde rangée ont aussi l'extrémité blanche, ce qui forme deux barres blanches à travers chaque aile: les côtés sous les ailes sont, aussi bien que le dessous des ailes d'une couleur de cendre clair relevé d'une légère nuance de rouge: les plumes de la queue sont brunes bordées d'un gris tirant sur la couleur de cendre: le croupion, & les plumes qui couvrent le dessus de la queue, sont de cette même couleur: les jambes & les pattes sont couleur de chair.

L'Oiseau du bas de la planche, que je suppose être la femelle du premier, n'en diffère que très peu, excepté qu'il n'a point de marque noire sur la gorge, ni aux côtés de la tête, & qu'il lui manque le colier blanc autour du cou: il a le bec jaune vers la base, d'où s'étend de chaque côté une longue marque rouge: la tête & le cou de cet Oiseau sont d'un couleur de cendre clair, aux endroits où le premier a du blanc: le dessous est d'un blanc plus obscur: les bords des plumes de la queue sont aussi plus clairs: quant au reste, ils se ressemblent de fort près.

J'ai eu le premier Oiseau de mon bon ami M. Th. Knowlton, de Landesburg en Yorkshire, & j'ai reçu l'autre de M. Bartram de Pensilvanie dans l'Amerique septentrionale: de sorte que je ne doute point, que ce ne soit de ces Oiseaux, qui sont communs au vieux & au nouveau monde. Willughby a décrit le mâle Pa. 252: il dit, qu'on le trouve en Stirie & en Carinthie; mais il paroît avoir ignoré que l'Angleterre en produit aussi. Ayant donc découvert qu'ils sont habitants de notre pays aussi bien que de nos colonies Americaines, j'ai cru qu'ils méritoient d'avoir place dans cette Histoire. Albin a donné la figure de ce qu'il appelle le Moineau de montagne, Tom. III. p. 62. qui est le Moineau rouge décrit par Willughby. Pa. 269. que j'ai découvert être aussi Americain, puisque j'en ai reçu de la Baye de Hudson.




Le MOINEAU À LONGUE QUEÛE & la LINOTTE BRUNE.

Ces Oiseaux sont représentés de leur grosseur naturelle.

Le Moineau à longue queue a le bec d'un rouge vif, & plus court que le bec du Moineau commun: le sommet de la tête, le derrière du cou, le dos, le croupion, & les ailes sont d'un brun vif tirant sur l'orange, excepté que le milieu des plumes est noir: l'estomac est du même brun orangé, mais plus pâle & sans taches noires, les plumes n'en ayant point sur le milieu: les côtés de la tête, les petites plumes de couvertures sur les ailes, le ventre, les cuisses & les couvertures du dessous de la queue sont blanches: les plumes courtes de la queue sont d'un brun obscur, ayant leurs barbes extérieures bordées d'un peu de clair, & des marques blanches sur les barbes intérieures; sur ces plumes en tombent quatre autres d'une longueur surprenante, à proportion de la grosseur de l'Oiseau, les deux du milieu des quelles sont d'environ un pouce plus longues, que les deux des côtés, ces quatre plumes sont d'un noir très foncé: les jambes & les pattes sont couleur de chair: les longues plumes de la queue reviennent très vite, après être tombées par la mue, tout au contraire du Pinson à longue queue *), qui est six mois & même plus long temps à recouvrer les longues plumes de sa queue, après les avoir perduës.

La Linotte brune est l'Oiseau, qui est représenté dans la planche avec la queue courte: le bec est couleur de cendre; le plumage de cet Oiseau est à peu près tout de la même couleur: c'est-à-dire d'un brun sale, ou noirâtre: l'estomac & le croupion inclinent un peu vers la couleur de cendre: toutes les plumes ont la pointe & le bord d'une couleur plus claire, que le reste, ce qui produit un fond marbré, ou un mélange où cependant la couleur foncée domine: les jambes & les pattes sont brunes.

Ces Oiseaux appartenoient, en 1751, à l'obligeant Mad. Clayton, de Flower en Surrey. Cette Dame, qui est fort curieuse en Oiseaux, m'invita très poliment chez elle à Londres, pour les dessiner: elle y avoit non seulement ceux-ci vivants dans des cages, mais encore plusieurs autres Oiseaux étrangers très rares. Les deux qu'on vient de décrire avoient été apportés de Lisbonne, & l'on suppose qu'ils venoient d'Angola en Afrique, ou du Bresil dans l'Amerique meridionale; car les vaisseaux, qui les apportent à Lisbonne, trafiquent à ces deux endroits, dans le cours de leurs voyages. Petiver, Willughby, & quelques autres Auteurs d'Histoire Naturelle ont donné une figure assez semblable à l'Oiseau à longue queue; mais leurs descriptions diffèrent tellement de la mienne, que je crois cet Oiseau un de ceux qui n'avoient point encore été décrits. On peut supposer, par la forme du bec de ces Oiseaux, qu'ils sont du nombre de ceux que nous appellons Oiseaux à bec fort, par le moyen du quel ils son en état de casser plusieurs fortes de grains & de semences.



*) V. Tab. LXVII de la quatrième partie de cet ouvrage.

Der Sperling mit langen Schwanz, und der braune
Jänfling.

Tab. LX.



g. Edwards ad vis. delin.

*J. N. Seligmann excudit.
Cum Priv. Sac. Caes. Majestatis.*

Joh. Sebast. Leitner sculps.

*Passer cauda longissima.
Linaria fusca.*

N^o 60. VIII Theil.

Le Moineau à longue queue;
et La Linotte brune.

Der gekraüßte gelb und schwarze Sperling und der
Brasilianische Sperling.

Tab. LXL.



J. Edwards ad viv. delin.

*J. M. Seligmann excoluit.
Cum Priv. Sac. Cae. Majestatis.*

Joh. Sebaste. Leitzner sculps.

*Passer e luteo nigroque varius, N. 61. VIII. Theil. Le Moirieu Frisé jaune et noir,
crispus. Passer Brasilienensis. et Le Moineau du Bresil.*

Le MOINEAU FRISÉ JAUNE & NOIR ET Le MOINEAU DU BRESIL.


Les deux Oiseaux, & le Papillon qui les accompagne, sont tous dessinés d'après nature, & de grandeur naturelle.

Le Moineau frisé a le bec blanc, la tête & le cou noirs: le dos, les ailes, le croupion & la queue sont d'un vert jaune noirâtre, ou olive foncé: l'estomac, le ventre, les cuisses, & les plumes qui couvrent le dessous de la queue sont jaunes. Les jambes & les pattes sont d'un brun foncé. Les Portugais appellent cet Oiseau *Beco de Prata*. Plusieurs de ses plumes sont crépues, où frisées.

La figure inférieure de l'empreinte représente le Moineau du Bresil: il a le bec assez fort, & d'un très beau rouge: ses paupières sont de la même couleur: il a les yeux noirs: la base de son bec est environnée d'une grande marque noire, qui entoure les yeux, & qui descend un peu sur la gorge: il a le sommet de la tête d'un jaune d'argil: le reste du plumage par tout le corps est d'un brun clair tirant sur le rouge: & il y a sur le milieu de chaque plume une marque d'un brun foncé ou noirâtre; mais en même temps le ventre & le croupion sont beaucoup plus clairs que les autres parties: le bas ventre est presque blanc, de même que les plumes qui couvrent le dessous de la queue: les jambes & les pattes sont faites comme celles de la plupart des autres petits Oiseaux, & d'un orange rougeâtre.

Le petit Papillon rouge & noir se trouve dans les environs de Londres: le corps est brun obscur: les ailes supérieures sont noires, ayant chacune une longue raie rouge, & deux taches de la même couleur: les ailes inférieures sont rouges, ayant les bords extérieurs bordés de noir.

Les Oiseaux ci-dessus décrits appartenoient à Mad. Clayton. Je les ai dessinés d'après les sujets vivants, & je crois que ces deux espèces n'avoient encore été ni dessinées, ni décrites: ils sont d'Angola, ou du Bresil; car je ne sçaurois déterminer lequel des deux endroits est leur patrie: au reste je ne crois pas que tous les Oiseaux d'une espèce, où il s'en trouve de frisés, le soient de même parceque j'ai vu des exemples de frisure accidentelle, dans des espèces d'Oiseaux qui ont généralement le plumage uni.




Le PINSON à COLLIER, & le CHAR- DONNERET VERT.

Ces Oiseaux sont tous deux dessinés de leur grandeur naturelle, & d'après des sujets vivants.

Le Pinson à collier est représenté par la figure supérieure de la planche: il a le bec noir & assez fort; la tête est noire aussi, excepté la base du bec & le tour des yeux; qui est blanc: il a aussi la gorge blanche, de laquelle une barre blanchâtre s'étend autour du cou, & lui fait un collier: au dessous de ce collier blanc, sur le devant & au bas du cou, il y a une barre noire qui en entoure plus de la moitié: le dos & la queue sont d'une couleur de cendre foncé: les plumes qui couvrent la queue sont un peu plus claires: les plumes des ailes sont noires au milieu, & leurs bords sont d'un brun rougeâtre éclatant: les grandes plumes sont noires; l'estomac, le ventre, les cuisses, & les plumes qui couvrent le dessous de la queue sont blanches, ombragées, ou nuées d'orange pâle: il a les jambes & les pattes faites comme la plupart des autres petits Oiseaux; elles sont d'une couleur obscure, Les Portugais appellent celui-ci COLHEIRINHO.

Le Chardonneret vert est représenté par la figure inférieure de l'empreinte: il a le bec assez semblable à celui de notre Chardonneret, d'une couleur de chair rougeâtre vif, ou écarlate, qui occupent le devant de la tête, & s'étendent un peu au de là des yeux: il a depuis le bec jusqu'aux yeux un petit espace de peau nue, d'un gris de fer bleuâtre: l'oeil paroît brun ou noir, comme dans la plupart des autres petits Oiseaux. J'ai négligé, dans plusieurs de mes descriptions, de spécifier la couleur des yeux, quand ils étoient noirs, ou d'une couleur obscure; mais j'en ai toujours fait mention, lorsqu'ils se sont trouvés d'une couleur extraordinaire: le derrière de la tête & du cou, & le dos sont d'un vert jaunâtre: la queue & les plumes qui en couvrent le dessus sont d'un rouge vif: celles de dessous sont d'un gris de cendre: les ailes sont d'une couleur verdâtre, rehaussée d'une nuance de rouge, qui est plus forte sur les petites couvertures des ailes, que sur les grandes: les grandes plumes sont obscures ou noires: l'estomac est d'un vert olive, qui dégénère en blanc, sur le ventre, & jusque sur les plumes, qui couvrent le dessous de la queue: tout le dessous de l'Oiseau est marqué de barres interrompues, ou longues taches brunes: les jambes & les pattes sont grises. Les Portugais appellent cet Oiseau MARACAXAO.

Ces Oiseaux appartenoient à Mad. CLAYTON. Le premier, à ce que je crois, n'avoit encore été ni dessiné ni décrit, j'ai donné la figure du Chardonneret dans mon Histoire Naturelle des Oiseaux; mais comme c'étoit d'après un sujet mort, & que j'ai dessiné celui-ci d'après l'Oiseau vivant & plein de santé, j'ai lieu de croire que j'ai perfectionné ce nouveau dessin. Le petit Papillon brun, varié de lignes ou taches noirâtres, est dessiné d'après nature: il se trouve dans la campagne des environs de Londres: je l'ai inséré dans cette planche, uniquement par voye de décoration.



Der Stieglitz mit einem Halsstreif und der grüne Stieglitz. Tab. LXII.



J. Eduardo ad viv. delin.

*J. M. Saligmann excudit.
Cum Priv. Sae. Caes. Majestatis.*

Joh. Sebast. Lechner sculps.

*Avicula torquata.
Carduelis viridis.*

Nº 62. VIII^{tes} Theil.

*Le Pinson à Collier; et
Le Chardonneret vert.*

Der gemalte Fink, ein Er und eine Sie.

Tab. LXIII.



J. Edwards ad viv. delin.

*J. M. Salmgamm excudit.
Cum Priv. Sac. Caes. Majestatis.*

Joh. Sebast. Lechner sculp.

Fringilla tricolor, mas et foemina. N° 63. VIII^{ter} Theil. Le Pinson Peint, Mâle et Femelle.

Le PINSON PEINT, MÂLE & FEMELLE.

Pour éviter de multiplier les noms, j'ai retenu celui que Catesby donne à cet Oiseau, quoiqu'il soit plus généralement connu de nos curieux de Londres sous le nom de Nonpareil ou de Meriposa: ils ont été gravés tous deux sur la planche immédiatement d'après nature & de grandeur naturelle.

La figure supérieure représente le Mâle: il a le bec court, & gros vers la base, finissant en pointe, & de couleur rembrunie. Les yeux sont noisette: la tête & le derrière du cou sont d'un très beau bleu: la gorge & l'estomac sont d'un rouge, qui dégénère graduellement en orange sur le ventre, & devient d'un jaune commun sur les plumes qui couvrent le dessous de la queue: le dos est d'un vert jaune pâle: le croupion, c'est-à-dire les plumes qui couvrent la queue, est rouge: les ailes & la queue sont d'un vert bleuâtre par dessus, & gris de cendre par dessous; excepté quelques unes des grandes plumes du fouet de l'aile, qui sont noirâtres: les jambes & les pattes sont couleur de chair.

La figure inférieure de l'empreinte, que je suppose être la Femelle de celui qu'on vient de décrire, est partout d'un vert de perroquet: le dessus, les ailes, & la queue sont d'un vert plus foncé & plus tirant sur le bleu: le dessous est plus clair & plus tirant sur le jaune: à tout autre égard elle est semblable à l'Oiseau que la première figure représente.

Les deux descriptions ci-dessus sont faites d'après des Oiseaux vivants, tenus à Londres, dans des cages, où ils n'ont pas cette parfaite beauté, qu'ils ont dans les bois où ils naissent. J'ai déjà décrit le mâle d'après un sujet desséché, qui avoit été tué en Caroline, & envoyé ici. Cette première description diffère un peu de celle-ci. On apporte beaucoup de ces Oiseaux de l'Amerique septentrionale à Londres, où ils se vendent, ou se donnent en présent aux curieux. Ils peuvent vivre quelques années chez nous si l'on en prend les soins nécessaires. J'en ai gardé un moi même deux ou trois ans. Le mâle a un chant fort doux avec quelque variété. Il se passe quelques années avant que les couleurs, tant du mâle que de la femelle soient parvenues à leur perfection: ils sont, pendant un an ou deux, d'une couleur aussi simple qu'un Moineau femelle commun, & il n'est pas possible de les distinguer l'un de l'autre.



Le CHARDONNERET AMERIQUEAIN, MÂLE & FÊMELE.


Ces deux Oiseaux sont dessinés de leur grosseur naturelle: ils ont été gravés sur la planche immédiatement d'après les sujets vivants.

L'Oiseau d'en haut, qui est le mâle, a le bec fort approchant de celui de notre Chardonneret, non seulement par la figure, mais aussi parcequ'il est de même, d'un couleur de chair pâle: les yeux sont noisette foncé: le devant de la tête, le cou, l'estomac, & le dos sont couverts de plumes d'un jaune éclatant: les cuisses, le bas ventre, & les plumes qui couvrent tant le dessus que le dessous de la queue sont d'un jaune blanchâtre: les plus courtes des couvertures des ailes sont jaunes en dehors & blanchâtres en dessous, le reste des plumes des ailes est noir, excepté que la première, & la seconde rangée des plumes qui les couvrent ont la pointe d'un blanc ombragé de brun: quelques unes des grandes plumes du côté du dos ont aussi la pointe blanchâtre, & sont bordées de clair: la queue est noire; elle est composée de douze plumes de longueur à peu près égale: les barbes intérieures des plumes extérieures de chaque côté sont blanches vers la pointe: le dessous des pennes, aussi bien que le dessous de la queue, est couleur de cendre foncé: les jambes & les pattes sont couleur de chair. Quand le mâle est jeune, il ne diffère de la femelle en rien, que par la tache noire, qu'il a sur le devant de la tête.

La femelle, qui est représentée par la figure inférieure a le bec & les jambes de la même couleur que le mâle: il lui manque la tache noire sur la tête: le sommet de la tête, de même que le cou, & le dos, est d'un vert olive: la gorge, l'estomac & le croupion sont d'un jaune pâle: le bas ventre est blanc: les plumes qui couvrent le dessous de la queue sont de la même couleur: elle a les ailes & la queue comme le mâle, avec cette différence, que le noir en est moins parfait, & le clair plus brun: le dessous des pennes & les couvertures du dessous des ailes sont d'un gris de cendre.

Ces Oiseaux avoient été apportés de la Nouvelle York dans l'Amerique septentrionale. Je tenois la femelle dans une cage séparée du mâle, & au mois d'Aout, 1755. elle pondit un petit oeuf gris de perle, sans aucune tache, dont j'ai donné la figure au coin de la planche. La femelle muoit ou changeoit de plumes deux fois par an durant le temps que je l'ai gardée, sçavoir en Mars & en Septembre: pendant les mois d'hiver son corps étoit tout-à-fait brun, mais la tête, les ailes, & la queue étoient de la même couleur qu'en été. Comme le mâle mourut peu de temps après l'avoir eu, je ne sçauois dire s'il muoit de même, que la femelle ou non? Cependant je ne doute point que cette particularité ne leur soit commune à tous deux; étant probable, que le Createur souverainement sage a voulu les habiller constamment de la même couleur que les buissons & les arbres parmi lesquels ils habitent, pour les mettre en état de mieux se garantir des avides Oiseaux de proie, & des autres animaux qui se nourrissent d'Oiseaux.

CATESBY a donné, dans son *Hist. Nat. de la Carol. tom. I. p. 43.* la figure de cet Oiseau; mais comme j'ai pu y ajouter la femelle & son œuf, & que je crois avoir perfectionné la figure du mâle, je me suis hasardé de les présenter au public.





G. Edwards ad viv. delin.

*J. H. Seligmann exoudit.
Cum Priv. Sac. Caes. Majestatis.*

Joh. Sebast. Leitner sculps.

*Carduelis Americana, mas et
foemina.*

Nº 64. VIII^{ter} Theil.

*Le Chardonneret Americain,
Mâle et Fémelle.*



G. Edwards ad viv. delin.

*J. M. Seligmann excudit.
Cura Priv. Sac. Cae. Majestatis.*

Joh. Sebast. Leitzner sculps.

Ardea stellaris parva fusca. N^o 68. VIII^{ter} Theil.


Le Petit Butor Brun.

Le PETIT BUTOR BRUN.

Le plus gros des Oiseaux représentés dans cette empreinte, est celui dont je vais donner la description: il est dessiné moindre que le naturel, étant environ de la grosseur d'un Vanneau, ou d'un Pluvier: l'aile fermée a six pouces de long, la jambe en a à peu près deux: les orteils sont fort longs: celui du milieu est de la même longueur que la jambe: le bec, depuis la pointe jusqu'aux angles de l'ouverture a deux pouces & demi.

Le bec est droit, comme l'ont les autres Oiseaux du genre Héron, finissant en pointe aiguë, brunâtre par dessus & plus clair par dessous, quoique probablement il put être verdâtre, quand l'Oiseau étoit en vie: la peau est sans plumes entre le bec & les yeux, comme dans le Butor commun: le sommet de la tête est noir; il a aussi un trait de noir de chaque côté de la tête, partant des coins de l'ouverture du bec: le cou est revêtu de longues plumes, qui pendent librement, & qui sont d'un brun rougeâtre, plus clair par devant & plus foncé par derrière, les plumes de chaque côté étant marquées de noir le long du milieu: le dos est couvert de plumes d'un brun rougeâtre, dont le milieu est noir: le ventre & les cuisses sont couvertes de plumes grises d'une texture lâche, ayant sur le milieu des taches noires, longues & étroites: les ailes sont d'un brun rougeâtre plus clair que le dos: leurs courtes plumes de couverture sont marquées comme celles du dos; mais le rang qui suit, & les plumes de contre le dos sont simplement brunes, avec très peu ou point de noir: les grandes plumes du fouet de l'aile & les plumes de la queue sont noires: les petites plumes de l'extrémité de l'aile, qui en couvrent le fouet, sont noires aussi: les plumes qui couvrent le dessous des ailes sont blanches: le bas ventre & les plumes qui couvrent le dessous de la queue sont de la même couleur: le dessous des grandes plumes est couleur de cendre, de même que le dessous des plumes de la queue: les jambes & les pattes sont verdâtres: l'orteil extérieur est attaché à celui du milieu, vers le bas, par une membrane: l'orteil du milieu de chaque patte est dentelé par un des bords.

Cet Oiseau a été apporté d'Alep par M. Ruffel, M. D. qui m'a permis de le dessiner. M. Shaw a décrit, dans ses Voyages de Barbarie & du Levant P. 255: „un petit Butor, qu'on appelle en Barbarie Boo-onk (long-cou): il dit, qu'il est plus petit „qu'un Vanneau: le cou, l'estomac & le ventre sont d'un noir de jais: la queue est „courte, les plumes du cou sont longues & variés de blanc, ou de jaune pâle: le bec, „qui a trois pouces de long, est vert, & fait comme celui de la Grue, les jambes, qui sont „courtes & menues sont vertes: en marchant, & en cherchant à manger, il élance le „cou de sept à huit pouces,, Voyez la petite figure de la planche, qui est faite sur l'empreinte de M. Shawe, & colorée d'après sa description: il ne dit rien du noir qui est sur la tête, mais il l'a fortement exprimé dans sa figure. M. Taylor White m'a fait voir le dessin d'un oiseau qui ressemble beaucoup à la figure & à la description de M. Shaw, ayant le sommet de la tête noir, & qui avoit été tué dans le pays de Gales, comme je crois qu'il me l'a dit. Il est probable que les Oiseaux de M. Ruffel & de M. Shaw ne diffèrent que par le sexe & par l'âge. Cet Oiseau nous étoit inconnu avant que M. Ruffel l'eut produit en 1755.



Le C A N U T.

Cet Oiseau est représenté ici de sa grosseur naturelle.

Il a le bec d'une couleur de cendre obscur, assez gros vers la base, & allant en diminuant vers le bout, qui n'est pas fort pointu, mais un peu arrondi : ses yeux sont couleur de noisette : il a une barre d'un brun obscur depuis le bec jusqu'à l'oeil, & une barre blanche au dessus de cella-là : le dessus de la tête, le derrière du cou, le dos, & les ailes sont couleur de cendre, les plumes en étant un peu plus claires vers les bords qu'au milieu : parmi les plumes qui couvrent les ailes, celles de la première rangée vers les pennes sont blanches à la pointe, & un peu plus bas, sur les bords, ce qui forme une barre blanche d'un côté à l'autre de chaque aile : les pennes de contre le dos sont bordées de gris blanc : les plus grandes, c'est-à-dire celles du fouet de l'aile sont d'une couleur plus foncée que les autres, & ont la tiche blanche : le bas du dos, & les plumes qui couvrent le dessus de la queue sont mêlées de couleur de cendre foncé & de blanc, ce qui produit des taches en forme de croissant : la queue est couleur de cendre : tout le dessous depuis la gorge jusqu'à la queue est blanc, marqueté de petites taches brunes sur la gorge & sur l'estomac : les côtés sous les ailes, le ventre, les cuisses, & les plumes qui couvrent le dessous de la queue sont marquées de barres transversales d'une couleur obscure : le côté de l'aile est blanc : les jambes sont sans plumes un peu au dessus des genoux : les pattes, & les ongles sont d'une couleur de cendre obscur tirant sur le bleu ; les orteils sont tout-à-fait divisés jusqu'à la racine.

Je trouvai cet Oiseau à Londres, au marché, dans un hiver très rude : je crois que c'étoit en 1739. ou 1740. WILLUGHBY assure avoir oui dire, qu'il vient de ces Oiseaux dans la province de Lincolne au commencement de l'hiver, qu'ils y sejourment deux ou trois mois, sur le bord de la mer, & qu'en fuite ils disparaissent : ils volent par troupes : on en a vu aussi sur les côtés de Lancastre près de Liverpool en hiver. Voi Willughby, pag. 302. Tab. 56.

Mon dessein n'a pas été de donner la figure ou la description d'aucun Oiseau Anglois déjà représenté ou décrit. Mais comme cet Oiseau est rare dans le sud de l'Angleterre, que la figure de Willughby est très médiocre, & qu'Albin l'a omis, j'ai cru qu'une figure plus exacte & de grandeur naturelle pourroit faire plaisir aux curieux. Ma description, qui a été faite d'après l'Oiseau nouvellement tué, diffère un peu de celle de Willughby ce qui arrivera toujours, quand deux personnes décriront d'après deux différents sujets, & même quand ils se serviroient du même sujet.



Der Canutvogel.

Tab. LXVI.



G. Edwards ad viv. delin.

Avis Canuti.

*J. M. Seligmann excudit.
Cura Priv. Sac. Cae. Majestatis.
Nº 66. VIII. Theil.*

Joh. Sebast. Leitner sculps.

Le Canut.



Die gefleckte Wasserdrossel und der Säulenbaumhäcker. Tab. LXVII.



G. Edwards ad viv. delin.

Tringa maculata.
Certhia pinus.

J. M. Seligmann excudit.
Cum Priv. Sac. Caes. Majestatis.
N^o 67. VIII^{ter} Theil.

John Sebast. Leitner sculps.

Le *Tringa tacheté* ; et
Le Grimpereau de Sapin.

Le TRINGA TACHETÉ, & le GRIMPERAU DE SAPIN.

Ces Oiseaux sont représentés de leur grosseur naturelle: ils ont été dessinés & gravés sur la planche immédiatement d'après les Oiseaux même preservés secs.

Le Tringa (espèce de Grive) est le plus gros des deux Oiseaux exprimés sur la planche: son bec est noir brun vers la pointe, & couleur de chair à la base: la mandibule supérieure en est cannelée de chaque côté, & les naseaux sont longs: il a une barre blanche au dessus de chaque oeil: la tête, le dessus du cou, le dos, le croupion, & les couvertures des ailes sont brunâtres, tirant un peu sur le vert olive, avec quelque lustre sur les ailes: les plumes du milieu de la queue, & les plus courtes pennes vers le dos sont de la même couleur brunâtre: la tête est marquée de petites taches longuettes & obscures, le long des tiges des plumes; ces taches vont en croissant depuis le cou jusques sur le dos, où elles sont beaucoup plus grandes: le croupion est sans taches: les plumes de dessus les épaules & les ailes sont toutes marquées de taches obscures transversales, dont la forme se peut mieux comprendre en consultant la figure, que par une description: les grandes pennes sont obscures; quelques unes des plus petites ont la pointe blanche: la première rangée de couvertures sur celles-là sont du même brun, & ont aussi la pointe blanche, ce qui forme deux barres obliques blanches sur les ailes: le bord de l'aile est blanc, aussi bien que les couvertures du dessous, excepté une barre obscure régulière, qui les traverse d'un côté à l'autre: le dessous des pennes est blanchâtre vers la racine, excepté trois ou quatre des pennes extérieures, qui n'ont point de blanc: les plumes du milieu de la queue ont une barre brune, qui les traverse vers leur extrémités: les plumes extérieures vont graduellement en raccourcissant, & sont blanches avec des barres obscures transversales: tout le dessous de l'Oiseau, depuis la gorge jusqu'à la queue est blanc, tacheté sur la gorge de petites marques obscures, qui sont plus grandes sur l'estomac, & d'une figure particulière, sur quoi il faut consulter l'empreinte: ces taches obscures sont moins régulières sur les cuisses, le ventre, & les plumes qui couvrent le dessous de la queue, que sur l'estomac: les jambes sont sans plumes un peu au dessus du genou, & les orteils sont plats vers le bas: l'orteil extérieur de chaque patte est joint vers le bas à celui du milieu par une membrane: les jambes & les pattes sont d'un couleur de chair obscur, & les ongles sont noirs.

La plus petite figure de l'empreinte représente le Grimperau de Sapin: le bec est noir, un peu gros à la base, mais finissant en pointe aiguë: une barre noire s'étend de la base du bec à l'oeil de chaque côté de la tête: le sommet & les côtés de la tête, l'estomac, le ventre, & les cuisses sont d'un jaune éclatant; le sommet de la tête est un peu plus foncé: le derrière du cou & le dos jusqu'à la queue est d'un vert jaune charmant tirant sur l'olive, & plus brillant sur le croupion: les ailes, & la queue sont d'un gris de fer bleuâtre: les plumes qui couvrent les ailes, sont blanches à la pointe, ce qui forme deux barres blanches d'un côté à l'autre de chaque aile: les plumes qui couvrent le dessous des ailes sont blanches: le dessous des pennes est gris de fer: les barbes intérieures en sont bordées de blanc: les plumes extérieures de la queue ont leurs barbes intérieures blanches; les plumes qui couvrent le dessous de la queue le sont aussi: les jambes & les pattes sont d'un brun jaunâtre, & faites comme celles de pluspart des autres petits Oiseaux.

Ces Oiseaux ont été tués avec beaucoup d'autres dans les environs de Philadelphie en Pensylvanie, par mon ami Mr. Guil. Bartram, qui me les a envoyés à Londres, pour en publier les dessins & l'histoire naturelle. Je crois que le petit Oiseau est le Grimperau de pin de Catesby, quoique mon Oiseau soit d'une couleur plus claire *), Le sien pouvoit être un mâle dans sa première année. La principale différence de l'un à l'autre, c'est que le sien avoit les ailes & la queue brunes, & que le mien les a gris de fer tirant sur le bleu. Cet auteur dit que les femelles sont toutes brunes, & qu'on voit ces Oiseaux en hiver sur des arbres sans feuilles y chercher à manger. Mr. Bartram dit qu'ils arrivent de devers le sud en Pensylvanie au mois d'Avril; qu'ils se nourrissent d'insectes qu'ils trouvent sur les feuilles & les bourgeons des arbres, & qu'ils y demeurent presque tout l'été: il croit qu'ils y nichent, quoiqu'il n'ait jamais trouvé de leurs nids. Selon Catesby, ils peuvent supporter l'hiver en Caroline; & cette province est plus au sud que la Pensylvanie.

Le plus gros Oiseau, ou le Tringa vient aussi, dit, Mr. Bartram de devers le sud en Pensylvanie, au mois d'Avril. Il en avoit ouvert une femelle, où il avoit trouvé d'assez gros oeufs; mais par malheur l'ayant perduë, il n'a pu m'envoyer que le mâle. Il ajoute qu'ils restent dans ce pays la plus grande partie de l'été. Je crois que cet Oiseau est commun aux deux continents d'Europe & d'Amerique: car j'en reçus un en 1743. de feu mon bon ami Mr. le Chevalier R. Abdy, qui l'avoit tué dans les environs de sa maison de campagne d'Albans, dans la province d'Essex. Je découvris en l'examinant, que c'étoit une femelle. Elle ne différoit du Tringa Américain à aucun autre égard, qu'en ce qu'elle n'avoit point de taches, excepté sur la gorge, où il y en avoit quelques unes de brunes & longuettes, le long de la tige des plumes. Je vois par les remarques que j'ai écrites au bas du dessin de cette femelle, que je la reçus au mois de Mai. Je crois que c'est un Oiseau de passage, qui se voit très rarement en Angleterre.

K 2

TAB. LXVIII.

*) Cat. tom. I. p. 46. Il l'appelle en Latin, *Parus Americanus lutescens*; & son traducteur François, *Mesange brune de l'Amerique*.


LA PETITE POULE D'EAU & le ROITELET JAUNE.

Ces Oiseaux ont été gravés sur la planche immédiatement d'après nature, & sont tous deux représentés de grosseur naturelle.

L'Oiseau inférieur de la planche représente la Poule d'eau: son bec est noir, excepté la base de la mandibule inférieure, qui est rougeâtre: la tête est toute noir: le derrière du cou est brun aussi bien que le dos, la queue & les ailes; ce brun est plus rouge sur le cou, & est varié sur le dos & le croupion de barres transversales blanchâtres: les ailes & les plumes de la queue sont parsemées de taches blanches rondes: les plumes qui couvrent le dessous des ailes sont couleur de cendre, marquées transversalement de blanc: le côté de l'aile est aussi de la même couleur; le dessous des pennes est couleur de cendre, aussi bien que le dessous de la queue: le devant du cou & l'estomac sont d'un couleur de cendre bleuâtre, ou gris d'ardoise: le ventre est couvert, de même que les cuisses, de plumes d'un brun obscur, ou noirâtres, mêlées transversalement de couleur de cendre blanchâtre: les plumes qui couvrent le dessous de la queue sont blanches: les orteils sont longs, comme dans toutes les Poules de marais, ayant des membranes étroites de chaque côté, comme en ont les Poules d'eau de la grande espèce: les jambes & les pattes sont brunes.

La figure supérieure de la planche représente le Roitelet jaune: il a le bec noir, aussi bien que les jambes & les pattes: le sommet de la tête, le derrière du cou, le dos, le croupion, les ailes, & la queue sont d'un brun verdâtre, ou couleur d'olive foncé: la pointe des plumes qui couvrent le dessous des ailes sont d'un jaune éclatant, de même que tout le dessous de l'Oiseau, depuis le bec jusqu'à la queue: il a une barre brune qui passe au travers de l'oeil, tant au dessus qu'au dessous de laquelle il est jaune: il a une autre barre brune, qui s'étend du coin de l'ouverture du bec sur la joue.

M. Browne, M. D. avoit apporté ces Oiseaux de l'isle de la Jamaïque: les habitants de l'isle appellent la Poule d'eau Bidy-bidy, en imitation du bruit qu'elle fait. Je crois que cet Oiseau a été inconnu jusques à présent: il n'y a rien qui en approche dans la Jamaïque de Hans Sloane *). Pour ce qui est du Roitelet jaune, je crois qu'il a été dessiné & décrit par divers auteurs sous différents noms **). Catesby dit que ces Oiseaux sont de petits à la Caroline, & qu'ils s'en retirent à l'approche de l'hiver ***). J'en ai une figure colorée, qui me vient de Hollande, ou d'Allemagne, qui porte le nom de Wistling. Je crois aussi que j'ai reçu le même Oiseau de Bengale dans les Grandes Indes: de sorte que cette espèce me paroît répandue presque dans toutes les parties du monde connu; & peut-être que dans chaque endroit, c'est un Oiseau de passage. Je crois que c'est l'*Oenanthe fusco lutea minor* de Hans Sloane ****). Comme M. Willughby ne lui a point donné de nom Anglois, j'ai jugé à propos de le nommer Roitelet jaune, au contraire de Catesby, qui le met dans la classe des Mésanges, ce qui me paroît peu naturel, puisqu'il a le bec long & menu; au lieu que les Mésanges l'ont plus court & moins aigu.



TAB. LXIX.

*) V. ce que Browne dit de la petite Poule d'eau dans son Hist. de la Jamaïque p. 479.

**) V. le *Regulus non cristatus* de Willughby p. 228. c'est à dire, le Roitelet sans huppe.

***) Catesby tom. I. p. 63. l'appelle Mésange jaune.

****) Hans Sloane. Hist. de la Jam. tom. II. p. 310. Et l'Abregé de Kay. pag. 186.

Das kleine Wasserhuhn und der gelbe Zaunkönig. Tab. LXVIII.



G. Edwards ad viv. delin.

*J. M. Schumann excudit.
Cum Priv. Sac. Caes. Majestatis.*

Joh. Sebast. Leitner sculps.

*Gallinula Chloropus minima. N.º 68. VIII.º Theil.
Regulus luteus.*

*La Petite Poule d'eau;
et Le Roitelet jaune.*





Der Americanische Wasserschneepf oder Nachtelkönig. Tab. LXIX.



J. Edwards aet viv. delin.

*J. M. Seligmann excudit.
Cum Priv. Sac. Caes. Majestatis.*

Joh. Sebast. Leitzner sculps.

Rallus aquaticus Americanus. N° 69. VIII^{ter}. Theil. Le Râle d'eau d'Amérique.



Die langschwänzige Ente aus Neufoundland,
und das Wasserhuhn mit gespornten Flügeln.

Tab. LXX.



J. Edwards ad viv. delin.

*J. M. Seligmann excudit.
Cum Priv. Sac. Caes. Majestatis.*

Joh. Sebast. Leitner sculp.

Anas cauda longissima ex New- N^o 10. VIII^{ter} Theil. Le Canard à longue queue de Terre-
foundland. *Pluvialis alis calcare donatis.* neue. et Le Pluvier à ailes éperonnées.

Le RALE D'EAU D'AMERIQUE.

Cet Oiseau est représenté ici de sa grosseur naturelle: il a été gravé sur la planche immédiatement d'après l'Oiseau même.

Le bec est tant soit peu courbé en forme d'arc: il est cannelé aux côtés de la mâchoire supérieure, & les naseaux sont placés dans ces cannelures: il est en general d'une couleur rembrunie, mais il est rougeâtre vers la base de la mâchoire inférieure; la base du bec forme sur le devant de la tête un petit espace sans plume comme au Foulque & à la Poule d'eau: le sommet de la tête est noir ou rembruni: les côtés en sont couleur de cendre; il y a une petite barre blanche au dessus de chaque oeil: le haut de la gorge est blanc aussi: le derrière du cou & le dos sont couverts de plumes, dont le milieu est noir, & les bords d'un couleur jaunâtre: le devant du cou est aussi bien que l'estomac, d'un orange obscur: les plumes qui couvrent les ailes sont d'un brun rougeâtre: les pennes pres du dos, & les plumes de la queue sont d'un brun obscur, avec la pointe canelle ou jaunâtre, comme les plumes du dos: les grandes pennes sont tout-à-fait noires ou d'un brun très foncé: le bord de l'aile est blanc: les plumes de couverture du dessous des ailes, sont brunâtres avec les pointes blanches, assez avant pour les faire paroître blanches à l'extérieur: le dessous des pennes est couleur de cendre: les côtés sous les ailes, le bas ventre, & les cuisses sont d'un brun foncé, avec des barres blanches transversales: les couvertures du dessous de la queue sont blanches, noires & orange: les jambes sont sans plumes au dessus du genou: l'orteil du milieu est aussi long que la jambe: les jambes & les pattes sont d'un couleur de chair foncé.

Cet Oiseau m'a été envoyé de Pensylvanie par M. Bartram: il est exactement de la grosseur & de la taille de notre Rale d'eau Anglois; & à peine en diffère-t-il en quoique ce soit, qu'en ce qu'il a le cou & l'estomac rougeâtres, au lieu que le nôtre les a d'une couleur de cendre, ou gris de fer, tirant sur le bleu. Cet Oiseau n'avoit point encore été dessiné ni décrit; quoique j'aye peine à me persuader qu'il diffère spécifiquement du Rale d'eau Anglois, malgré la différence des couleurs.

TAB. LXX.

Le CANARD à LONGUE QUEUE de TERRE NEUVE: & le PLUVIER à AILES ÉPERONNÉS.

Le Canard à longue queue est à peu près de la grosseur de notre Vignon: La grandeur naturelle en a été réduite, pour l'accommoder au format de la planche. Voici les principales dimensions selon le naturel: depuis la pointe du bec jusqu'aux angles de l'ouverture, au dessus d'un pouce & demi: l'aile étant fermée a huit pouces de long les jambes depuis le genou en bas n'ont pas tout-à-fait un pouce & demi: l'orteil du milieu en a un peu plus de deux: les plumes du milieu de la queue ont plus de huit pouces de longueur.

Le bec est noir, excepté une barre rouge, qui en traverse la mandibule supérieure entre les naseaux & la pointe: les bords en sont dentelés profondément; quant au reste, il est fait comme la plupart des autres Canards: le devant & les côtés de la tête, avec les côtés du cou sont d'un gris tirant sur la couleur de chair: le derrière de la tête & du cou est blanc, de même que la gorge & le commencement de l'estomac: il a une grande tache noire ovale sur chaque côté de la tête, ou sur le commencement du cou: le milieu du dos, & les plumes qui couvrent les ailes, sont d'un noir lustré: les pennes du fouet de l'aile, & les quatre grandes plumes du milieu de la queue, sont noires, ou d'un brun fort obscur: les pennes intérieures, c'est-à-dire celles d'auprès du dos, sont d'un brun rougeâtre foncé: le dessous des ailes est tout d'un brun obscur: l'estomac



est d'un noir téné, & cette couleur tournant en forme d'anneau va se joindre au noir du dos : les côtés sous les ailes, les cuisses, le ventre, & les plumes qui couvrent le dessous de la queue sont d'un beau blanc, comme aussi les plumes extérieures de chaque côté de la queue, avec leurs ouvertures : il sort de chaque épaule un bouquet de plumes blanches, longues & étroites : ces deux bouquets de plumes s'étendent entre le dos & les ailes de chaque côté presque jusqu'au commencement de la queue : les jambes & les orteils sont d'un rouge obscur : les membranes des pattes sont noires : il y a une membrane, ou espèce de petite nageoire latérale au côté de chaque orteil inférieur, & au dessous de chaque petit orteil de derrière.


Ce Canard avoit été pris en Amérique sur les bancs de Terre-neuve où l'on pêche. Il est actuellement (1754.) conservé sec dans le cabinet de M. Furzer, de la Nouvelle Cour à Londres, qui m'en a obligeamment permis l'usage : la figure (a) a été gravée sur la planche immédiatement d'après nature. Je ne fais, si cet Oiseau ne seroit point de la même espèce que le Canard à longue queue de la Baie de Hudson, représenté dans mon Histoire des Oiseaux Part. V. Tab. LI. En les comparant, je pense que ce pourroit bien être le mâle & la femelle, parceque leurs dimensions, & la forme de leur bec & de leurs pattes se ressemblent de fort près : mais je soumets cette conjecture aux recherches futures des Naturalistes. Je crois que je suis le premier, qui ait donné la figure & la description de ce Canard.

Le Pluvier aux ailes éperonnées est réduit de sa grandeur naturelle, à peu près dans la même proportion que le Canard : il est de la grosseur de notre Vanneau, mais il a les jambes plus longues à proportion : les ailes étant fermées ont sept pouces de long ; les jambes, depuis le genou jusqu'au bas du talon, en ont trois.

Le bec est noir : le sommet de la tête est couvert de plumes d'un noir lustré, qui sont languettes, & propres, à ce que je crois, à s'élever en huppe : la gorge est noire aussi : les côtés de la tête sont blancs : le cou est blanc aussi tout au tour : le dos & toutes les plumes qui couvrent les ailes, sont par dessus d'un gris de souris, plus foncé sur le dos, plus clair sur les ailes, & plus clair encore à l'extrémité des barbes des plumes du bord des ailes, où elles tombent sur l'estomac, & sur les grandes plumes, qui sont noires : les autres plumes, qui sont près du dos, sont de la même couleur : les plumes qui couvrent le dessous des ailes, & les côtés de l'Oiseau sous les ailes, sont blancs : chaque aile a, au dessous de la première jointure, un éperon pointu, d'une substance semblable à de la corne : l'estomac est noir en descendant en bas jusqu'aux cuisses : les cuisses, le bas ventre, & les plumes qui couvrent la queue, tant dessus que dessous, sont blanches : les plumes de la queue sont blanches depuis la racine jusqu'au milieu ; l'autre moitié est noire, excepté que les plumes extérieures de chaque côté ont la pointe blanche : les jambes sont sans plumes au dessus du genou : il n'y a point d'orteil de derrière : les jambes, les pattes, & les ergots sont noirs : l'orteil extérieur tient à celui du milieu, vers le bas, par une membrane.

M. Ruffel, M. D. qui est à présent à Londres, & qui a demeuré bien des années à Alep, en apporta cet Oiseau en 1754. dont il m'a très obligeamment permis de me servir. Je crois qu'il est de la même espèce que celui dont j'ai donné la figure, dans mon Histoire des Oiseaux, Part. II. Tab. XCIII. & que j'ai nommé, le Pluvier des Indes à gorge noire. Je ne découvris point alors d'éperons aux ailes, quoique je ne doute point qu'il n'y en eût : car je ne les aurai pas découverts non plus dans celui-ci, si l'on ne m'en eût pas averti, avant que je me misse à le dessiner. Ma figure précédente diffère un peu de celle-ci, à l'égard du plumage, en ce que la marque noire de la gorge est jointe dans la première avec le noir de l'estomac, & en ce que le noir a un lustre éclatant, de vert sur la tête, & de pourpre sur l'estomac ; ce qui me porte à croire, que celui-là étoit le mâle, & que ce dernier est la femelle. Je n'aurais pas fait une nouvelle figure, si je n'eusse pas découvert les éperons, qui sont uniformes aux deux ailes. Cet Oiseau est commun sur la rivière aux environs d'Alep.

Paul Lucas, dans son Voyage du Levant Tom. III. p. 7. Rouen 1719. 3. tom. 12mo. donne un détail fort singulier d'un Oiseau, qu'on trouve sur le Nil, & qui paroît être de la même espèce que celui-ci : c'est pourquoi je vais transcrire ce qu'il en dit, pour divertir le lecteur. „Cet Oiseau est comme un Pluvier, & à peu près de la même grosseur : il voltigeoit & entroit dans la gueule beante des Crocodilles, qui dans la Haute Egypte surnagent étendus sur l'eau : ils étoient tout vis-à-vis de la barque de notre auteur. „Après y avoir été quelque temps, les Crocodilles fermoient la gueule & la rouvroient „presqu'aussitôt pour les en laisser sortir. On me dit, que ces Oiseaux, dont il y avoit „un très grand nombre, se nourrissoient de ce qui restoit entre les dents de cet animal, lesquelles ils curoient avec leur bec ; & que comme ils ont au haut de l'aile une espèce „d'éperon, ou d'épine fort pointue, ils piquent le Crocodile, & le tourmentent quand „il a fermé la gueule, jusqu'à ce qu'il l'ouvre & les laisse aller. C'est ainsi qu'ils se tirent du „danger où ils se trouvent. Ces Oiseaux sont vraisemblablement ceux que Pline appelle Trochilos. Beitar, auteur Arabe, raconte une histoire semblable d'un Oiseau qu'il ne nomme „point, „J'en ai reçu un autre qu'il peut être venu de la Haute Egypte, qui est à peu près dans la même latitude.



Vier Schnäbel von sehr raren und wenig bekannten Tab. LXXI.
Vögeln.



G. Edwards ad viv. delin.

*J. M. Seligmann exaudit.
Cunv Priv. Sac. Caes. Majestatis.*

Joh. Sebast. Leitner fecitps.

Rosstra quatuor curiosa Avium, N^o 71. VIII^{ter} Theil. Quatre Becs d'Oiseaux peu connus.
et quodammodo adhuc incognita.

QUATRE BECS d'OISEAUX PEU CONNUS.


Ces Becs sont tous d'une figure fort extraordinaire: celui, d'en haut marqué, A, est représenté aussi grand que le naturel; les trois autres, B. C. & D. sont réduits à la moitié de leurs dimensions propres, ce qui les amène à la huitième partie de leur grosseur naturelle.

Le Bec marqué A est aussi large qu'il est haut, vers les angles de l'orifice; mais il se retrecit ou se comprime de côté tout d'un coup, & devient très mince à l'extrémité: la mâchoire inférieure en particulier, l'est à tel point qu'elle est transparente, & qu'étant couchée sur de l'écriture, on peut lire au travers: elle est coupante des deux côtés, & pliante comme un couteau de peintre: la mâchoire supérieure est plus courtée que l'inférieure, ayant une petite rainure, où celle-là s'introduit dans le manche: ce Bec est par tout d'un couleur de corne clair. L'Oiseau entier a été décrit par CATESBY, dans son Hist. de la Caroline &c. tom. I. p. 90. sous de nom de LARVS MAIOR ROSTRO INÆQUALI, qu'on a rendu en François par le Coupeur d'eau. Cet Oiseau tel qu'il l'a dépeint est noir sur le dos, & blanc sur le ventre: ses jambes & ses pattes sont rouges: son bec est de cette même couleur à la base, & noir à la pointe. Petiver a aussi donné la figure du bec de cet Oiseau, dans son GAZOPH. Pl. LXXVI. fig. 2. Il n'en dit rien, si non qu'il le nomme AVIS CAROL. ROSTRO CVLTRIFORMI, c'est-à-dire, Oiseau de la Caroline au bec en forme de rasoir, V. son Catalogue, 541. C'est le même que l'Oiseau appelé par Ray, dans son Synopsis Avium p. 194. Pl. I. fig. 5. la Corneille de Mer de Madras.

La figure B. représente le Bec du Corbeau cornu des Indes, qu'on appelle aussi Rhinoceros, & que je ne trouve bien dessiné nulle part. Il n'est pas nécessaire que je dise rien de sa forme, puisque j'en donne ici le profil tiré immédiatement d'après nature, avec beaucoup d'exactitude: il est d'un couleur de corne jaunâtre, excepté que la base de la mandibule supérieure, & la corne qui est dessus, sont ombragées de rouge vers la tête: la base du Bec, aussi bien que celle de la corne, est entourée d'un cercle noir: il y a aussi une barre noire de chaque côté de la corne, & les bords dentelés du bec sont de la même couleur. Il est rare que ces Becs se ferment exactement; ce qui vient, à ce que je suppose, de ce qu'ils se dejettent en se desséchant: les naseaux sont à la base de la mâchoire supérieure, tout près de l'ouverture des yeux: la corne est, vers la base, aussi large qu'elle est haute. J'ai par devers moi deux de ces Becs de la même espèce: l'autre diffère de celui que je décris, en ce que la corne s'élève droit en haut, sans se renverser ou pencher du tout; & en ce qu'elle est plus comprimée de côté & d'autre vers la pointe, n'ayant point non plus de lignes noires aux côtés, & n'y ayant point non plus de noir aux bords dentelés du Bec. Je crois que ce sont les Becs du mâle & de la femelle. Ils sont extrêmement légers à proportion de la grosseur, le dedans étant plein de séparation ou cellules osseuses fort minces, en forme de rayons de miel, mais irrégulières. Ces Becs viennent de l'Isle de Sumatra, d'où ils avoient été apportés par un de mes amis le Capitaine Isaac Worth, qui m'en fit présent il y a quelques années. On trouve dans plusieurs auteurs d'Histoire Naturelle des détails courts & obscurs de ces Oiseaux, qu'il faut que le temps éclaircisse.

Le Bec marqué D. est d'un autre Oiseau du même genre que celui qu'on vient de décrire, mais plus petit, & d'une espèce différente: la corne ou le bouton, qui est sur le dessus du Bec, est d'une substance légère & spongieuse, comme celui qu'on vient de décrire; assez large & épais vers la tête, & tranchant vers le bout, en forme de coin. Tout le Bec en général, est d'un couleur de corne clair: la base de la mâchoire inférieur est un peu teinte de rouge: la base, tant du bec que de la corne est noire: les bords dentelés de deux mâchoires sont noirs: la pointe de la mâchoire supérieure est de même couleur, aussi bien que le bout antérieur de la corne: les naseaux sont placés entre le bec & la corne, près de la base du bec, qui est assez épais vers la base, mais comprimé de côté vers la pointe. Petiver a donné dans son Gazophyl. Nat. & Art. Pl. 31. fig. 1. la figure de la mâchoire supérieure & de la corne de cet Oiseau. Il dit que le Pere Kamel lui avoit envoyé ce dessin avec son manuscrit des Oiseaux des Isles Philippines, qui est à présent imprimé dans les Transactions Philosophiques Nro. 285. Petiver a aussi Pl. 28. fig. 6. donné une figure de tout l'Oiseau, mais peu exacte. Le Bec que je donne a été dessiné immédiatement d'après nature. On trouve dans les livres d'Histoire Naturelle une grande variété de Becs de cette famille d'Oiseaux, quoique nous ne connoissons presque point les Oiseaux mêmes. Mr. H. Baker, Membre de la Société Royale, m'a prêté ce Bec ci.

Le Bec marqué C est d'un Oiseau qui nous est inconnu: je le tiens de Mr. Furzer, de la Nouvelle Cour à Londres, qui me l'a obligeamment prêté, & qui m'a dit qu'il venoit de l'Isle de Sumatra dans les Indes Orientales, où on l'appelle d'un nom qui signifie en langage du pays l'Oiseau amical des bois, parcequ'il defend & ga-



rantit de danger ceux qui s'endorment dans les forêts: il paroît appartenir à une classe différente des deux dont on a donné la description ci-dessus: puisque le bouton du dessus du bec est d'une forme convexe aplatie en devant, où il est d'une couleur blanche: le reste en est rouge: le Bec entier est fort pesant, & le bouton paroît être d'une substance osseuse solide: les naseaux se voient dans la figure par delà le bouton: le bec est d'un blanc sale vers la pointe, avec quelques taches brunâtres, & un peu dentelé vers le bout de la mâchoire supérieure: la partie la plus grosse du bec, de blanche devient graduellement rouge vers la tête, où il est cannelé, ou fillonné, comme on le peut distinguer par la figure. Je m'imagine que ce Bec est très rare, n'en ayant point encore vu de semblable, & je crois que c'est ici la première figure qu'on en ait jamais publiée.

TAB. LXXII.

Le POISSON ÉPERONNÉ, & le GATTORUGINA des INDES.

On voit ici ces Poissons représentés de leur grandeur naturelle; ni l'un ni l'autre, à ce que je crois, n'avoit point encore été dessiné, ou décrit.

J'appelle Poisson éperonné le plus grand de ces deux Poissons, à cause de deux aiguillons extraordinaires, pointus & dentelés, qu'il a l'un sur le dos, & l'autre en dessous vers la queue. Ce poisson étoit sec: après l'avoir fait tremper dans de l'eau, pour lui rendre en quelque sorte la couleur qu'il avoit quand il étoit vivant, il me parut de celle d'un Harang; c'est-à-dire, verdâtre le long du dos, & d'un blanc pourpre bleuâtre sur le ventre: pendant qu'il étoit humide, les éperons pouvoient s'élever perpendiculairement aux lignes du dos & du ventre, ou s'abaisser jusqu'à être presque parallèles aux mêmes lignes. il a une barre latérale de chaque côté marquée sur les écailles, depuis la tête jusqu'à la queue: le front est extraordinairement élevé ou bouffi: la gueule se tourne un peu en haut: les naseaux sont placés à une petite distance au dessus de la gueule: il a de chaque côté derrière les yeux une grande écaille osseuse, qui a l'apparence, d'une oreille, quoique elle soit fermement attachée à la tête par dessous: on en peut voir la forme & la radiation dans la figure: il a le corps couvert de grandes & fortes écailles: chaque écaille paroît rayonnée, par le microscope, de la même manière que les grandes écailles de derrière les yeux: pour ce qui est des ouïes, qui sont rougeâtres, il faut consulter la figure: il regne sur le milieu du dos, depuis l'éperon supérieur presque jusqu'à la queue, une nageoire rougeâtre: la queue ayant été un peu rompuë, quand elle étoit sèche, je l'ai retablie par conjecture: la ligne oblique, qu'on voit dessus, marque ce que j'ai suppléé: il a vis-à-vis des ouïes en dessous, deux nageoires longuettes & étroites: il en a deux autres sur le ventre, mais un peu plus petites: l'éperon inférieur est placé près de l'anus, d'où part une seule nageoire, qui s'étend presque jusqu'aux fibres de la queue, qui est rougeâtre, aussi bien que les nageoires inférieures: ce Poisson a le corps assez épais.

Je nomme l'autre Poisson, qui est plus petit, *Gattorugina Indica*, à cause de sa ressemblance au Poisson figuré par Willughby de *Piscibus tab. II. 2.* qu'il appelle *Gattorugina Venetiis*; il est en forme d'arc par le dos, & il n'a qu'une seule nageoire, qui regne sur le milieu du dos depuis la tête jusqu'à la queue: il est creux du côté du ventre, selon la forme intérieure d'un arc: il n'a point de dents, ou du moins, s'il en a, elles sont extrêmement petites: le dessous de la tête est marqué aussi bien que les ouïes, de taches rondelettes obscures: les ouïes sont dentelées par les bords, & tout près d'elles pendent en dessous, deux cordons, chacun desquels se divise en deux branches, qui finissent en pointé: depuis environ le milieu du ventre jusqu'à la queue, il n'a qu'une seule nageoire, d'une structure différente de celle qui est sur le dos, ce qui se conçoit mieux par la figure: la queue ressemble par ses fibres, à la nageoire de dessus le dos: il a aussi une nageoire longuette de chaque côté tout contre les ouïes: les lignes de côté & d'autres interrompent & forment chacune un angle, comme la figure le montre: les écailles sont si petites, que l'œil ne peut les appercevoir; mais on voit sur les côtés une petite denteleure, composée de lignes ondées, telles que la figure les représente. Ce Poisson est extrêmement comprimé par les côtés, excepté vers la tête, où il est plus large: on l'avoit préservé dans de l'esprit de vin, & il paroissoit d'un couleur de chair effacé.

Le Poisson éperonné m'a été communiqué par un de mes amis M. Jos. Ames, qui m'a dit qu'il venoit du cabinet de feu M. C. Holmes, Garde de Registres de la Tour de Londres; mais je n'ai pu savoir de quel pays il étoit. Le petit Poisson appartenoit à feu M. Mortimer, M. D. Secrétaire de la Société Royale, qui me le prêta, en me disant qu'il venoit des Indes Orientales. Il diffère un peu du *Gattorugina Venetiis* de Willughby, comme on peut le voir en en comparant les figures & les descriptions.

Der Spornfisch, und der Indianische Gattorugina. Tab. LXXII.



G. Edwards ad viv. delin.

*J. M. Seligmann exaudir.
Cum Priv. Sac. Caes. Majestatis.*

Joh. Sebast. Leitner sculp.

*Gattorugina Indicus, et
Piscis calcaribus praeditus.*

Nº 72. VIII^{ter} Theil.

*Le Poisson éperonné; et
Le Gattorugina des Indes*



Die See-Fledermaus, und der schwarz und weisse Acarauna. Tab. LXXIII.
oder Indische Plattfisch.



J. Edwards, ad viv. delin.

*J. M. Seligmann executit.
Cum Priv. Sac. Caes. Majestatis.*

Joh. Sebaſt. Leitner ſculps.

Piscis Vespertilio marinus dictus. N^o 73. VIII^{ter} Theil.

Acarauna maculata.

*Le Chauve souris de Mer; et
L'Acarauna noir et blanc.*


La CHAUVÉ SOURIS DE MER, & L'ACARAUNA NOIR ET BLANC.

Ces Poissons sont dessinés d'après nature, & de leur Grandeur naturelle: N. 1. 2. 3. représentent trois différentes vues de la Chauve souris de Mer.

La Chauve souris de Mer, conservée dans de l'esprit de vin, m'a paru être partout d'un brun obscur: je crois qu'elle appartient à la classe des Raies, ayant l'apparence d'être cartilagineuse: la figure n. 1. en représente une vue de côté montrant la queue dans sa vraie direction, avec les petits nageoires, qui y sont tant dessus que dessous, comme aussi la gueule, avec le museau ou la corne, qui est au dessus. La figure 2. représente le dos du Poisson; & figure 3. en montre le dessous ou le ventre, où paroissent deux nageoires placées à peu près comme les jambes de devant des quadrupèdes; on y voit aussi les deux principales nageoires postérieures, qui ressemblent un peu aux jambes de derrière des animaux à quatre pieds: la peau du dos, de même que celle d'autour des côtés est rude comme du chagrin, parsemée de plus grandes élévations pointuës: la peau du ventre est plus douce & plus unie que celle du dos: c'est le GUACUCUIA de Pison & de Willughby, & la Chauve souris de Browne *Nat. Hist. of Jamaica*, pag. 457. pl. XLVIII. fig. 3. La figure de Pison ne vaut rien; elle donne fausement à ce Poisson une queue horizontale.

L'Acaraua est le plus grand Poisson représenté dans la planche, & marqué figure 4. Il est assez comprimé par les côtés, sur tout vers la queue, la tête étant un peu plus épaisse: la gueule est petite: les dents sont longues & fort menuës: les naseaux sont situés, près des yeux: les ouës de chaque côté ont un éperon pointu, & sont denticulées par le bord: il a deux nageoires, une de chaque côté, derrière les ouës, & deux plus petites sur le ventre: il a sur le milieu du dos une nageoire, qui régné depuis la tête jusqu'à la queue, & qui finit en angles: il a tout de même une seule nageoire, depuis le milieu du ventre jusqu'à la queue, & qui finit aussi en angle: ces nageoires sont de différente structure; les fibres en sont plus fortes vers la tête, que vers la queue, comme la figure l'exprime: la queue est de grandeur médiocre: la tête & le devant du Poisson, avec les deux paires de petites nageoires de devant, & la queue sont blanches: la grande nageoire inférieure est aussi bordée de blanc: la nageoire supérieure est blanche au commencement & bordée de blanc depuis l'angle jusqu'à la queue: la partie postérieure du corps & les grandes nageoires sont d'un pourpre foncé obscur. La figure 5. représente une écaille de ce Poisson ôtée de sa place vue par le microscope: le haut en est la racine: les écailles sont fortes & fermes. Ce Poisson est du genre que Pison & Willughby appellent Acarauna, mais d'une espèce différente de ceux qu'ils ont décrits: il n'y paroît point de lignes latérales.

M. Jos. Ames m'a prêté la Chauve souris de Mer: l'autre Poisson est au nombre des curiosités que j'ai rassemblées dans mon cabinet: ils sont l'un & l'autre du Brésil, ou des Iles qu'on appelle communément les Indes Occidentales.



Le POISSON CORNU, & le SCORPION de MER.


J'ai dessiné ces Poissons d'après nature, & de grandeur naturelle: le Poisson cornu étoit dans de l'esprit de vin quand je l'ai dessiné: l'autre étoit frais.

Le Poisson cornu est de forme carrée irrégulier le côté du dos est le plus étroit, & celui du ventre le plus large: tout le corps est enfermé dans une espèce d'étui épais, fort, & d'une substance assez semblable à de la corne, qui est fixe & ne se plie point du tout: la surface extérieure en est divisée, par des lignes; en figures hexagones, ou à six côtés, avec une espèce d'étoile au milieu de chaque figure: tout la couverture étoit rembrunie, mais l'iris, ou le tour des yeux conservoit sa couleur d'orange: la gueule est petite: les dents sont longues & menues: il lui sort au dessus des yeux deux cornes en avant; & il en sort deux autres de chaque coin du plan du ventre, qui pointent en arrière: les deux figures en petit, marquées A & B, en montrent le dos & le ventre, pour mieux éclaircir cette description: il y a deux nageoires à l'opposite l'une de l'autre, l'une étant placée sur le bas du dos, & l'autre en dessous, au de là de l'anus: la queue a aussi une nageoire assez longue: toutes les nageoires, de la même que la queue, sont lâches & pliantes, y ayant, dans la couverture, des trous par où elles passent. Après avoir ouvert ce Poisson, je n'y ai point trouvé de grande arrête au milieu, comme dans les autres Poissons, ni même aucune arrête; mais au lieu de cela, des substances cartilagineuses, communiquant avec les nageoires & la queue, pour les mettre en mouvement. Ce genre comprend une très grande variété de Poissons,

Le Scorpion de Mer est représenté par la figure inférieure de la planche: la gueule est assez grande, & sans dents: l'iris de l'oeil est d'un beau rouge: les nageaux sont placés un peu devant les yeux: le milieu de la tête est applati: mais on voit au dessus de chaque oeil un rebord en forme de filon, d'où sortent des dents, ou elevations pointuës: les ouïes ont de chaque côté à leurs bords des éperons pointus, d'une substance semblable à de la corne, qui pointent en arrière, ce qui à ce que je suppose est la raison du nom qu'on lui a donné: le corps est presque aussi large que haut, car c'est un Poisson fort épais: le ventre est d'un blanc argenté, nuancé d'un peu de rouge: le dos est d'un brun obscur, parsemé de petites taches noires, & nué de plus grandes marques d'un noir moins obscur: la couleur obscure du dos, & la couleur claire du ventre se joignent d'une manière confuse & dentelée: il a une ligne latérale depuis la tête jusqu'à la queue, & deux nageoires sur le dos: il en a aussi une au dessous par de là l'anus, outre la queue: elles sont composées de tissus ou membranes transparentes: les épines ou fibres qui les étendent & les supportent sont orange & noir: les nageoires de derrière les ouïes sont orange, les épines en sont tachetées de noir: il a sous le devant du ventre une paire de nageoires étroites & languettes, qui sont blanchâtres, chacune des quelles n'a que trois fibres. Ce Poisson étoit frais quand je l'ai dessiné, & il déposoit ses oeufs: chaque oeuf étoit de la grosseur d'un grain de navette, & fort rouge: il avoit été pris au mois de Janvier.

Mr. I. Fothergill, M. D. m'a fait le plaisir de me prêter le Poisson cornu, qui avoit été apporté de l'isle de Madagascar: je n'ai encore rien vu de publié qui y ressemble. Willughby dans son livre de PISCIBUS (des Poissons) a donné une figure qui se rapporte assez à la mienne, mais de surface toute différente, qui est marquée irrégulièrement: il appelle PISCICULUS CORNUTUS (petit Poisson cornu). Le Scorpion de Mer avoit été pris à l'embouchure de la Tamise, parmi des Melettes: il paroît un peu différent de ceux que Willughby, Pl. II. 4, & Pl. X. 12. 13. 15. donne sous ce nom. J'en ai aussi rencontré la figure parmi des estampes, où on le nomme PORCELLUS.





g. Eduardo ad viv. detin.

Pisciculus cornutus.
Scorpius marinus.

J.M. Seligmann exaudir.
Cron Priv. Sac. Caes. Majestatis.
N^o 74. VIII^{ter} Theil.

Joh. Sebast. Lechner sculp.

Le Poisson cornu; et
Le Scorpion de Mer.

Der große Girschkäfer und das pfeiffende Insect.

Tab. LXXV.



G. Edwards aed. riv. delin.

Blatta maxima.
Insectum Fistula dictum.

J. M. Seligmann exaudito.
Cicero Priv. Sac. Caes. Majestatis.

N^o 75. VIII^{ter} Theil.

Joh. Sebast. Leitner sculps.

Le Grand Cerf-volant;
et Le Scarabée sifflant.

Le GRAND CERF-VOLANT, & le SCARABEE SIFFLANT.

Ces insectes ont été dessinés d'après nature, & sont représentés sur la planche de leur grandeur naturelle.

Le Cerf-volant est représenté par les deux figures supérieures de la planche; l'une en fait voir le dos, & l'autre le ventre: la tête est couverte d'une espèce de bouclier, qui est gris blanc par les bords, & noir au milieu: de ce bouclier en partent deux autres, de la même couleur claire par les bords, & brun foncé au milieu, lesquels ont l'apparence de deux courtes ailes, qui servent en partie à couvrir le dessus du corps: l'abdomen, ou la partie inférieure du corps est d'un brun rougeâtre: elle est composée d'environ huit anneaux. Cet insecte est fort plat, & dentelé aux côtés en forme de scie. On ne voit la tête que de bas en haut; elle est noire, excepté les yeux qui sont isabelle: les cornes sont d'environ deux pouces de long: il a six pattes, qui sont d'un brun rougeâtre, & qui ont chacune trois jointures; celles de contre le corps sont unies, celles du milieu sont couverts de piquants fort aigus, les dernières jointures, ou les pattes, sont rudes ou velues, & ont au bout deux griffes piquantes.

Le Scarabée sifflant est représenté au bas de la planche sous trois différents points de vue. La tête est faite comme celle de la fauterelle: le corps antérieur, ou le thorax, est entouré d'un nombre de pointes aiguës; la partie postérieure du corps, ou l'abdomen, est composé d'environ dix anneaux, & finit par deux piquants: il a six pattes, qui ont chacune trois jointures; celles qui sont proche du corps sont unies, les jointures du milieu ont quelques petits piquants; les dernières jointures, ou les pattes, sont divisées en parties plates rondelettes, qui sont pliantes; chaque patte a au bout deux petites griffes: il est noir sur le dos, marqueté d'orange: le dessous est orange; les jambes sont de la même couleur, excepté quelque peu de noir vers les jointures: les cornes sont brunes.

Le Grand Cerf-volant avoit été apporté de la Caroline par M. Catesby, qui dans son Appendix, ou Supplement à l'Hist. de la Caroline p. 10. l'appelle *Blatta maxima fusca peltata*. La raison pour laquelle je le redonne, c'est qu'il est très rare, & que cet auteur s'est un peu trompé dans son dessin que j'ai tâché à rectifier. Cet insecte m'est tombé entre les mains depuis la mort de M. Catesby.

L'insecte sifflant avoit été apporté de Sancta Crux en Barbarie par mon bon ami le Capitaine Dobson qui m'en a fait présent. Je l'ai nommé l'Insecte sifflant, parce qu'il ressemble beaucoup à un autre insecte, qui se trouve en Afrique, dont les habitants font des sifflets pour rassembler leur bétail: ces sifflets sont faits de toute la couverture de l'insecte, après en avoir ôté la tête, les pattes & le bout de la queue, & en avoir vidé le dedans: on a trouvé de ces écorces durcies & séchées pour cet effet, pendues au cou des habitants de la côté d'Afrique, qui est vis-à-vis de l'isle de Madagascar. J'en ai donné des figures, Part. VI. Tab. LXXIII. de cet ouvrage. Je ne fais point dans quelle classe d'insectes on doit ranger ce dernier. Je ne crois pas que jusqu'à présent on en ait donné de figure ou de description.



Le BALANUS de la BALEINE avec des Polypes, le LIMACON MARIN, la CRABE VELUË, & le CORAIL EN FORME D'ARRÊTE DE HARANG.

La lettre A indique le BALANUS avec une espèce de Polypes qui y sont attachés, & tous représentés de grandeur naturelle. La figure B. représente la base du Balanus, qui est un peu concave. C. montre la tête d'un des Polypes séparée du reste, pour en découvrir l'intérieur.

L'écaille du Balanus est hexagone, ayant aux angles une espèce de défenses : chaque défense est composée de quatre tuyaux joints ensemble, étroits & un peu ouverts par le haut, mais allant en grossissant vers le bas, de sorte qu'ils s'y entretouchent : chaque tuyau est entouré d'un grand nombre de petits anneaux ou de reinures, comme la figure l'exprime : l'espace qui est entre chaque tuyau est plus unie, mais non sans lignes visibles dirigées de la manière dont l'empreinte les représente. L'écaille est d'une couleur sale blanchâtre, fort large vers le bas, & plus étroite vers le haut, où il y a une ouverture, au milieu de laquelle paroît une espèce de Polype étendant ses fourchons d'une substance semblable à du cuir, & qui a assez l'air d'une manchette d'homme. Outre ce Polype, il y en a environ sept autres, d'une substance différente en apparence qui sont attachés par leur base, autour de l'ouverture, sur le dessus de la coquille : ils ont la tête ovale, avec des apparences d'oreilles, qui ont des cavités, & des issues dans la tête : les têtes sont attachées à la coquille par des tiges languettes, ou des cous. C. marque une de ces têtes séparée, & fait voir ce qui me paroît être plus particulièrement le Polype, qui ne semble pas être attaché au dedans de son étui, au côté duquel il y a une ouverture, par où le Polype étend ses bras, où ses fourchons. Ces Polypes étoient d'une couleur rougeâtre obscure.

La figure D. représente le *Limaçon Marin* ; c'est la coquille d'un insecte de mer, qui ne nous est connu dans un état plus parfait. Cette coquille est composée de huit parties, ou huit pièces jointes ensemble, aussi élégamment travaillées que si elles eussent été gravées : elle est relevée en bosse en dehors, & creusée en dedans. Je suppose que quand l'animal est en vie, il peut se rouler de lui-même en forme ronde. Quand la coquille est ouverte, elle est de la même forme & de la même grandeur que la figure : le dehors en est d'un brun foncé tirant sur le verdâtre ; le dedans en est blanchâtre ; nuancé en partie d'un vert bleuâtre.

E. montre la figure de la *Crabe veluë*, qui n'a rien d'extraordinaire, quant à la forme en général. La queue, que je représente étendue, a de coutume d'être tournée sous le ventre. Outre les deux grandes pattes ou ferres, elle a quatre plus petites pattes de chaque côté : les ferres sont dentelées aux deux endroits où elles se joignent, & quand elles sont jointes, elles ressemblent aux dents humaines du devant de la bouche. Cette Crabe est toute couverte d'une fine substance veluë, ou moussuë, d'un vert jaunâtre obscur, excepté le bout de toutes les pattes, qui est blanc. Elle ressemble si bien à la mousse, qui couvre les rochers & les pierres qu'on voit au bord de la mer, que je m'imaginais qu'elle se nourrit de petits vers & autres insectes, qui se tiennent parmi le vrac, lesquels peuvent se laisser tromper par l'apparence de cette Crabe, & par ce moyen deviennent sa proie.

F. représente une branche de *Corail* en forme d'*Arrête de Harang* dont les jets de chaque côté de la tige principale ressemblent beaucoup à une arrête de poisson. Elle est représentée au naturel, tant pour la forme que pour la grandeur. La couleur en est brune. Elle est venue de l'isle de St. Helene, dans la mer d'Etyopie.

Au reste A. est le BALANUS BALAEENAE de Lister *V. son Hist. des Coquilles tab. 445.* & le *Pediculus Ceti* Sc. de Sibbald. *V. Transact. Philosoph. N. 308.* Ces deux auteurs en ont donné la figure. Je crois que Lister n'avoit vu que la coquille vuide ; & Sibbald l'avoit vue avec deux des Polypes deséchés dessus : il a pris les figures apparentes d'oreilles pour des pattes, & il a supposé que le Balanus tenoit à la Baleine par ces pattes ; cependant je crois que toutes ces sortes de coquilles sont attachées par leur base. L'original, d'après lequel ma figure a été tirée, est actuellement conservé dans l'élégante collection de M. Isaac Romilly, Membre de la Société Royale, qui m'a fait le plaisir de m'en permettre l'usage. Il est conservé dans de l'esprit de vin, & c'est un très beau fujet. Mr. Romilly en a fait graver une magnifique empreinte, & y a ajouté une description fort exacte, que j'espère qu'il fera publier, & qui surpassera de beaucoup la courte description que j'en donne ici.

J'ai la coquille D. dans ma petite collection. Rumphius en a donné la figure. Ce qu'il en dit me fait croire qu'elle se trouve dans les isles des Indes Orientales. *Voi. la fig. 4. de la X. planche dans son Belgic ZEE-SLEKKE, où il l'appelle LIMAX MARINA, & par quelques noms Indiens.* La mienne a été achetée à une vendue à Londres. Seba en a deux figures. *Voi son Hist. Nat. tom. II. p. LXI. N. 3. & 4.*

E, la Crabe, est venue du Cap de Bonne Espérance, & est actuellement conservé dans la rare & précieuse collection de mon bon ami M. Jean Fothergill Médecin, qui me l'a prêtée pour la dessiner. Je ne crois pas que cette Crabe ait encore été décrite.

Die Wallfisch Seetulipe mit Polypen, die Seeschnecke,
der haarichte Krebs, und die Coralle in gestalt eines
herrung grätes.

Tab. LXXVI.



G. Edwards delin.



*J.M. Seligmann exaudir.
Cum Priv. Sac. Caes. Majestatis.*

Joh. Seb. Lechner sculps.

Balanus Ceti cum Polypis suis. N^o 76. VIII^{ter} Theil. Le Balanus de la Baleine avec des
Limaçon Marinus. Cancer hirsutus. Polypes, le Limaçon Marin, la Crabe
Corallina ossa Halecun æmulans. Veluë, et le Corail en forme d'Arrête,
de Harang.

Die kleine Morast Schildkröte.

Tab. LXXVII.



g. Edwards ad viv. delin.

Testudo parva lutoïa.

*J. M. Süssmann pinxit.
Cum Priv. Sas. Cas. Majestatis.*

Nº 77. VIII^{ter} Theil.

Joh. Sebast. Leitner sculps.


La Petite Tortue de Marécage.

La petite TORTUE de MARECAGE.

Voici trois vues de cette Tortue, de grandeur naturelle, ayant été toutes trois dessinées & gravées sur la planche, d'après le sujet même.

La tête, autour des mâchoires & des yeux, est d'un jaune rougeâtre : le haut de la tête, de même que la gorge & le cou, est brun : les pieds de devant ont chacun cinq orteils, avec des ongles pointus ; ceux de derrière n'en ont que quatre. Cette Tortue me paroît être du genre amphibie, ayant à tous les pieds des excrescences semblables à des nageoires : les jambes & les pieds sont couverts d'une rude peau brune. L'écaille de dessus est divisée en treize parties ou écailles, toutes d'une couleur brunâtre : celles là sont entourées de plus petites écailles, dont celles d'après de la tête & de la queue sont brunes, & celles des côtés sont d'un jaune rougeâtre. L'écaille de dessous est divisée autrement que celle de dessus, ce que la figure exprime mieux qu'une description ; elle est attachée à l'autre par les côtés, & a deux jointures ou deux charnières, par le moyen desquelles l'étui se ferme étroitement, quand la tête & les pieds sont retirés dedans. Le dessous est d'un brun obscur, nuancé vers les bords de l'écaille d'une couleur rougeâtre. Cet animal a une petite queue rembrunie, avec une pointe aigue d'une substance semblable à de la corne ; dont l'usage est, à mon avis, d'arrêter son mouvement à volonté, en la tournant la pointe en bas, lorsqu'elle s'avance sur le penchant des bancs de boue escarpés. On dit que cette Tortue a une forte odeur de musc, quand elle est en vie. Je m'imagine que c'en est ici une jeune, & qu'il y en a de beaucoup plus grandes de la même espèce. Elle n'avoit point encore été ni représentée ni décrite, à ce que je crois, jusqu'à présent, si ce n'est dans un Journal qui a pour titre *The Gentleman's Magazine*, pour Janvier 1758. où l'on en donne une figure fort inexacte &c. J'espère que mes figures la rectifieront un peu.

Ce sujet a été envoyé de Pensilvanie, par M. Bartram, à mon digne ami M. Pierre Collinson, Membre de la Société Royale, qui en toute occasion est prêt & porté de bonne volonté à me prêter obligeamment chaque nouveau sujet, qu'il reçoit des pays étrangers.



Le CHIEN DE MER EPERONNÉ, avec l'Insecte appelé le BATON MARCHANT.




Les fig. 1. 2. 3. représentent trois vuës du Chien de Mer. La fig. 4. représente le Baton Marchant. Ces figures ont toutes été gravées d'après les sujets mêmes, de grandeur naturelle.

Le Poisson est une espèce de Requin. Je suppose que, quand il a été pris, il étoit nouvellement né, parce qu'une partie du cordon du nombril lui tenoit encore au ventre. Il a les yeux grands, & sortant de la tête, de manière qu'on les voit & qu'ils voyent de tous les côtés. Les trois différentes vuës, qu'on en donne sur la planche, peuvent mieux faire comprendre sa figure en general, que des mots. Le dos en est d'une couleur bleuâtre, ou d'ardoise, avec de rondes taches blanchâtres: le ventre en est blanc nuancé de rouge. Il a de chaque côté une ligne latérale, qui s'étend depuis la tête jusques à la queue: ses naseaux sont doubles, & la gueule est sous la tête. Il a cinq fentes de chaque côté du cou, depuis les ouïes, comme tous les poissons du genre des Requins. Il a derrière les yeux de petites ouvertures, qui ont l'apparence d'oreilles. Il a deux paires de nageoires sous le ventre: le cordon du nombril est placé entre les deux de devant; & l'anus est situé entre ces deux de derrière, qui sont les plus petites. Il a deux simples nageoires sur le dos, dont la plus grande est sur le milieu; l'autre, qui est la plus petite, est placée derrière celle-là à quelque peu de distance: il y a à la racine de ces nageoires du dos, deux petits piquants ou éperons, qui deviennent beaucoup plus grands à proportion des nageoires, aux poissons qui sont plus vieux. *V. Willughby Hist. des Poissons, pl. B. 5.* Ces piquants donnent le nom au Poisson, & le distinguent principalement des autres sorts de Requins. La peau m'a paru fort douce au toucher, quoiqu'avec un microscope j'aye pu distinguer de petits grains, qui à mesure que le poisson grossit, peuvent rendre la peau rude. Je n'ai pu sentir les dents, quoiqu'on en pût appercevoir les rudiments, avec un microscope tant aux gencives, qu'à la partie supérieure de la machoire. La nageoire de la queue est d'une forme particulière, comme dans tous les autres poissons de ce genre. Les nageoires tant du dos que de la queue, sont bleuâtres bordées de blanc. On dit que ce poisson, aussi bien que toutes les autres espèces de Requins, n'a point d'arrêtes, mais des cartilages, comme le genre de Rayes.

La fig. 4. de la planche représente le *Baton Marchant*. Il ressemble si bien à un bâton sec, qu'il est à supposer qu'il trompe les oiseaux, & les autres animaux qui se nourrissent d'insectes. La partie la plus épaisse de cet insecte, fort près de la tête, où il a six pieds, est pleine de petites pointes ou épines, comme on en voit aux branches de plusieurs sortes d'arbrisseaux & d'arbres. La tête ressemble à celle d'une Sauterelle avec deux cornes. Il est divisé par jointures dans toute la longueur du corps: mais la dernière jointure ou division, qui est la queue, n'est que demi-ronde; elle est creuse, & paroît comme l'écorce qu'on auroit pelée d'un petit bâton. Celui-ci étoit d'un brun verdâtre; quoique je pense, qu'ils sont d'abord plus verts, & qu'ils changent graduellement avec l'âge, & suivant les saisons; de sorte qu'ils sont toujours à peu près de la couleur de la terre, de l'herbe, ou des arbrisseaux, où ils se tiennent. Il y a plusieurs différentes espèces de cet insecte, tant dans le vieux monde connu, qu'en Amérique. *Petiver a donné dans son Gazophyl. p. LX.* la figure d'une espèce différente de la mienne, qu'il appelle Petite Sauterelle du Bresil, en forme de Tuyau de Plume, & qu'on y appelle *Arumatia*. Cet insecte est vert, & a les jambes marquetées: le corps ressemble à une petite branche de bouleau, longue & menuë. *Marcgrave a donné dans son Hist. Nat. du Bresil. p. 251.* les figures de deux différentes espèces de cet insecte.

Les sujets originaux, d'après lesquels les figures de cette planche ont été tirées, sont venus du Cap de Bonne Espérance, dans de l'esprit de vin, & sont actuellement conservés dans le cabinet du célèbre M. Fothergill, Medecin, à Londres.

Der gespornte Seehünd nebst dem Insect so der ... Tab. LXXVIII.
Spazierstock genennet wird.



G. Edwards ad viv. delin.

*J. N. Seligmann exaudat.
Carm Priv. Sac. Caes. Majestatis.*

Joh. Sebest. Leitner sculp.

Galeus Acanthias, five Spinax Pilois. N^o 78. VIII^{ter} Theil. Le Chien de Mer eperonné, avec
l'Insecte appelé le Baton Marchant.



G. Edwards ad viv. delin.

Catulus major Piscis.

*J. N. Seligmann sculpsit.
Cum Priv. Sac. Caes. Majestatis.
Nº 79. VIII^{ter} Theil.*

Joh. Sebast. Leitner sculpsit.


Le Chat de Mer Major.

Le CHAT de MER Major.

Ces figures ont été travaillées sur la planche immédiatement d'après les sujets mêmes, & de grandeur naturelle. On suppose que les deux figures supérieures montrent la grandeur du poisson, quand il n'a encore que quelques jours : les deux figures inférieures le représentent au sortir de l'oeuf, partie de ce que l'oeuf contient, tenant encore à l'un d'eux par le cordon du nombril.

Le Chat de Mer est une petite espèce de Requin. Je crois en avoir vu dans la Manche, où nos matelots l'appellent Chien de Mer. La peau m'en paroît être celle dont nos Menuisiers &c. se servent pour polir & finir leurs ouvrages. Le dessus ou le dos est brunâtre, marqué en travers de barres irrégulières d'un noirâtre foncé. Le ventre ou le dessous est blanc. Il a des lignes latérales, depuis la tête jusqu'à la queue, quoiqu'assez difficiles à discerner. Les yeux ne sont point élevés, comme ceux du poisson qu'on vient de décrire; il n'a pas non plus la gueule si avant sous la tête. Les nageaux sont fendus jusques dans la gueule; & cinq fentes de chaque côté forment les ouïes. Il a sur le dos deux nageoires simples, l'une derrière l'autre, & il en a deux paires sur le ventre: l'anus est placé entre les deux de derrière. Il a outre celles-là une nageoire simple contre la queue, dont la nageoire est d'une forme particulière, ce que la figure fera mieux comprendre, qu'on ne peut le décrire: toutes les nageoires sont tachetées de brun foncé. L'oeuf est représenté avec un poisson qui en sort: il est d'une substance semblable à de la corne, & d'un brun rougeâtre, fait comme une bourse, un peu applati, & bordé aux côtés: il paroît avoir flotté longtems dans la mer, à cause de deux incrustations de corail blanchâtre, qui sont dessus. Les peaux de deux plus petits de ces poissons m'ont paru sensiblement rudes au toucher: j'ai aussi trouvé leurs dents fort pointues & disposées en plusieurs rangées, comme celles des Requins. Au reste ce poisson est cartilagineux.

Ces poissons ont été apportés du Cap de Bonne Espérance, & sont à présent conservés dans de l'esprit de vin, dans la collection de M. Jean Fothergill, Docteur en Médecine. C'est le *Catulus major vulgaris* de Willughby*). Mais comme j'en ai donné différentes vues, & que j'en ai un oeuf, & un jeune poisson naissant, j'espère qu'on me rendra la justice d'en avoir enrichi l'histoire. Comme on le trouve en Angleterre, & au Cap de bonne Esperance, on peut supposer, qu'il y en a tout de même dans la plupart des mers, tant sous la Zone Torride, que sous les Zones tempérées.



*) On en peut voir une figure dans son Histoire des Poissons. pl. B. 4.

Le VAUTOUR noir couronné, ou chaperonné, & le SERPENT noir & blanc des Indes.

Ce Vautour est un très gros oiseau, surpassant d'un tiers la grosseur d'une Aigle ordinaire.

Le bec de cet oiseau est plus long que celui de l'Aigle, sans angles aux bords de la mâchoire vers la pointe: la base en est couverte d'une peau blanchâtre clair, ou les naseaux sont placés. La tête de même qu'une partie du cou, est légèrement couverte des plumes courtes, semblables à du duvet, couleur de cendre, blanches autour des yeux & sur les joues: l'iris des yeux est d'un noisette foncé. Il a une huppe ou couronne, qui s'élève du derrière de la tête. Le bas du cou est entouré de longues plumes couleur de cendre, qui pendent négligemment, & forment une espèce de fraise dans laquelle l'Oiseau retire sa tête, quand il repose ou quand il dort, de sorte qu'à peine la lui voit-on. Le plumage sur tout le reste du corps, est d'un brun très foncé, ou d'une couleur noirâtre, excepté quelques unes des plus petites couvertures des ailes, qui ont la pointe blanche: le dessous de l'oiseau est d'une nuance plus clair que le dos & les ailes. Ses jambes & ses pattes sont revêtues d'écailles bleuâtres: les orteils sont joint ensemble vers le bas par une peau: les griffes ou les ongles sont noirs: les plumes des cuisses sont longues & pendantes, & couvrent quelquefois les jambes.

Le *Serpent Indien Noir & Blanc* est d'environ quarante pouces de long: il est d'un blanc sale ou couleur de crème, & il a autour du corps trente six anneaux noirâtres, outre les marques noires de dessus la tête. Il a un pouce & demi de diamètre dans l'endroit le plus épais du corps. Il est considérablement élevé sur le dos. La queue est emouffée & ronde vers le bout, qui est à quatre pouces loin de l'anus. Il a de petits écailles sur le dos: celles du ventre sont en demi cercle.

On montrait le Vautour à Londres en 1757. parmi d'autres Oiseaux & Bêtes de Proye, Je ne puis apprendre de quel pays il étoit, excepté de son maître, qui me dit qu'il venoit des Deserts d'Arabie: mais on ne peut guère compter sur la parole de cette sorte de gens. Il me semble que cet oiseau n'avoit point encore été décrit jusques à présent: je crois en avoir vu un de cette espèce il y a deux ou trois ans chez Monseigneur le Duc de Cumberland, dans la Barc de Windsor: Il y a dans Gefner, parmi les Aigles la figure d'un Oiseau qui a une huppe derrière la tête; mais qui à d'autres égards est différent du mien. *V. Gefner Nomenclator première classe d'Oiseaux, p. 4.*

Le Serpent a été apporté des Indes Orientales; mais je ne saurois dire précisément de quel endroit. Il appartient à M. Sclater, Droguiste, dans la rue de Newgate, à Londres, qui m'en a obligeamment permis l'usage, aussi bien que d'autres Serpents conservés dans de l'esprit de vin. *Voi Seba Hist. Nat. où se trouvent trois Serpents, qui approchent de celui ci, tom. I. p. LIII. fig. 4. tom. II. pl. IX. fig. 3. & pl. LVIII. fig. 2.*



Der schwarz gekrönte oder mit einer Kappe bedeckte Geier, Tab. LXXX.
und die schwarz und weiße Indianische Schlange.



G. Edwards ad viv. delin.

*J. M. Seligmann opudat.
Omn. Priv. Sac. Caeo. Majestatis.*

Joh. Sebast. Leitzner sculp.

Vultur niger cristatus. N° 80. VIII^{ter} Theil. Le Vautour Noir Couronné, ou
Serpens Indicus niger et albus. Chaparronné, et le Serpent Noir et Blanc des Indes.

Der Morast-Falck und der Rohr Vogel,
oder Carolinische Eimerling.

Tab. LXXXI.



G. Edwards ad viv. delin.

J. M. Seligmann excudit

Cum Priv. Sac. Caes. Majes:

N^o 81. VIII^{ter} Theil

Accipiter Paludarius
Aves Arundinaceæ

le Faucon de Marais
et l'Ortolan de la Caroline.


Le FAUCON de MARAIS, & l'ORTOLAN de la Caroline.

La figure du Faucon est considérablement réduite de sa grandeur naturelle: les ailes étant étendus, avoient trois pieds & demi d'une extrémité à l'autre; & il avoit deux pieds, depuis la pointe du bec, jusqu'au bout de la queue.

Le bec de cet Oiseau est bleuâtre: les bords de la machoire supérieure en sont ondulés; il y a, à sa base une peau orange, où sont placés les naseaux: les yeux sont aussi entourés d'une peau de la même couleur; l'iris en est noisette: il y a des poils noirs, ou des soies autour des naseaux & des coins de l'ouverture du bec. Depuis le bec il passe au travers des yeux une ligne noire, qui est un peu bleuâtre vers la tête: des naseaux partent des lignes blanches, qui passant immédiatement au dessus de l'oeil, se recourbent de chaque côté de la tête, & viennent se rendre sur la gorge, où elles se joignent; il a aussi une marque blanche sous chaque oeil: excepté quelques petites taches confuses de blanc, qu'il a sur la tête, elle est d'un brun foncé, aussi bien que le cou & l'estomac. Le dos, les ailes, & la queue sont de la même couleur: la queue est croisée d'un côté à l'autre, de quatre barres noirâtres: le croupion est blanc de même que les couvertures du dessus de la queue. Une partie de l'estomac, le ventre, les cuisses, & les couvertures du dessous de la queue sont d'un jaune rougeâtre. Les jambes & les pattes sont couvertes d'écailles orange: les ongles sont noirs.

L'ORTOLAN Mâle, qui est représenté perché sur un arbre, est noir, excepté une tache d'un jaune rougeâtre, qu'il a sur le derrière du cou, & les couvertures des ailes avec le croupion, qui sont blanches: le bec est couleur de plomp, & les pattes sont brunes. La femelle de cet Oiseau est représentée sous les ferres du Faucon: elle est brune sur le dos, & blanchâtre nuancé de jaune, sur le ventre: le bec en est couleur de chair & les pattes sont brunes.

J'ai gravé le Faucon de Marais d'après un dessin fait sur l'oiseau même en Pensilvanie, & qui m'a été envoyé par mon très obligeant ami, M. Guil. Bartram né dans ce pays-là. Les oiseaux que j'appelle Oiseaux de Jonc, sont les mêmes que Catesby nomme Oiseaux de Ris, que son Traducteur a rendus par *Ortolans de la Caroline*. *Vo. Hist. de la Carol. tom. I. p. 14.* M. Bartram dit, que le Faucon fréquente le marais en été, qu'il se nourrit d'Oiseaux de Jonc, ou d'Ortolans, de Grenouilles, de Serpents, de Lezards &c. & qu'il se retire de Pensilvanie aux approches de l'hiver. Comme je ne trouve ce Faucon décrit ni par Catesby, ni par aucun autre auteur, je n'ai pas voulu manquer l'occasion d'en donner la figure. Quoique je n'aye pas vu l'oiseau même, j'ai tout lieu de croire, que M. Bartram est très correct dans sa manière de dessiner, & très exact dans le coloris, ayant comparé plusieurs de ses dessins avec les sujets naturels & les ayant trouvés fort ressemblants, Les Ortolans sont introduits dans la planche par voye d'ornement: Je les ai copiés en mignature du livre de Catesby, quoiqu'en des attitudes différentes de celles de ses figures. Ils sont un peu plus gros qu'une Alouette.




Le PERROQUET A COLLIER, & le PERROQUET à TÊTE BLEUE.

La figure du haut de la planche représente le Perroquet à Collier, & la figure inférieure est le Perroquet à Tête Bleue. Ils sont tous deux de la même taille & de la même figure en tout sens, & c'est peut-être le Mâle & la Femelle: ils sont de la grosseur d'un Pigeon domestique, ou d'un Pigeon Ramier. Ils ont tous deux le bec rouge partout; les iris de leurs yeux sont orange; & ils ont chacun à la base du bec une étroite peau couleur de chair, où leurs naseaux sont placés: ils ont aussi tous deux autour des yeux un petit espace de peau couleur de chair. Les jambes & les pattes de l'un & de l'autre sont couleur de cendre.

Le Perroquet à Collier a le haut & les côtés de la tête verts: il lui part de la mâchoire inférieure du bec une barre noire, qui après être un peu descendue vers le bas, se partage en deux branches, qui se recourbant en arrière de chaque côté, forment autour du cou un collier noir, dont les bouts se joignent presque par derrière. Sur la partie postérieure du cou, au dessus de ce collier noir, il y a des plumes bleues, & au dessous du même collier, il y a une barre des plumes rouges. Le corps tant dessous que dessus est vert, quoiqu'un peu plus clair sur le ventre: le dos & les dessus des ailes étant plus foncés, & d'un vert plus bleu. Les pennies & les premières plumes qui les couvrent sous les ailes sont gris de souris; les autres plus petites couvertures y sont d'un vert bleuâtre clair: il y a une tache rouge sur les plus petites couvertures du dessus des ailes. Le dessus de la queue est d'un vert bleu, le dessous en est d'un jaune obscur, ou couleur d'olive: les plumes du milieu de la queue étoient de treize pouces de long; elles vont en raccourcissant de chaque côté.

Le Perroquet à Tête bleue a toute la tête d'un beau bleu céleste: il ressemble, à tout autre égard à celui qu'on vient de décrire, étant tout vert. Il a sur les ailes une tache jaune, où l'autre en a une rouge: le dessus de la queue est plus bleu, & les bords des pennes du fouet de l'aile tirent sur le bleu.

Ces oiseaux ont été apportés tous deux en vie à Londres, par un des vaisseaux de notre Compagnie des Indes. Willughby dit dans son Ornithologie p. 115. que le premier est le Psittacus des anciens, & le seul qui fut connu en Europe, depuis le temps d'Alexandre le Grand jusqu'au siècle de Neron. Celui qui a la tête bleue est le seul de cette sorte que j'ai jamais vu; & je ne crois pas qu'on en ait donné avant moi, ni figure ni description. Je les ai dessinés tous deux en vie. Il vient souvent des Indes une autre sorte de Perroquet à Collier, qui ne diffère presque en rien de celui qu'on vient de décrire, excepté en grosseur, n'étant pas plus gros qu'un Merle, & en ce qui n'a point de marque rouge sur les ailes: j'en ai vu un de cette dernière espèce chez M. George Shelvocke, à Greenwich.



Der Pappagey mit einem Halsstreif
und der blau Köpfige Pappagey

Tab. LXXXII.



G. Edwards ad viv delin.

Cum Priv. Sac. Caes. Majestatis
N^o 82. VIII^{ter} Theil

J. M. Seligmann excut.

Pittacus minor Torquatus
Pittacus minor capite ceruleo.

le Perroquet à collier et
le Perroquet à tête bleue.

Der mit Saphier gekrönter Pappagey,
und der Pappagey mit Gold Fliegel.

Tab. LXXXIII.



G. Edwards ad viv. del.

Cum Priv. Sac. Caes. Majest.

J. M. Seeligmann excudit.

N^o 83. VIII^{ter} Theil

Pittacus minor vertice Sapphirino.

Pittacus minor alis aureis.

La Perrique couronnée de Saphire,
et la Perrique aux ailes d'or


La PERRIQUE COURONNÉE DE SAPHIR, & la PERRIQUE AUX AILES D'OR.

Ces oiseaux sont tous deux dessinés de grandeur naturelle. & ont été gravés sur la planche immédiatement d'après nature.

La figure d'en haut. No. 1. représente la Perrique couronnée de Saphir. Son bec est noir, de même que la peau qui en couvre la base: elle a des angles de chaque côté de la mâchoire supérieure. Les yeux sont entourés d'un espace étroit de peau nue: la tête & le cou sont verts, & il y a sur le sommet de la tête une marque ronde d'un très beau bleu ou couleur de saphir. Il y a sur le derrière du cou, vers le bas, un croissant couleur d'orange, par où le cou est séparé du dos, qui est vert: les ailes sont de la même couleur, aussi bien que l'estomac, les cuisses, les plumes de couvertures du dessous de la queue, & la queue même. La pointe des pennes est obscur, tant en dessus qu'en dessous; les barbes intérieures des pennes sont d'un bleu céleste: les plumes de couverture du dessous des ailes sont d'un vert clair. La gorge est d'un très beau rouge, ou de couleur sanguine, comme le sont aussi le croupion & les plumes de couverture de la queue. Il y a une tache jaune sur le milieu du dos. Les jambes & les pattes, qui sont faites comme aux autres oiseaux de l'espèce des Perroquets sont brunes ou noirâtres. La queue est composée de douze plumes d'égale longueur; elle est bleuâtre par dessous, & est presque toute cachée sous les plumes de couverture du dessus.

La Perrique aux Ailes d'Or est représentée par la figure d'embas. N. 2. Son bec est blanchâtre, de même que la peau qui est autour des yeux: il a un angle très considérable de chaque côté de la mâchoire supérieure du bec. Le plumage, excepté quelques plumes aux ailes est tout vert, plus clair sur le ventre, & plus foncé sur le dos comme il arrive je crois, à tous les Perroquets verts &c. Environ quatre des pennes, qui joignent les quatre du fouet de l'aile, sont d'un beau jaune de fin or, ou couleur d'orange, comme est une partie de la première rangée des plumes de couverture, qui sont immédiatement sur celles-là: quelques pennes qui joignent de côté & d'autre ces pennes d'or, ont leurs barbes extérieures d'un beau bleu turc; les extrémités de plus grandes pennes sont obscures: le dessous des pennes est d'un bleu turc, excepté le dessous des pennes d'or qui est jaune: la première rangée des couvertures de dessous sont d'un bleu plus obscur; les plus petites couvertures sont tout-à-fait obscures. Les jambes, les pattes, & les ongles sont d'un couleur de chair pale.

L'oiseau No. 1. qui est décrit le premier est venu de l'isle de Sumatra dans les Indes Orientales; je l'ai reçu en présent sec & très bien conservé, d'un de mes amis, qui l'en avoit apporté lui même à Londres. C'est un des plus petits, mais en même temps un des plus superbes oiseaux de cette espèce, que j'aie jamais vû. Je l'ai dans ma petite collection: il n'avoit certainement point encore été décrit. L'oiseau représenté N. 2. appartenoit à un des Seigneurs de l'Amirauté; il m'a été donné mort par un domestique. Je le crois des Grandes Indes, quoique je n'ai pu l'apprendre avec certitude. Je ne crois pas que jusques à présent il eut été ni dessiné ni décrit par aucun auteur. J'en ai la peau par devers moi.



Le DODO & le COCHON d'INDE.

Le Dodo est un oiseau extrêmement gros, je le crois de la troisième grandeur, en commençant par l'Austruche, continuant par le Cassinari, & passant au Dodo. Cette figure est copiée en miniature d'après un portrait en huile, où l'oiseau est tiré de sa grandeur naturelle. La figure en est à peu près de trente pouces de haut : le bec dans sa plus grande longueur directe est de neuf pouces ; les yeux sont placés dans la base de la mâchoire supérieure.

Le bec qui est crochu à la pointe, comme celui d'un Perroquet, est noirâtre, excepté une petite rougeur, qui est sur le haut de l'endroit où il se recourbe : il a des elevations vers les naseaux : la moitié du bec, vers la tête est d'un couleur de cendre clair : l'iris de l'oeil est blanchâtre. Les plumes du sommet de la tête se joignent, & viennent accompagner le bec en angle, & forment une espèce de coëfure. Excepté les ailes & la queue, tout l'oiseau est d'un couleur de cendre, qui est plus foncé sur le dos, & plus clair sur le ventre : l'estomac est presque blanc, & les plumes qu'il a aux jointures des jambes sont presque noires. La queue est placée fort haut ; & les plumes qui en sont blanchâtres, sont élevées. Les pennes, où les plus grandes plumes des ailes, sont d'un blanc jaunâtre ; celles de couverture sont blanches avec les pointes noires ; mais les moindres plumes de couverture, qui bordent le côté de l'aile, sont couleur de cendre. Les jambes & les pattes, qui sont grosses & fortes, sont revêtues d'une peau jaune par écailles : chaque patte a trois doigts placés en avant, & un quatrième derrière : les griffes sont noires. Je crois que cet oiseau est incapable de voler.

Le Cochon d'Inde est un peu plus gros que notre Écureuil Anglois : ses dents sont comme celles d'un Lapin ; ses oreilles sont rondes & petites : il y a quatre orteils à chaque pied de devant, & trois à chaque pied de derrière : il n'a point de queue. Il est blanc pour l'ordinaire ; mais les animaux de cette espèce sont marquetés de noir & de jaune, dans une variété si prodigieuse, qu'on n'en a encore jamais vu deux qui fussent marquées exactement de même. On les élève domestiques à Londres, & aux environs, où ils se nourrissent comme des Lapins.

Le portrait original, d'après lequel cette empreinte du Dodo a été gravée, fut peint autrefois en Hollande d'après l'oiseau en vie, apporté de l'isle de S. Maurice dans les Indes Orientales, lorsqu'on commença à faire la découverte des Indes par le Cap de bonne Esperance. Il a appartenu au Chevalier Hans Sloane jusqu'à sa mort : & il m'a appartenu depuis & je l'ai déposé dans le Museum Britannique, comme une pièce très rare & très curieuse. L'histoire que je viens de donner de ce portrait, je la tiens du Chevalier Hans Sloane lui même & de feu M. Mortimer, Secrétaire de la Société Royale. Pison donne deux figures du Dodo, qu'il a tirées d'après ce même portrait : il l'appelle Dronte ou Dod-aers *) Charleton, dans son *Onomasticon*, l'appelle le Cigne du Moine de l'isle de S. Maurice. C'est le Coq étranger de Clusius, *Exot. tom. I. p. 100.* & le Cigne encapuchonné de Nieremberg, lesquels auteurs se sont servis de la même empreinte gravée sur bois, dans leurs deux histoires. Willughby, qui a copié l'empreinte de Pison, l'appelle Dodo. Herbert l'a représenté & décrit dans ses voyages publiés à Londres en 1677. p. 282. 283. Comme ma figure est plus grande qu'aucune des précédentes, j'ai eu la facilité d'exprimer les parties de l'oiseau distinctement.

Le Cochon d'Inde étant un animal fort connu parmi nous n'est mis avec le Dodo, que pour donner une juste idée de sa grandeur : il est tiré d'après l'animal même, Marcgrave l'appelle *Cavia Cabaia, Brasiliensis.* **) Je ne fais s'il est de Guinée en Afrique, ou du Brésil.

TAB. LXXXV.

*) *V. Pis. de Indiae utriusque Re Nat.* sa première figure gravée sur cuivre, au milieu de son frontispice ; & une autre figure gravée sur bois, liv. V. p. 71.

**) *Voi. sa figure p. 224.*



G. Edwards ad viv. delin.

Cum Priv. Sac. Caes. Majestatis.

Nº 84. VIII^{ter} Theil

J. M. Seeligmann excudit

Dodo avis
Mus Africanus
Porcellus Guineensis dictus.

Le Dodo et le Cochon d'Inde.



J. Edwards ad viv. delin.

*C. M. Seligmann executit.
Cum Priv. Sac. Caes. Apostolicis.*

Joh. Seb. Lechner sculps.

Avis Curacao dicta. Avis Acajou. N° 86. VIII^{ter} Theil. L' Oiseau de Curassau, et le Cusco.


L'OISEAU DE CURASSAU, & le CUSCO.

Ces oiseaux sont considérablement réduits au dessous de leur grandeur naturelle, qui est à peu près celle d'une Poule d'Inde. Ils sont tirés d'après les sujets même; l'Oiseau de Curassau, fig. 1. par moi même; & le Cusco, fig. 2. par un Gentilhomme de la suite de son Altesse le Duc de Portland.

Comme l'Oiseau de Curassau ressemble à bien des égards au Cusco, je me contenterai de remarquer en quoi il en diffère. Le bec est noir à la pointe, & couvert d'une peau jaune à la base: il a au dessus du bec, entre les naseaux un bouton rondet, dur & de couleur jaune: il a aussi sur la tête une huppe de longues plumes noires, dont la pointe se renverse en devant: on en voit au bas de la planche une de sa grandeur naturelle. Il n'a pas, comme l'autre, le bout de la queue blanc. Ces oiseaux sont semblables à tous autres égards. La femelle de cette espèce diffère du mâle en ce qu'elle n'a point de bouton sur le bec, & en ce qu'elle a le plumage varié de brun, de noir, & de couleur de cendre en lignes transversales: d'autres sont tout d'un brun rougeâtre, varié de différentes manières, comme notre volaille domestique. *V. la description anatomique de cet oiseau dans les Mem. de l'Acad. des Sciences, tom. III. prem. part. pag. 223.* Le Chevalier Hans Sloane a donné cet oiseau, qu'il appelle Coq d'Inde; mais où il dit que la queue n'a pas plus de deux pouces de long, si vous lisez dix, vous serez plus près de la vérité. Il a fait aussi l'énumération de tous les auteurs qui ont parlé de cet oiseau avant lui. *Gallus Indicus, Jamaica tom. II. pag. 302. tab. 260.* J'ai tiré cette figure d'après un sujet vivant, qui étoit chez le Chevalier Charle Wager à Chelsey. Il faut remarquer, que ni l'un ni l'autre de ces oiseaux n'a de bouton sur le bec dans la première année.

Le Cusco prend son nom du bouton qu'il a sur le bec, & dont la figure ressemble beaucoup à une noix d'Amerique, qu'on y appelle Cusco *). Ce bouton est d'un très beau bleu, de même que la base supérieure du bec, dont le reste est rouge: l'iris des yeux est d'un brun rougeâtre. Tout l'oiseau est d'un noir foncé éclatant, qui réfléchit des ondes de bleu & de pourpre, excepté le bas du ventre, les plumes de couverture du dessous de la queue, & la pointe des plumes de la queue même, qui sont blanches. Les jambes & les pattes sont couvertes d'une peau par écailles, d'un couleur de chair foncé.

Je ne saurois décider positivement si cet oiseau est de la même espèce que le précédent. Je sais qu'il est très rare chez nous en comparaison de l'oiseau de Curassau, qui se trouve communément dans les ménageries de ceux de notre Noblesse qui sont curieux en oiseaux. Je n'ai vu qu'un Cusco dans toutes mes recherches: au reste, à cause de la différence des boutons, tant en grandeur qu'en figure & en couleur, & à cause que l'un a une huppe si remarquable, tandis que l'autre n'en a point, je serois fort porté à croire, qu'ils sont chacun d'une espèce particulière. Le Cusco & le Pauxi de Nieremberg. *Voi. pag. 233. -- 236.* & l'Oiseau de Curassau est le Mituporanga de Marcgrave. Ce dernier est représenté dans plusieurs auteurs; mais les écrivains, qui ont décrit le Cusco, n'en ont point donné la figure: ce qui me fait croire que c'est ici la première empreinte, qui en ait paru. Il appartient au Duc de Portland; mais étant à une maison de campagne de son Altesse, assez éloignée de Londres, mes affaires ne m'ont pas permis d'aller le dessiner moi même.



*) Ne seroit ce point aussi de Cusco, ancienne ville capitale du Perou?

TAB. LXXXVI.
PETITE GRIVE.

La figure représente cet oiseau de sa grosseur naturelle.

Le dessus du bec est obscur ou noirâtre ; le dessous en est aussi obscur à la pointe, mais jaunâtre vers la tête : il s'en élève quelques poils courts vers les angles de l'ouverture : il y a autour des yeux un cercle blanchâtre. La tête le dessus du cou, le dos, les ailes, & la queue, sont d'un brun rougeâtre ou canelle, sans du tout varier dans les nuances des plumes, comme il arrive à nos Grives Angloises. Le dessous des ailes & de la queue est couleur de cendre, excepté que les barbes intérieures des penes sont blanchâtres vers le bas. La gorge est blanchâtre joignant le bec : l'estomac est jaunâtre, mêlé de taches brunes. Le ventre est blanc, aussi bien que les cuisses & les plumes de couverture du dessous de la queue, quelque peu nuancées de couleur de cendre. Les jambes, les pattes, & les ongles sont couleur de chair.

J'ai reçu cette Grive avec une autre d'une moindre espèce de Grive dont j'ai donné la figure & la description dans la septième partie Tab. XLII. de cet ouvrage, de mon bon ami M. Guil. Bartram de Philadelphie en Pensilvanie : il me marque qu'elles y arrivent au mois d'Avril, qu'elles y nichent & y élèvent leurs petits, & qu'elles y restent jusqu'à la fin de l'été. Catesby l'a représentée ; mais il n'en a point donné de description. Il dit simplement, que par la figure & la couleur, elle ressemble au Mavis ou à la Grive Chantante, dont elle ne diffère qu'en grandeur ne pesant qu'une once & un quart ; quoiqu'en la comparant avec la Grive Chantante, j'aie cru devoir lui donner une description toute différente. Selon Catesby, elles demeurent en Caroline toute l'année & se tiennent dans les bois & marécages, mais elles ne chantent point *Hist. de la Carol. tom. I. p. 31.* Le Chevalier Hans Sloane donne simplement à cet oiseau le nom de Grive, & dit qu'elle fréquente les montagnes couvertes de bois &c. mais il ne dit point si c'est un oiseau de passage ou non. *Hist. de la Jam. tom II. p. 305.* Ceux qui s'avancent plus loin vers le nord sont oiseaux de passage : les hivers sont trop rudes en Pensilvanie pour pouvoir y rester ; mais la Caroline étant plus au sud de plusieurs degrés, les hivers y sont assez doux pour leur subsistence dans cette saison.





J. Edwards ad. viv. delin.
Turdus parvus.

Cur. Priv. Sac. Cas. Majestatis.
Nº 36. VIII^{ter} Thet.

J. H. Schigmann excudit.
Petite Grive.





Die Pensilvanische Lerche und der braune Schmetterling. Tab. LXXXVII.



G. Edwards auct. viv. detin.
Alauda Pensilvanica.
Papilio fulcus.

Cum Priv. Sac. Caes. Majestatis.
Nº 87. VIII. Theil.

J. M. Seligmann excudit.
 L'Alouette de Pensilvanie, et
 le Papillon brun.


L'ALOUETTE de PENNSILVANIE & le PAPILLON BRUN.

L'Alouette & le Papillon sont tous deux représentés de leur grandeur naturelle, & ont été gravés sur la planche directement d'après les sujets mêmes.

Le bec de l'Alouette est mince & fort pointu; la couleur en est noirâtre, excepté un peu de jaune à la base de la mâchoire inférieure. La tête, le dessus du cou & le dos sont d'un brun obscur foncé: il passe au travers de l'oeil une large barre noirâtre, au dessus de laquelle est une ligne couleur de terre glaise; les paupières sont aussi d'une couleur claire, mais les yeux sont obscurs. Les ailes & la queue sont d'un brun foncé ou obscur, mais les plumes en ont les bords & la pointe gris blanc: le dessous des ailes est couleur de cendre. Les plumes extérieures de chaque côté de la queue sont blanches: les deux qui les suivent le sont seulement à l'extrémité. Le dessous de l'oiseau, comme on le voit par la figure, est, depuis le bec jusqu'à la queue, d'un ventre de biche rougeâtre, avec des taches brunes. Les jambes, les pieds, & les ongles sont d'un brun foncé. Il y a à la partie postérieure de la patte un assez long ergot ou éperon, mais pourtant moins long, à ce que je crois, que notre Alouette commune. Ce qui est particulier à cet oiseau, c'est que quand l'aile est bien fermée, la troisième plume, depuis le corps, en atteint le bout; & c'est le caractère constant de l'espèce *Bergeronnette*. Quoique cet oiseau ressemble beaucoup à quelques unes des Alouettes connues, je suis cependant persuadé, après un examen très exact, que cette espèce n'avait encore été ni dessinée ni décrite. Cet oiseau est commun aux deux continents d'Europe & d'Amérique Septentrionale: je l'ai trouvé dans le voisinage de Londres.

Le *Papillon Brun* vient de la Chine: le dessus en est d'un brun obscur foncé: les ailes supérieures ont chacune une grande tache, où un oeil, contenant deux autres taches blanches, qui y sont renfermées; ces taches sont à moitié entourées de jaune orange: les ailes de dessous ont de petites taches noires autour de leurs bords, avec des points clairs ou blanchâtres au milieu: le dessous du Papillon est obscur tirant sur le couleur de rose, varié d'endroits clairs & obscurs, ayant encore quelques anneaux rembrunis.

J'ai reçu de M. Guil. Bartram de Pensilvanie l'oiseau que je viens décrire; il m'apprend qu'ils s'y montrent d'abord en Mars, en allant vers le nord, & qu'on n'y en voit pas un à la fin de Mai.




MOUCHEROLES COURONNEES D'OR, MALE & FEMELLE.

Ces oiseaux sont représentés de leur grandeur naturelle, & ils ont été gravés sur la planche directement d'après les sujets mêmes.

L'oiseau du haut de la planche, que je suppose être le Mâle, a le bec menu d'une couleur noirâtre ou rembrunie: il passe au travers du bec une large barre noire, au dessus de laquelle est une étroite ligne blanche: les côtés de la tête & la gorge sont blancs, au dessus de la barre noire: le derrière de la tête & du cou, le dos, & les plumes qui couvrent le dessus de la queue, sont d'un bleu ardoise, avec des taches brunes ou noirâtres, le long du milieu des plumes: l'estomac est noir, avec un léger mélange de gris de fer: il y a sur le sommet de la tête une tache d'un jaune brillant; les côtés l'estomac, au dessous du noir, & le croupion sont jaunes aussi: les plumes sont noires avec des bordures grises: le dessous des ailes est gris: le bout des couvertures des ailes est blanc, de même que celui des plumes de dessous le corps: la queue, qui est noire sur le dessus, est composée de douze plumes, comme celle de tous les oiseaux de cette espèce, autant que j'ai pu l'observer; les barbes intérieures de trois plumes extérieures de chaque côté ayant des taches blanches sur le dessus: le ventre est blanc: les cuisses & les plumes de couverture du dessous de la queue sont blanches, marquées de noir sur les côtés de l'estomac & du ventre: les jambes, les pattes, & les ongles sont d'un brun obscur ou noirâtre.

La Femelle diffère du Mâle en ce qu'elle est brunâtre sur le dos, les ailes & la queue, où le Mâle est bleu ou noir; & en ce qu'elle n'a point de barre noire, qui passe au travers des yeux, ni de marque noire sur l'estomac: ils sont semblables à tous autres égards. Où les plumes de ces oiseaux sont blanches à l'extérieur, elles sont noires vers le bas, où est le duvet.

Ces oiseaux m'ont été envoyés par mon ami M. Guil. Bartram de Pensilvanie: il dit, qu'ils arrivent dans ce pays au printemps, de dessous le sud, & qu'on ne les y voit que trois ou quatre jours, se nourrissant d'insectes; & continuant leur cours plus loin vers le nord, où il suppose qu'ils fixent leur demeure d'été, à fin d'y procréer leur espèce, & de s'en revenir, avant l'hiver, dans des climats plus chauds. Il ajoute, qu'en ayant ouvert quelques Femelles, il y avoit trouvé des amas d'œufs un peu plus gros que de la grenne de navets. Je crois qu'on peut sûrement prononcer, que ces oiseaux n'avoient point encore été décrits.



Zwey Fliegenschwärmer mit goldenen Kronen ein ♂, Tab. LXXXVIII.
und eine ♀.



G. Edwards ad viv. delin.

J. M. Seligmann excolit.
cum Priv. Sac. Cae. Apostatiss.

Joh. Sebast. Leitner sculp.

Muscicapa aureo vertice, mas
et foemina.

N° 88. VIII^{ter} Theil.

Moucheroles Couronnées d'or,
Mâle et Femelle.

Der Fliegen-Schnäpper mit goldenen Flügeln,
und der Fleckigte Schildkröte-Schmetterling.



G. Edwards ad viv. delin.

Cum Priv. Sac. Caes. Majestatis

J. M. Seligmann excud.

Muscicapa alis aureis
Papilio testudinarius maculatus,

Nº 89. VIII^{ter} Theil

Moucherole aux Ailes.
dorées Papillon Tortuë marqueté,

MOUCHEROLE aux Ailes dorées, PAPILLON TORTUË marqueté.

Cet oiseau & ce papillon ont été tous deux dessinés & gravés sur la planche immédiatement d'après nature, & de leur grandeur naturelle.

L'oiseau a le bec très droit, fort pointu, & noir : il passe des coins de son ouverture au travers des yeux une barre noire, au dessus & au dessous de laquelle il y a des lignes blanches : la gorge est noire depuis le bec jusqu'à l'estomac, qui est blanc, aussi bien que le ventre, les cuisses, & les plumes de couverture du dessous de la queue : le sommet de la tête est d'un jaune brillant : le dessus du cou, le dos, le croupion, & les plus petites plumes de couverture des ailes sont d'un bleu clair ardoise : les pennes & le dessous de la queue sont d'une couleur de cendre foncé : les barbes de la première rangée des plumes de couverture du dessus des ailes sont jaunes, de même que le bout des plumes d'au dessus, ce qui forme une marque d'un beau jaune sur chaque aile : les plumes de couverture du dessous des ailes sont blanches : le dessous des pennes est d'un couleur de cendre clair, avec des bords blanchâtres : le dessous de la queue est couleur de cendre, ayant des taches blanches sur les barbes intérieures des plumes extérieures de chaque côté : les jambes & les pattes sont obscures.

Le *Papillon* vient de la Chine : il est en general d'une couleur d'orange rougeâtre, varié de festons jaunes & noirs autour des ailes : à travers le milieu de chaque aile passe un fond de noir rempli de taches blanches de figure ovale : il y a encore d'autres taches & nuances de noir sur les ailes, que la figure exprime mieux qu'on ne peut les décrire. Le dessous de ce *Papillon* diffère peu du dessus, excepté que les couleurs en sont plus pales : je n'en ai point donné de figure. Je crois qu'il n'avoit point encore été décrit.

L'oiseau que je viens de décrire m'a été envoyé par M. Guil. Bartram, qui dit qu'on le voit paroître au mois d'Avril en Pensilvanie, où ceux de son espèce ne font que passer en tirant vers le nord, & où on ne les voit que durant peu de jours : on remarque qu'ils vivent d'insectes. Je ne sache pas que cet oiseau eut encore été représenté ou décrit jusqu'à présent.




La MOUCHEROLE VERTE à Gorge Noire, & le GRIMPERAU Noir & blanc.

Ces oiseaux sont tous deux tirés & gravés sur la planche immédiatement d'après les sujets mêmes, & de grosseur naturelle.

La figure d'en haut représente la Moucherolle verte: le bec est délié, fort pointu & noir: les côtés de la tête & une partie du cou sont d'un beau jaune éclatant: la gorge est noire depuis le bec jusqu'à l'estomac: le sommet de la tête, le cou, le dos, le croupion, & les plus petites plumes de couverture des ailes sont d'un olive verdâtre: les plumes des ailes & de la queue sont d'un couleur de cendre foncé ou obscur: les extrémités de deux principales rangées des plumes de couverture des ailes sont blanches, ce qui forme deux barres blanches à travers de chaque aile: les plumes près du corps sont bordées d'une couleur blanchâtre; les couvertures du dessous des ailes sont blanches; les plumes sont blanches aussi au bord de leurs barbes intérieures: trois plumes extérieures de chaque côté de la queue ont des taches blanches sur les bords de leurs barbes intérieures: l'estomac au dessous de la gorge noire, est jaunâtre: le ventre est blanc, aussi bien que les couvertures du dessous de la queue: il y a, au dessous des ailes, des plumes noirâtres, ou obscures, mêlées avec les blanches de côtés du ventre: les jambes & les pattes sont obscures.

Le GRIMPERAU noir & blanc est représenté par la figure inférieure de la planche: le bec, les jambes, & les pieds sont noirs: il passe, du coin de l'ouverture du bec, au dessous de l'oeil, une grande marque noire, entourée d'une ligne blanche, qui passe en dessous & par dessus de l'oeil, où il y a une ligne noire, le sommet de la tête est blanc, la gorge est noire: le cou, le dos, & le croupion sont blancs, avec de grandes taches noires le long du milieu des plumes: l'aile est noire, la pointe des deux principales rangées de couvertures étant blanches, ce qui forme des barres blanches à travers de l'aile: les plumes, près du dos, sont bordées de blanc: les couvertures intérieures des ailes sont blanches: les plumes sont couleur de cendre, ayant leurs barbes intérieures bordées de blanc. le dessous de l'oiseau, depuis l'estomac jusqu'aux couvertures du dessous de la queue, est blanc, marqueté de noir sur l'estomac & sur les côtés du ventre: la queue est noire, les bords des plumes en sont gris de fer; le dessous en est couleur de cendre, & les barbes intérieures des plumes extérieures ont des taches blanches.

Mr. Guil. Bartram, de qui j'ai reçu ces oiseaux, dit, que les Moucherolles Vertes ne se voient que durant quelques jours au mois d'Avril, traversant la Province de Pensilvanie, allant vers le nord, & que chemin faisant, elles se nourrissent d'insectes. Le Grimperau noir & blanc y arrive aussi en Avril, & y passe toute l'été: il suppose qu'ils y font leurs petits. Ils vivent de Mouches, d'Aragnées de Chenilles &c. & ils se retirent vers le sud aux approches de l'hiver. Ces deux rares & magnifiques oiseaux, que je crois n'avoir point encore été décrits, m'étoient entièrement inconnus avant que j'eusse le plaisir de les recevoir de M. Guil. Bartram, qui m'a fait présent tout à une fois de quatorze oiseaux Américains, dont la plupart n'avoient point encore été décrits, avec de courtes descriptions & remarques relatives à ces mêmes oiseaux dans une lettre datée de Pensilvanie, en Juin 1756. Tous ces Oiseaux sont représentés dans cette huitième partie de cet ouvrage &c.



Der Grüne Fliegen-Schnäpper mit Schwarzer Brust,
und der Schwarze und weiße Baumbhacker.



G. Edwards ad viv. delin.

Cum Priv. Sac. Caes. Majestatis

J. M. Seligmann excudit.

Muscicapa viridis gutture nigro
Certhia nigra et alba

Nº 90. VIII^{ter} Theil

La Moucherole Verte à Gorge Noire,
et le Grimpereau Noir et Blanc

Zwey Fliegen Schnäpper mit Rother Brust, ein ♂ und eine ♀.

Tab. LXXXI.



G. Edwards ad viv. delin.

Cum Priv. Sac. Caes. Majestatis.

J. M. Seligmann excudit.

Muscicapa guttore rubro,
mas et foemina.

Nº 91. VIII^{ter} Theil

Moucheroles a Gorge Rouge,
Mâle et Femelle.


MOUCHEROLLES à Gorge Rouge, MÂLE & FEMELLE.

Les figures de la planche représentent ces deux oiseaux de leur grosseur naturelle: la figure d'en haut est le Mâle. Ils ont été gravés sur la planche immédiatement d'après les oiseaux mêmes.

Le Mâle a le bec menu & noir: le sommet de la tête est jaune: il a une barre noire, qui depuis les coins de l'ouverture du bec passe sous les yeux: le derrière de la tête, au dessous de la couronne jaune est noir; les côtés de la tête sont blancs, de même que le commencement de la gorge, le ventre, les cuisses, & les plumes de couverture du dessous de la queue: le bas de la gorge, ou le commencement de l'estomac est d'une couleur rougeâtre foncée; couleur qui se divise, & passe sous chaque aile: le dos, le croupion, & le dessus des ailes sont noirs, ou fort rembrunis: les plumes en sont bordées de vert clair tirant sur le jaune, excepté les plus petites plumes de couverture des ailes, qui sont tout-à-fait noirâtres: les plumes qui forment les deux principales rangées des couvertures des ailes, ont la pointe blanche assez avant, ce qui produit deux barres claires à travers chaque aile; les plumes de couverture du dessous des ailes sont blanches; le dessous des pennes est couleur de cendre: la queue est noirâtre sur le dessus; les plumes extérieures ont des taches blanches sur leur barbes intérieures: les jambes & les pattes sont noires.

La Femelle diffère du Mâle en ce qu'elle n'a point de tache noire sur le derrière de la tête, point de marques brunes sur le dos, & point ou fort peu de rouge sur l'estomac: au reste ils sont tous deux à peu près de la même couleur.

J'ai reçu ces oiseaux de M. Bartram, qui dit qu'ils viennent visiter la Pensilvanie, au mois d'Avril, mais qu'ils n'y nichent point; & qu'après s'être régalez durant quelques jours, de Mouches d'Aragnées, & d'autres insectes, ils s'envolent vers le nord, & on ne les voit plus pendant l'été. Je crois, comme on n'en doit pas douter, qu'ils n'avoient point encore été décrits.




Petites MOUCHEROLES Gris de Fer, MÂLE & FEMELLE.

Ces oiseaux sont représentés de grandeur naturelle, avec leur nid; le tout dessiné & gravé d'après les sujets mêmes.

La figure d'en haut représente le Mâle. Il a le bec noir, excepté la base de la mâchoire inférieure, qui est rougeâtre. Le sommet & les côtés de la tête le dessus du cou, le dos, le croupion, & le dessus de la queue sont bleu ardoise. Il passe des na-seaux au dessus des yeux, vers le derrière de la tête, une barre noire courbe: les paupieres sont blanches. Le dessus des ailes est d'un couleur de cendre brunâtre; trois ou quatre des plus petites pennes vers le dos ont les barbes blanchâtres: les couvertures du dessous des ailes sont aussi blanchâtres: les pennes sont couleur de cendre en dessous, & les bords de leurs barbes intérieures sont clairs, ou blanchâtres. Les deux plumes extérieures de chaque côté de la queue sont blanches; la troisième de chaque côté n'est blanche qu'à la pointe. Tout le dessous de l'oiseau, depuis le bec jusqu'à la queue est blanc: les jambes & les pattes sont noires.

La Femelle, qui est représentée par la figure inférieure de la planche, diffère du Mâle en ce qu'elle n'a point de barre noire sur les yeux, en ce qu'elle a le dessus de la queue de la même couleur cendrée que les ailes, & en ayant les bords des pennes près du dos plus foncées que le Mâle: ces deux oiseaux sont à tout autre égard parfaitement ressemblants.

Je les ai reçus avec leur nid de mon obligeant ami M. Guil. Bartram, qui dit qu'ils arrivent de devers le sud en Pensilvanie au mois de Mars, & qu'en Avril ils commencent à bâtir leurs nids, de la couverture des bourgeons des arbres, du duvet des plantes &c. Le dehors du nid est fait d'une mousse plate grise, qu'ils ramassent parmi les rochers; le dedans est double de crin de cheval. Ils demeurent en Pensilvanie durant tout l'été, & disparaissent aux approches de l'hiver. Je crois que les sujets de cette planche sont tout-à-fait nouveaux, n'ayant pu trouver jusqu'à présent ni figures ni descriptions, qui y répondent.



Kleine Eisengraue Fliegenfänger, ein Er, und eine Fie.

Tab. LXXXII.



G. Edwards ad viv. delin.

Cum Priv. Sac. Caes. Majestatis.

J. M. Seligmann excudit.

Muscicapa parva subcærulea,
mas et fœmina

Nº 92. VIII^{ter} Theil

Petites Moucheroles gris de fer,
Mâle et Fémelle.

Der Krümschnabel ein Er und eine Tie.

Tab. LXXXIII.



G. Eduard ad viv. del.

Cum Priv. Sac. Caes. Majestatis.
Nº 93. VIII^{ter} Theil.

J. M. Seligmann exc.

Loxia, mas et Fœmina.

Becc Croifés, Mâle
et Fémelle.

BECS CROISÉS, Mâle & Fémelle.

Ces oiseaux sont représentés de leur grosseur naturelle : les desseins sont originaux, & ont été gravés immédiatement d'après nature. La machoire supérieure du bec croise à la pointe par dessus l'inférieure, à quelques oiseaux c'est sur le côté droit, & à d'autres sur le côté gauche.

La figure d'en haut représente le Mâle : son bec, qui est assez gros & fort, est obscur ou noirâtre : l'oeil est d'un noisette foncé : la tête, le cou l'estomac, le dos & le croupion sont d'un rouge parfait le dessus de la queue & des ailes est d'un obscur foncé ou noirâtre ; les bords des pennes & des plumes de la queue tirent un peu sur le rouge ; le dessous des ailes & de la queue est couleur de cendre : les cuisses sont blanchâtres, aussi bien que le bas ventre, & les plumes de couverture du dessous de la queue, avec quelques taches obscures : les jambes & les pattes sont d'un couleur de chair olivâtre.

La Femelle est représentée par la figure d'embas : le bec, les yeux, les jambes & les pieds s'accordent exactement en forme & en couleur avec ceux du Mâle : la tête le cou, & le corps, tant dessus que dessous, sont d'un vert jaunâtre, comme au Pinson Vert (Chloris) ; le croupion est d'un jaune plus brillant, tirant sur l'orange : les côtés de la tête, & la gorge, sont couleur de cendre : la partie inférieure du ventre, & les plumes du couverture du dessous de la queue, sont d'un couleur de cendre blanchâtre avec des taches obscures ; les ailes & la queue sont d'un couleur de cendre foncé en dehors, qui est un peu plus clair en dessous.

Ces oiseaux ont paru dernièrement (en 1556-57.) dans le voisinage de Londres en grandes troupes. Ils ne viennent point ici régulièrement & constamment, à des saisons marquées, mais plutôt accidentellement, par des causes qui nous sont inconnues : quelquefois on est plusieurs années sans en voir ou en entendre parler. J'en reçus un dernièrement de Greenland, où des pêcheurs de baleine l'avoient pris ; de là je suppose ; que cet oiseau est commun à l'Amerique Septentrionale, aussi bien qu'à l'Europe : car j'ai remarqué, que les oiseaux, tant terrestres qu'aquatiques, qui fréquentent ces hautes latitudes du nord, se repandent indifféremment dans les parties moins septentrionales d'Amerique & d'Europe. Willughby dit p. 248. que cet oiseau pèse une once & demie. J'en ai tenu un en cage, qui pesoit deux onces & une seizième. Ces oiseaux, au contraire de la plupart des autres, diffèrent les uns des autres par rapport au plumage : car j'en ai vu plusieurs, & je trouve que la description d'un de ces oiseaux ne s'accorderoit point avec celle d'un autre, quoique les mêmes couleurs, savoir le vert, le rouge, l'obscur, & le couleur de cendre, composent la couleur de tous, mais différemment assortis & mêlés en différents oiseaux. Parmi un nombre considérable, j'ai choisi ces deux ci, qui m'ont paru les plus propres à répondre au but du coloris, parce qu'ils font voir les plus grands extrêmes de différence. Quand ils sont chez nous ils fréquentent les pins, & se nourrissent de la semence des pommes qui croissent sur ces arbres. Il y a quelques années que je reçus une lettre du feu Duc de Richemont, avec un oiseau qu'on appelle Grosbec ; quoiqu'à présent je sois en doute, si la lettre, que j'ai inférée dans mon Histoire des Oiseaux, ne se rapporte point plutôt au Loxia ou Bec croisé. Ces oiseaux ont été représentés & décrits par la plupart des auteurs qui ont traité des oiseaux.



MOINEAU a Gorge Blanches avec un PAPILLON Jaune.

Ces deux volatiles sont représentés de grandeur naturelle. L'oiseau est pris d'un très beau dessin et couleurs, fait par M. Guil. Bartram de Philadelphie en Pensilvanie: le Papillon est venu de la Caroline, & a été gravé sur la planche d'après nature.

Le Moineau a le bec gros & court, tel que les oiseaux, qui vivent de grain, l'ont d'ordinaire, & d'une couleur noirâtre ou obscure: il passe du coin de l'ouverture du bec à travers l'oeil, qui est noisette, une barre obscure: il y a au dessus de l'oeil une espèce d'arc, qui est couleur d'orange près du bec, mais qui par degrés devient blanc sur le derrière de la tête: la gorge est blanche immédiatement au dessous du bec, où elle est noire dans le Moineau commun: tout le dessus de l'oiseau, la tête, le cou, le dos, la queue, & les ailes, sont d'un brun rougeâtre, le milieu des plumes étant obscur, ce qui produit une agreable variété dans les nuances des plumes: le côté du haut de l'aile est teint d'un jaune léger près de l'estomac: les côtés de la tête, l'estomac le ventre, les cuisses, & les plumes de couvertures du dessous de la queue sont d'un couleur de cendre clair ou blanchâtre, sans taches: les jambes & les pattes sont d'un couleur de chair rougeâtre.

Le Papillon a la tête rouge, le corps brun, le corps inférieur ou la queue jaune, avec une barre obscure le long du dessus: la couleur générale de toutes les ailes, tant dessus que dessous, est jaune: les grandes ailes ont chacune au milieu du dessus une tache rouge entourée de brun, & huit marques brunes ou obscures sur l'extrémité de leurs bords: les petites ailes, c'est-à-dire celles de dessous, sont marquées autour de leurs bords, de taches obscures en forme de la lettre V: le dessous des ailes est un peu parsemé de marques brunes, & chaque aile a au milieu deux taches blanches bordées de rouge. Mon obligéant ami M. Henry Baker, Membre de la Société Royale, m'a fourni ce Papillon, aussi bien que le petit Papillon jaune & noir, représenté dans la suivante XCVII. Tab. dans cet ouvrage: il m'a dit qu'ils viennent de la Caroline Méridionale.

Je n'ai jamais vu l'oiseau; mais je crois que le dessin de M. Bartram est très curieux, & j'ai raison d'être persuadé de sa véracité & de son exactitude. Je crois que les deux sujets de cette planche nous avoient été inconnus jusqu'à présent.



Der Sperling mit weißer Brust nebst einem
Gelben Schmetterling.

Tab. LXXXIV.



G. Eduard ad rev. delin

I. M. Seligmann. exc.

Cum Priv. Sac. Cae. Majestatis.

Nº 94 VIII^{te} Theil.

Passer gutturalis albo.

Moineau à Gorge Blanche,
avec un Papillon Jaune.

Der Würmfresser und der Biegentäfer.

Tab. XCV.



G. Eduard ad viv. del.

I. M. Seligmann excud.

Cum Priv. Sac. Caes. Majestatis.

Nº 95. VIII^{ter} Theil.

Le Mangeur de Vers, et le
Scarabée Chevre.

Vermivora Scarabæus
capricornis:

Le MANGEUR DE VERS, & le SCARABÉE CHEVRE.

Les figures de cette planche sont dessinées & gravées immédiatement d'après les sujets même, & de grandeur naturelle. L'oiseau paroît être d'une classe entre les oiseaux à bec mince, & l'espèce à gros bec, qui se nourrit de grains, son bec étant plus gros que celui des premiers, & plus mince que celui des derniers.

Le bec du Mangeur de Vers est assez pointu, obscur sur le dessus, & couleur de chair par dessous : il passe du coin de l'ouverture du bec au travers de l'oeil une barre noire étroite, il y a précisément au dessus de l'oeil une ligne jaunâtre, au dessus de laquelle est une barre noire en forme d'arc : le reste de la tête, avec la gorge & l'estomac, est d'un jaune rougeâtre, qui devient graduellement blanchâtre, & qui continue ainsi jusqu'au dessous de la queue : tout le dessus de l'oiseau, c'est-à-dire le dos, les ailes, & la queue, est d'un vert olive foncé : les couvertures du dessous des ailes sont d'un blanc jaunâtre : le dessous des pennes & de la queue est couleur de cendre : les jambes & les pattes sont couleur de chair.

La forme de Scarabée-Chevre se comprendra mieux par le moyen de la planche que par une description : il est d'un brun obscur, & il tire son nom de ses deux longues cornes à jointures, retroussées en dedans comme celles d'une Chevre. Ce Scarabée a été trouvé par un Tonnellier à Londres, en fendant une buche de chêne de Virginie, pour en faire des douves. Le morseau de bois, où se trouve l'insecte vivant, me fut donné en Avril 1758. par mon obligéant ami M. Jos. Amès, Membre de la Société Royale. Cet insecte mangeoit alors, faisant son chemin au travers du bois, il en sortit au commencement du Juillet de la même année, par un trou qu'il avoit rongé au bout, comme il est représenté dans l'empreinte, où l'on voit aussi au côté du bois la cavité, qu'il avoit faite dans le chêne solide. Le trou, par où il étoit entré étoit à l'autre partie du bois, qui s'ajustoit avec celle qu'on a représentée. Cet insecte ronge le bois dans son état de perfection. La poussière, que j'ai trouvée dans la cavité du bois, ne ressemble point à des excréments, mais à de très petits coupeaux rongés du bois. Il y a différentes espèces de Scarabées de ce genre, que je crois tous être rongeurs de bois. M. Jaques Leman m'a montré une espèce de Scarabée-chevre plus grand que celui ci, d'une très belle couleur, qui fut trouvé dans une pièce solide de bois de mahogany. M. Pye, Médecin, de Mile-end, a cette même espèce de Scarabée chevre ; il fut trouvé en vie, dans l'état de ver, dans une pièce de bois dur, apportée de la Nouvelle Angleterre, & il dit qu'il rongeait le bois dans une pièce de bois dur, apportée de la Nouvelle Angleterre, & il dit qu'il rongeait le bois dans cet état : quand le ver fut parvenu à sa perfection, il se changea en chrysolide, dans laquelle on pouvoit voir le Scarabée, parfaitement formé & envelopé dans une peau mince & transparente, dont ce Médecin m'a montré un dessin : après avoir demeuré quelque temps dans cette situation, l'enveloppe ceda, & il en sortit un Scarabée-chevre parfait de la même espèce que celui que je viens de décrire.

J'ai reçu le Mangeur de Vers de M. Guil. Bartram, qui dit que c'est un oiseau de passage, & qu'il a remarqué, que tous les oiseaux de Pensilvanie, à bec menu, le sont. Cet oiseau s'y montre d'abord en Juillet, & en va vers le nord, mais on ne fait pas à quelle distance. Les oiseaux qui passent par ce pays au printemps pour aller vers le nord, ne sont jamais vus en revenir par le même chemin, ce qui fait supposer à M. Bartram, qu'ils s'en retournent vers le sud en automne, par quelque autre passage, derrière les montagnes qui sont avant dans les terres. Je crois que l'on trouvera que c'est ici la première fois qu'on ait représenté & décrit le Mangeur de Vers : & je ne me souviens pas qu'on eut encore découvert jusqu'à présent, que les Scarabées-chevres rongeaient le bois intérieurement, & vécussent dedans.

Le GROS-BEC DE MALACCA, & le JACARINI, avec un PETIT PAPILLON JAUNE.


Ces oiseaux avec le Papillon sont dessinés de leur grandeur naturelle, fig. 1. & 3. étant devant mes yeux pendant que je les gravois sur la planche.

Le Gros-bec de Malacca, fig. 1. a le bec bleu, gros & fort à proportion de la grosseur de l'oiseau : la tête est de même que le dessous des ailes, d'un couleur de cendre clair : le dos, les ailes, le croupion & la queue sont d'un chataigne rougeâtre : l'estomac, le ventre, & tout le dessous de l'oiseau, est obscur ou noirâtre, mais les couvertures du dessous de la queue sont un peu plus claires : les jambes & les pattes sont couleur de chair.

La figure N. 2. représente le Jacarini de Marcgrave HIST DU BRESIL, pag. 210. dont Willughby a traduit la description dans son Ornithologie, p. 258. mais comme ces auteurs n'en donnent point de figure, j'ai été bien aise de trouver l'occasion de le dessiner. Les Portugais l'appellent Negretto. Cet oiseau se nourrit de grain : il a le bec médiocrement gros & court, & d'une couleur obscure. Tout son plumage est noir, d'un éclat magnifique semblable à de l'acier poli ; quand il est placé dans un jour favorable, le corps réfléchit un très beau bleu turc, & quelquefois le cou & les ailes réfléchissent un vert charmant : les jambes & les pattes sont comme à l'ordinaire, & d'un couleur de chair olivâtre. Marcgrave dit que le dessous des ailes est blanc, Les plumes des côtés de la queue se tournent en dehors, comme la figure l'exprime.

Ces deux oiseaux appartenoient à l'obligeant & curieux M. Taylor White, de Lincolne-Inne, qui m'en a permis la vue. Le premier étoit un sujet défectueux, que ceux qui l'avoient apporté des Indes appelloient Roitelet de Malacca ; nom que j'ai cru devoir changer, l'oiseau n'ayant rien en soi du Roitelet, que la grosseur. Le second oiseau étoit dans une cage, que je ne pus avoir chez moi : de sorte que je le dessinai & le mis en couleur simplement de mémoire : mais ensuite je comparai mon dessin avec l'oiseau, & je trouvai que j'avois réussi à peu de chose près.

Le petit Papillon Jaune & Noir, fig. 3. a la tête, le corps & les jambes, d'une couleur obscure ; toutes les ailes sont jaunes de côté & d'autre, bordées, assez avant, de noir ou d'obscur, chacune des grandes ailes ayant une petite tache noire : les ailes ont en dessous un peu de rouge à l'extrémité de leurs bords, outre une tache ronde de la même couleur sur chacune des petites ailes. Ils vient de la Caroline méridionale.



Der Kernbeißer oder Diebschnäbler aus Malacca und der
Jacarini nebst einem kleinen Schmetterling.



G. Eduard ad viv del.

Cum Priv Sac Caes. Majestatis.

Nº 96. VIII^{ter} Theil.

I. M. Seligmann excudit.

Le Gros-bec de Malacca, et le Jacarini,
avec un Petit Papillon Jaune.

Coccothraustes Malaccensis, Jacarini,
Papilio parvus luteus.

Der Wimbrel oder kleine Graccher und das Pappier Vloos. Tab.XCVII.



G. E. Edwards ad viv. delin.

J. M. Seligmann exaudic.
Cum Priv. Sae. Caes. Majestatis.

Joh. Sebast. Leitner Sculps.

Arquata minor, nostratibus Wimbrel N. 97. VIII^{ter} Theil. Le Wimbrel, ou Petit Corlieu;
dicta. Muscus papyraceus. et la Moufle de Papier.

Die Eisengraue Wasserdroßel mit Wasserhühner Pfoten,
eine Art von Zerasinen.

Tab. XCVIII.



G. Edwards ad viv. delin.

J. M. Seligmann excudit.

Cum Priv. Sac. Caes. Majestatis

Nº 98. VIII^{ter} Theil.

Tringa grisea lobatis instar,
Fulicae digitis.

Tringa gris de Fer au pied de Poule
de Eau; espèce de Bécassine.



G. Edwards ad viv. detin.

*J. M. Seligmann exaudet.
Cum Priv. Sac. Caes. Majestatis.*

Joh. Sebast. Leitner sculps.

*Avis Rabihorcados, vel Navis bellica N^o 99. VIII.^{ter} Theil. La Fregate; Poisson de la Chine.
dicta. Pisces Chinenfes.*



G. Edwards ad viv. delin.

Ignavius.

*J.M. Seligmann excudit.
Cum Priv. Sao. Caes. Majestatis.
N^o 100. VIII^{ter} Theil.*

Joh. Seb. Lechner sculp.

Le Paresseux.



CATALOGUE

DES OISEAUX FIGURÉZ ET DÉCRITS

DANS CETTE

HUITIÈME PARTIE.

L e Managuin à dos bleu; & le Managuin rouge & noir	LI.
La Mefange verte tachetée; & la Moucherolle ardoise & jaune	LII.
La Mefange dorée, & le Managuin bleu	LIII.
Le Grimpcreau noir & bleu; & le Widdehop	LIV.
Grimperaux pourpre des Indes	LV.
Le Colibri gorge rouge, le Colibri gorge verte, & le Loir	LVI.
Le Merle à gorge rouge	LVII.
La Calandre & uné Taupe tachetée	LVIII.
Moineaux de Montagne, Mâle & Femelle	LIX.
Le Moineau à longue queue, & la Linotte brune	LX.
Le Moineau frisé jaune & noir, & le Moineau du Bresil	LXI.
Le Pinson à Collier, & le Chardonnet vert	LXII.
Le Pinson Peint, Mâle & Femelle	LXIII.
Le Chardonneret Ameriquain, Mâle & Femelle	LXIV.
Le petit Butor brun	LXV.
Le Canut	LXVI.
Le Tringa tacheté, & le Grimperau de Sapin	LXVII.
Le petite Poule d'eau, & le Roitelet jaune	LXVIII.
Le Râle d'eau d'Amerique	LXIX.
Le Canard à longue queue de Terre-neuve, & le Pluvier à ailes eperon- nées	LXX.
Quatre Becs d'Oiseaux peu connus	LXXI.
Le Poisson éperonné; & le Gattorugina des Indes	LXXII.

Catalogue des Oiseaux

La Chauve fouris de Mer , & l'Acarauna noir & blanc	-	LXXIII.
Le Poisson cornu , & le Scorpion de Mer	-	LXXIV.
Le Grand Cerf-volant & le Scarabée sifflant	-	LXXV.
Le Balanus de la Balaine avec des Polypes, le Limaçon Marin, la Crabe Veluë, & le Corail en forme d'Arrête de Harang	-	LXXVI.
La petite Tortuë de Marecage	-	LXXVII.
Le Chien de Mer eperonné, avec l'Insecte appelé le Baton Marchant	-	LXXVIII.
Le Chat de Mer Major	-	LXXIX.
Le Vautour noir couronné, ou Chaperonné, & le Serpent noir & blanc des Indes	-	LXXX.
Le Faucon de Marais , & l'Ortolan de la Caroline	-	LXXXI.
Le Perroquet à Collier, & le Perroquet à Tête bleuë	-	LXXXII.
La Perrique Couronnée de Saphir, & la Perrique aux Ailes d' Or	-	LXXXIII.
Le Dodo , & le Cochon d' Inde	-	LXXXIV.
L' Oiseau de Curassau & le Cusco	-	LXXXV.
Petite Grive	-	LXXXVI.
L'Alouette de Pensilvanie, & le Papillon brun	-	LXXXVII.
Moucherolles Couronnées d' or Mâle & Femelle	-	LXXXVIII.
Moucherole aux Ailes dorées, Papillon Tortuë marqueté	-	LXXXIX.
La Moucherole verte à Gorge Noire, & le Grimperau noir & blanc	-	XC.
Moucherolles à Gorge rouge , Mâle & Femelle	-	XCI.
Petites Moucherolles gris de fer , Mâle & Femelle	-	XCI.
Becs croisés, Mâle & Femelle	-	XCI.
Moineau à Gorge blanche, avec un Papillon jaune	-	XCIV.
Le Mangeur de Vers , & le Scarabée-Chevre	-	XCV.
Le gros-bec de Malacca, & le Jacarini avec un petit Papillon jaune	-	XCVI.
Le Wimbrel ou Petit Corlieu, & la Mouffe de Papier	-	XCVII.
Tringa Gris du Fer, au Pied de Poule d' eau, espèce de Becassine	-	XCVIII.
La Fregate, Poisson de la Chine	-	XCIX.
Le Paresseux	-	C.





Tab. I. L'Etourneau hupé Asiatique.



Der asiatische Schopfstaar.

A. I. Wirsing excudit Norimberg



PLANCHE I.

STVRNVS ASIATICVS CIR- RATVS.

L'ÉTOURNEAU HUPE D'ASIE.

Je tiens le dessein de cet oiseau de Monsieur REMY SEIFFART de KLETTENBERG, qui prenant intérêt aux ouvrages que je publie, me l'a envoyé de Francfort sur Main. Il y a ajouté une description latine faite par Mr. J. H. ZORN Curé de Diethfurth & Schambach. &c. J'ai taché de rendre exactement en gravure ce beau dessein, à la quelle je joins une traduction du texte qui l'accompagnoit.

L'an 1743 on tua six de ces oiseaux aux environs de Francfort: celui-ci fut tiré le 18 Juin, mais ne mourant pas tout de suite du coup, il fut apporté à Monsieur de KLETTENBERG, qui à ses mérites pour la ville joint beaucoup de connoissance en histoire naturelle. Il le reconnut d'abord pour un oiseau rare & inconnu dans nos contrées, & pour cela il le fit peindre & le montra à plusieurs étrangers qui vinrent le voir, & qui s'accordèrent tous à avouer qu'ils n'avoient jamais vû de semblable.

Cet oiseau est de la grandeur du Sanfonnet. Son bec depuis la pointe jusqu'aux angles de la bouche, n'est guères plus long que d'un travers de pouce: il est pointu, un peu applati & de couleur jaune. La machoire supérieure n'est pas plus longue que l'inférieure. L'iris des yeux est de couleur cendrée; les pieds d'un jaune brunâtre, les tarses de la longueur d'un travers de doigt & demi, & assez forts en comparaison de la grandeur de l'oiseau. Les trois doigts de devant sont égaux, tuberculés, & garnis d'ongles crochus de couleur noire. Quant à la couleur de cet oiseau, elle étoit très noire à la tête & au cou. La partie postérieure de la tête est ornée d'une hupe qui a une longueur de deux travers de doigts, & qui pend par derrière: mais l'oiseau peut la dresser

A

&

a) C'est une chose remarquable en effet, que de nos tems il a passé par l'Allemagne plusieurs espèces d'oiseaux, dont auparavant on n'avoit eu aucune connoissance. Je dois mettre dans ce nombre ceux, qui en 1744 se montrèrent en grandes troupes dans la Marche de Brandebourg, desquels je rapporterai, ce que je tiens de Monsieur JEAN GODEFRÖY RICHTER, curé de Rampiz sur l'Oder, très versé en histoire naturelle, & dont nous attendons avec impatience l'édition de son Ichthyothéologie. (elle a paru depuis: *Rem. du Traducteur.*) Voilà ce qu'il m'écrivit à leur sujet dans une lettre datée du 15 Juillet 1745: „Ce que je puis vous assurer, c'est que ces oiseaux étoient de la grandeur de l'étourneau, de couleur grise, noire, & blanc sale, grivelée à la manière des draines, mais à plus courte queue. Ils se nourrissoient de graines, gazouillant & chantant comme les jaseurs. Ils s'arrêtèrent parmi nous près de six semaines, & allèrent toujours par grandes troupes. Je les nommeroie à cause de la forme de leurs queues, les grives étrangères, ou les petites draines. Ils venoient par la Pologne, sans doute de la Grèce & des forêts de la Russie.



& replier à volonté. Les ailes ont partout la même couleur avec la tête. La queue qui n'avoit pas au delà de deux travers de doigts en longueur, étoit tout aussi noire, ainsi que les plumes des cuisses. Le dos & le croupion sont couleur de chair ou d'un rouge pâle. jusqu'aux couvertures de la queue, à l'exception de quelques taches noirâtres qui s'étendent vers les deux côtés du cou.

De cette description tout le monde pourra juger à mon avis, que cet oiseau est étranger chez nous, & qu'il ne peut pas être mis dans le nombre des oiseaux d'Allemagne, pas même de ceux d'Europe. Je fais bien à la vérité, qu'ALDROVANDE grand connoisseur d'oiseaux en rapporte deux, (*Ornithol. L. xvi. C. xii § xv*) qui à l'égard des couleurs ont quelqu'analogie avec les nôtres, & qu'il met tous les deux dans le genre des merles. Le premier de ces oiseaux d'ALDROVANDE, qu'il appelle le merle à deux couleurs (*Merula bicolor*) est bien tel, puisque ses couleurs sont le brun ou le noirâtre, & le jaune rougeâtre. Le second qu'il appelle *) le merle couleur de rose (*Merula rosea*), est orné de cette couleur sur la poitrine, le dos & les ailes c), ainsi que le nôtre. Mais malgré tout cela, personne ne soutiendra jamais, que deux espèces qui se ressemblent en quelques points, sont pour cela tout-à-fait les mêmes. Car quand il s'agit de déterminer de quel genre est un oiseau, il ne suffit pas de faire attention aux couleurs, mais il faut aussi regarder leur distribution, & l'ordre qu'elles tiennent, & les propriétés, la forme & la structure des membres. La couleur donc de notre oiseau, n'étant pas la brune, mais la noire & celle des plumes des ailes ensemble avec les couvertures étant la même, & non pas couleur de chair ni couleur de rose **), notre oiseau étant orné en outre d'une grande huppe, & étant très différent des grives ***) dans ses parties extérieures; il est évident qu'il n'est pas le même avec les grives d'ALDROVANDE, mais qu'il est d'un genre absolument différent, & qu'il est un oiseau étranger & rare,

Quoiqu'un chacun qui a quelque connoissance des oiseaux, puisse juger d'après ce que nous venons de dire, que notre oiseau n'appartient pas aux merles, nous examinerons cependant la chose un peu plus en détail. Il y a en Allemagne deux espèces de merles proprement dites, & qui dans le sens le plus propre méritent ce nom. La première est le *Merle commun*; dont le chant est mélodieux, & qui est tant soit peu plus petit que la grive étrangère à tête & dos couleur cendrée c). Le mâle, surtout quand il est adulte, est d'un noir foncé, son bec est jaune ou couleur de safran, ses pieds sont un peu allongés & noirâtres, la queue de la longueur d'un travers de main: il mène une vie solitaire, & ne souffre

b) Cet oiseau est aussi représenté, dans l'ouvrage d'EDWARDS. (planche XX, & dans la copie de Seeligmann Tom. I. pl. XXIX. de même que dans les figures de Monsieur d'AUBENTON pl. 251. & dans l'ornithologie de Monsieur de BUFFON T. III. planche XXII. *Remarque du Traducteur.*)

*) Cela n'est pas bien dit: ni le merle couleur de rose, ni l'oiseau dont il s'agit, ont les ailes de couleur rouge.

**) Encore une fois, les ailes du merle couleur de rose sont noires, & tout concourt à démontrer avec la dernière évidence, que l'oiseau qu'on veut faire passer ici pour nouveau, est absolument le même avec le merle couleur de rose. S'il y a quelque variété dans les nuances, cela peut être une différence de sexe, ou d'âge, ou de climat. Le merle couleur de rose s'étant trouvé en Italie, en Bourgogne, en Sibérie, & ayant été tué aux environs de Londres, pourquoi ne passeroit-il pas aussi en Allemagne? *Rem. du Traduct.*

***) Dans l'original allemand il est dit *cailles* au lieu de grives, ainsi que deux lignes plus bas. Je ne sçais pas, ce que les cailles ont à faire ici. En général il paroît, qu'avec beaucoup de verboiserie, il s'est glissé quelque négligence dans la rédaction de cet article. *Remarque du Traducteur.*

c) La grive étrangère, qui tous les ans arrive par troupes des frontières de la Russie & de la Tartarie, qui se montre aussi en Allemagne & y passe l'hiver, a obtenu sans toute son nom allemand de *Krametsvogel*, du mot *Kremme* ou *Kramme*. (qui signifie le *Genièvre*, anciennement & dans quelques provinces. *Rem. du Trad.*) Ceux qui ont voyagé en Groenland, assurent en avoir vu jusque vers Spizbergen. Les Esclavons & les Russes appellent cet oiseau *Zimor*, d'où vient l'allemand *Ziemer*, & le nom de *Dohnenvogel* vient de la rivière de Don. (C'est de la Draine qu'il s'agit ici. *Rem. du Traducteur.*)



souffre point de son semblable autour de lui, à l'exception de sa femelle. L'autre espèce est le *Merle à collier*, qui tient son nom du collier ou du plastron blanc qu'il a sur la poitrine. On le nomme aussi *Merle de montagne* *), de la demeure qu'il choisit. Il est un peu plus gros que le *Merle commun*, & s'en distingue en outre en ce qu'il ne chante pas, & qu'il est plus sociable. Aussi ne le voit-on pas rarement en automne voler par troupes dans nos champs & nos forêts, ensemble avec les draines & les mauvis. Le bec du mâle, quoiqu'il ne diffère pas de celui du *Merle commun* en forme & longueur, n'est pas cependant safrané, mais d'un jaune tirant sur le brun. A l'égard des pieds & de la longueur, de la queue il lui ressemble parfaitement, ainsi que pour la couleur, à l'exception que les petites plumes & les couvertures des ailes, de même que les plumes de la poitrine & du corps sont bordées de blanc. Les deux espèces, le merle à collier, comme le merle commun, se nourrissent de vers & de limaçons, ils aiment aussi différentes bayes, comme celles du cochenille **) et du genièvre. Ils font leurs nids sur les branches des arbres & des buissons, ainsi que dans les rochers et les troncs d'arbres, et c'est de menu bois, de racines fibreuses & de terre qu'ils le forment. Si nous voulions suivre GESNER (*Ornithol. T. I. pag. 42. & suiv.*) & d'autres auteurs, nous devrions encore faire mention de différentes autres espèces de merles. Mais comme GESNER, très estimable d'ailleurs, a rassemblé tout ce qu'il a rencontré, et compilé indistinctement, il n'a été guères possible de ne pas confondre les espèces, et de faire p. e. un oiseau particulier de la femelle du merle commun, par la raison qu'elle est plus brunâtre que noire, qu'au cou elle a un peu de rougeâtre, et qu'elle a la poitrine et le ventre cendrés : de même qu'il a fait avec la femelle du merle à plastron, qui manque de collier, et qui est plus bariolée de blanc et de cendré que le mâle.

Les merles ressemblant aux grives non seulement par le bec, les pieds et la queue, mais aussi par la nourriture et autres propriétés, c'est à mon avis avec raison, que WILLOUGHBY les a rangés dans le même genre. Mais le bec de notre oiseau étant très différent de celui des grives, ses pieds étant plus courts ainsi que sa queue, on ne peut pas trop bien l'y rapporter. Il est bien vrai que le *Loriot* est aussi communément classé avec les grives, quoiqu'il ait les jambes et la queue plus courtes qu'elles. Il en est de même avec le *merle d'eau*, dont la queue est très courte, et qui a aussi le bec beaucoup plus mince & plus court que le merle ordinaire. Mais comme le *Loriot* ne convient avec les merles proprement dits, qu'à certains égards, j'ai toujours été d'avis, qu'on n'étoit aucunement fondé de l'y joindre. Si après cela on considère que tous nos oiseaux aquatiques, surtout ceux qui prennent les oiseaux au vol, ont la queue courte, pour ne pas être gênés à la poursuite de leur proie ; on sera d'accord avec moi, je pense, que d'un oiseau d'eau à un oiseau terrestre on ne peut pas tirer de conclusion. Je passe sous silence, que WILLOUGHBY (pag. 104.) a séparé entièrement cet oiseau aquatique du genre des grives ***).

Plusieurs personnes aux quelles j'avois montré cet oiseau, l'ont pris sans hésiter pour une espèce de *hupe*, à cause de l'ornement qu'il porte sur la tête. Mais en comparant, ces oiseaux on verra d'abord, qu'ils diffèrent considérablement. Car en premier lieu la hupe de notre oiseau n'est pas une couronne formée par des plumes disposées en peigne, & placées en deux rangs dans toute la longueur de la tête, depuis la base du bec jusqu'à l'occiput, aussi ne peut elle pas se replier & s'étendre comme celle de la *hupe*. En second lieu, ces oiseaux ne peuvent pas être du même genre, à cause de la différence du bec, qui dans notre oiseau est à peine de la longueur d'un travers de doigt, & trois fois plus long dans la

A 2

hupe,

*) Il vaudroit mieux de s'abstenir de ce nom pour ne pas le confondre avec le *Merle de Montagne* de Monsieur BRISSON. T. II. p. 232. ou avec le grand merle de montagne de Mr. BRISSON. T. III. p. 347. Rem. du Trad.

**) *Sorbus aucuparia. Linn.*

***) Mr. de Buffon (ou plutôt Mr. Guenau de Montbéliard) est du même sentiment. En effet, quoique son bec ait la petite échancrure de celui des grives, il en diffère cependant à d'autres égards, ainsi que par sa manière de vivre, pour mériter de former un genre à part. Encore moins puis-je trouver de la ressemblance entre son bec et celui de l'étourneau, au quel Linnaeus l'a rapporté. Rem. du Trad.



hupe, ne ressemblant pas mal à un petit bec de bécasse, à l'exception qu'il est plus pointu, & un peu plus arqué. Notre oiseau ensuite étant de ceux qui volent par troupes, la hupe au contraire étant solitaire, c'est une nouvelle raison de les séparer. Que si enfin nous faisons attention à leur manière de marcher & de voler, nous y trouverons encore une différence sensible, car le nôtre a non seulement la démarche droite, mais aussi a-t-il le vol rapide sans doute : la hupe au contraire marche bas & le ventre contre la terre, à la manière de la bécasse, & dans l'air il ne se transporte que lentement.

Il me reste à dire en peu de mots ce que je pense de cet oiseau. Comme entre toutes les espèces d'oiseaux qui demeurent en Allemagne & les provinces voisines, ou entre ceux qui ne font qu'y passer en certains tems, il n'y en a aucune qui ait plus d'analogie avec notre oiseau que l'étourneau, je ne hésite aucunement, & je crois être fondé de le regarder comme une espèce d'étourneau. Pour obvier à tous les doutes qu'on pourroit avoir, il ne sera pas mal fait de rapporter quelques points relatifs à l'étourneau, et de les comparer avec ce qui a été dit de notre oiseau étranger. L'étourneau a reçu son nom latin de *sturnus*, du Grec *στέρας*, *stéras*, qui signifie, *s'étendre en tombant par terre*, parceque ces oiseaux tombent par troupes & s'étendent sur la terre. Il surpasse le merle en grandeur *), il en est distingué encore par son bec, qui est plus long que la largeur d'un pouce, jaunâtre, pointu, & un peu plus applati que celui du merle. L'iris des yeux est blanchâtre ou plutôt d'un gris cendré, & dans l'angle des orbites il se trouve la paupière interne, (*membrana nictitans*). Le mâle a des plumes allongées à la partie postérieure de la tête, qui ont l'air d'une hupe quand l'oiseau les dresse. Les tarses sont de couleur brune & de la longueur d'un travers de doigt & demi, les doigts sont tuberculés, & les ongles crochus & de couleur noire. Les plumes avec les couvertures sont toutes noires, mais au printemps elles ont un reflet bleuâtre ou pourpré, qui relève beaucoup la beauté de l'oiseau, surtout du mâle. En automne après le tems de la mue les pointes des plumes sont en partie blanc jaunâtres, ou rougeâtres. La queue est de la longueur de deux travers de doigts, & ses couvertures d'en bas sont de couleur cendrée, mais au croupion elles ont un reflet verd. C'est d'ailleurs une chose connue même aux enfants, que le sanfonnet est de nombre des oiseaux qui chantent, & qui apprennent à imiter la voix tant des oiseaux que de l'homme. Il demeure dans les forêts & les prairies, mais il préfère les endroits marécageux. Il se nourrit de différents vers, surtout quand ils sont gras, de vers de terre, de chenilles, de limaçons, de scarabés & de fauterelles. Les bayes de raisin mûres, les bayes de sureau, et les mûres sont fort de son goût. Il niche dans les champs, faisant son nid dans les arbres creux, surtout dans les chênes, qui ont été percés de trous par les pics ; aussi je sçais, qu'ailleurs ils nichent dans les trous des batiments, des tours & des rochers. Au mois d'Octobre ils s'en vont par troupes, & reviennent en Février, ou bien au mois de Mars quand l'hiver est fort rude & long.

En comparant à présent ce que je viens de dire du *sanfonnet* commun, avec la description que nous avons donné plus haut de notre oiseau rare, on trouvera qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ils sont les mêmes pour la forme extérieure, et se ressemblent parfaitement dans la conformation des parties, telles que le bec, les yeux, les pieds, la queue, & les ailes. Ils volent par troupes l'un & l'autre, & se nourrissent des mêmes choses. La queue courte de notre oiseau & d'autres caractères que nous observerons dans la suite nous font présumer qu'il niche également dans des trous. Peut il donc rester encore quelque doute, que l'oiseau dont nous donnons la description ne soit un étourneau? **)

La

*) C'est précisément le contraire ; Mr. Briffon le dit, & chacun pourra s'en convaincre en comparant ces deux oiseaux. (rem. du trad.)

**) Il n'en reste plus du tout, depuis que nous sommes informé par Mr. Pallas que le Merle couleur de Rose (car c'est précisément lui dont il est parlé dans ce chapitre) est une véritable espèce d'étourneau. Voici ce que ce savant voyageur naturaliste en dit, dans l'*hist. de son voyage Tom. II. p. 461. de l'original allem.* Au delà de Semijarsk les deux rives du fleuve d'Irtisch sont bordées de montagnes de plus en plus, & dès lors on commence aussi à observer les beaux étourneaux couleur de rose, ou comme on les appelle communément Merles couleur de rose, qui nichent dans les fentes et les creux des montagnes de cette contrée découverte. Ils volent en quantité & souvent par troupes, poursuivant les fauterelles

La hupe dont cet oiseau est orné, & la grande différence de couleur ne prouve rien contre mon assertion. Car en premier lieu j'ai dit plus haut, que l'étourneau commun a pareillement une espèce de hupe, & puis tous ceux qui ont la moindre connoissance d'ornithologie savent que les oiseaux des pays orientaux ainsi que les méridionaux, qui peuvent être rapportés à un de nos genres, ont sur les nôtres l'avantage de la beauté des plumes, & d'autres ornements, mais que ceux-ci ont le ramage plus agréable.

Il n'est pas à douter, qu'il ne se trouve des étourneaux par tout, & c'est une chose constante, que notre espèce commune voyage en certains tems dans d'autres parties du monde, & qu'il s'en retourne. Du moins on en voit en quantité au cap de bonne espérance, où ils font beaucoup de dégât aux raisins mûrs pendant les mois de Février & de Mars, & doivent en être écartés & chassés soigneusement. (voy. la description du Cap, par PIERRE KOLB, p. 335. II^e édit. de l'année 1745. dans la traduct. franç. T. III. p. 159.) Les étourneaux ne sont étrangers non plus à l'Amérique, au témoignage de MARCGRAVE*) allégué par Cyprian dans son commentaire de FRANZII *hist. animal. sacr. Tom. I. P. II. §. xxvi p. 1502*. On pourra consulter de même la description de la province de Caroline par LAWSON p. 219. WILLUGHBY au rapport de CYPRIAN, à l'endroit cité, fait mention d'un étourneau des Jades. GESNER représente pareillement dans la seconde partie de son *histoire des oiseaux* d, fol. 136. différentes espèces d'étourneaux étrangers tirés d'ALDROVANDE. Il n'y a pas à douter non plus, que cet oiseau se trouve aussi en Asie, puisqu'il y peut trouver sa subsistance tout aussi bien qu'en Afrique & en Amérique. Du moins THEVENOT, qui se connoissoit très bien en curiosités exotiques, l'a-t-il décrit au naturel, à mon avis, dans les paroles suivantes : *A Nakfchi Rustan, & à Tschelminar on voit des oiseaux de la grandeur des merles, & dont le bec a la même longueur & la même épaisseur, mais il est de couleur de chair ainsi que tout le corps, au point que cet oiseau au premier coup d'oeil paroit manquer de plumes, à l'exception de la tête, de la queue & des ailes, où il en a de noires. On en voit toujours voltiger autour des trous qui sont en grand nombre dans ces ruines e). Il en paroît aussi à Schiras mais uniquement dans la saison des mûres, dont ils sont fort friands, du moins des blanches. Ils ressemblent beaucoup aux étourneaux pour la forme & la grandeur.*

A cette description de THEVENOT on reconnoitra aisément notre oiseau, car elle convient avec la nôtre non seulement à l'égard de la taille, mais aussi dans la couleur des plumes. Mais cet auteur parlant en outre de la demeure de ces oiseaux dans les mines de vieux bâtiments, il est assez évident, qu'ils cherchent leur retraite dans les trous des murs, qu'ils y nichent & y font leur couvée, & qu'en cela ils ressemblent encore à nos étourneaux. Il se trouve un autre trait de ressemblance dans ce qu'il dit de leur nourriture, qui consiste en mûres, sur tout de l'espèce blanche, & probablement aussi en raisins qui croissent aux environs de Schiras, & qui sont fort du goût de ces oiseaux de Perse. Il est vrai, que THEVENOT ne parle pas de la hupe dont notre oiseau est pourvu, mais cela ne doit pas nous embarrasser, cet auteur ne l'ayant pas vu de près, mais seulement de loin & au


B

vol,

relles de concert avec les étourneaux noirs, ou bien se posant par terre au milieu des troupes des bestiaux., Mr. PALLAS ajoute dans une note, que les auteurs rangent cet oiseau mal-à-propos dans le genre des grives, que tous ses caractères, son port et ses mœurs demandent qu'on le réduise au genre de l'étourneau, dans la compagnie duquel il aime aussi à voler. A cause de cette ressemblance on a eu raison de lui donner dans ce pays le nom de *Kamenoi Skworez*, ç. à. d. *Etourneau de roche*.

Mr. GMELIN le jeune a donné pareillement la description de cet oiseau, dans le I. Volume de son voyage. p. 153. sans cependant parler de sa ressemblance avec l'étourneau; il lui donne un bec bleuâtre. (Rem. du Traducteur.)

- *) Le traducteur a parcouru d'un bout à l'autre les chapitres dans lesquels MARCGRAVE traite des oiseaux, sans trouver le moindre passage qui fut relatif à l'étourneau.
- d) C'est l'édition de HORSTIVS imprimée à Francfort en 1669. sous le titre de *Gesnerus redi-vivus* &c. dont on s'est servi dans cette allegation.
- e) Sur ces ruines, *Chilminar*, on peut consulter, la nouvelle Géographie universelle de J. C. FVNCCK, en allemand mise au jour par CHR. BENJ. HAECKEL, à Vlm. 1740. Tome II. p. 4293.



vol, pendant lequel tous les oiseaux ornés d'une hupe l'abaissent, ainsi qu'on peut le remarquer dans la hupe de notre pays, la mésange hupée, les plongeurs hupés, le vanneau et autres oiseaux semblables.

Que si enfin on demande par quel accident cet oiseau, ainsi que d'autres oiseaux étrangers, arrive des pays les plus éloignés *) jusque dans l'Allemagne, je m'imagine, que premièrement cela se fait dans le tems de leur passage, où il leur arrive souvent d'être emportés au loin par les vents, f) qui les emmènent jusques dans nos contrées. Car ainsi que presque tous nos oiseaux s'en vont chaque année, sans cependant se transporter tous dans d'autres parties du monde, on peut de même supposer avec vraisemblance que cela arrive aussi aux oiseaux habitants de l'orient & du midi. Cela étant g), il n'est guères possible, que quelques fois il n'en vienne pas dans des pays, où auparavant on en a vû rarement ou point du tout. En second lieu, il arrive, que les oiseaux ne trouvant pas à s'apareiller dans la saison de l'amour, sont engagés quelques fois à entreprendre de longs voyages pour chercher une femelle. C'est par un tel accident que j'ai rencontré souvent les oiseaux les plus rares h), & je ne doute pas, que la même observation n'ait été faite par d'autres amateurs. En troisième lieu, c'est pour chercher leur subsistance, que certains oiseaux quittent leur patrie où elle commence à leur manquer, & qu'ils se transportent ailleurs i). Enfin il n'y a pas à douter, que les oiseaux de notre pays ne se joignent dans leur passage à d'autres espèces du même genre k), & que dans leur retour ils nous amènent quelque oiseau étranger l). Il peut donc se faire de même, que nos étourneaux parcourant l'Asie soient accompagnés par quelques uns de l'espèce Asiatique, qui les suivent jusqu'en Allemagne. On pourroit demander pourquoi cela n'arrive pas plus souvent? à quoi je répondrai, que sans doute cela s'est fait bien des fois; et que cela arrive encore, mais qu'il ne vient pas toujours à notre connoissance, parceque peu de personnes y font attention.

La quan-

*) Probablement ces oiseaux ne venoient pas de si loin. Linnaeus dit qu'ils demeurent en Laponie, car pour la Suisse où Linnaeus les met aussi, ils n'auroient pas échappé à Gesser, s'ils y nichoient, du moins les naturalistes d'aujourd'hui en parleroient-ils. Mais peut-être demeurent-ils en Espagne ou en Hongrie, ou dans la Grèce, ou dans l'île de Corse ou de Sardaigne.

f) Les cicognes p. e. se voyent rarement en Angleterre, & n'y sont emmenées que par le vent ou par d'autres accidents. Voy: CYPRIAN *Comment. in Franzii hist. anim. sacr. T. I. pag. 996.* d'après MERRET. *Pin. rer. natur. britann. pag. 181.* & Willughby *pag. 210.*

g) Les pigeons sauvages d'Amérique (*Columba migratoria L.*) s'en vont chaque année. voy. LAWSON *l. c. pag. 221.* qui dit la même chose de l'oiseau bleu, (*qui est probablement la Poule Sultane*) p. 225. Nous lisons dans *Jerémie Chap. VII.* que la cicogne & la tourterelle, ainsi que la grue & l'hirondelle quittent la palestine.

b) C'est ainsi que j'ai vû quelques fois au printemps un autour blanc, de même qu'un héron de la même couleur. C'est une chose connue qu'au printemps nos perdrix surtout les mâles suivent les femelles fort au loin. voy. *Le passetems agréable* par PERNAVER *pag. 237.* & *suiv.*

i) Tous nos oiseaux, particulièrement les insectivores nous quittent en automne pour la dite raison, & s'en vont dans des climats plus doux, au contraire ceux du nord arrivent chez nous.

k) Aussitôt que les Litornes arrivent chez nous, elles recherchent la compagnie des Draines: et l'expérience nous apprend, que les Mauvis se joignent aux Grives, ainsi que les pinçons d'Ardenne volent avec les pinçons ordinaires. (Mr. de Buffon dit, que les Grives & les Draines voyagent seules, III. p. 268. & que Mr. Hebert a vû des nuées de grives de toute espèce, principalement de Mauvis & de Litornes, p. 276).

l) Je me ressouviens que dans ma jeunesse étant assis à l'aire d'oiseleur j'ai vû passer une volée de litornes, parmi les quelles il y avoit quelques oiseaux plus grands, dont la couleur principale étoit la brune, & le bec étoit de couleur jaune. Je ne les ai plus vus depuis, & ils me sont inconnus, mais je crois qu'ils sont arrivés avec les litornes dans leur passage. (C'étoient probablement de grands merles de montagne, dont il a été parlé plus haut à la note. (*Remarque du Traducteur.*))





La quantité des êtres créés, & leur variété nous apprennent combien la puissance & la sagesse du Créateur sont immenses, & en combien de manières différentes il a exprimé ses perfections dans toutes ces formes si variées & si merveilleuses. Pouvons nous assez glorifier sa souveraine bonté, qui nous a doués de raison & de sens, pour comprendre les ouvrages divins infiniment supérieurs à toutes nos productions de l'art, pour pouvoir les admirer, nous en rejouir, & y reconnoître leur sublime auteur? Certes les oiseaux n'étant pas des moindres de ces ouvrages divins, nous devons en contemplant la grande variété d'espèces, élever en même tems nos cœurs vers lui, & exalter sa sagesse, sa puissance & sa bonté infinie. En effet chacun, qui veut y apporter toute son attention, doit se convaincre de ces perfections du créateur tout-puissant, en considérant nos oiseaux indigènes: car ils sont tous construits de façon, qu'il est douteux si c'est plutôt leur forme, ou leurs couleurs, ou leur ramage, ou leur autres propriétés, qui sont les plus admirables. Mais que dirions nous, si transportés dans d'autres parties du monde nous y voyions tant de différentes espèces d'oiseaux inconnus, & que nous eussions le plaisir d'admirer leurs couleurs brillantes & leurs autres propriétés si différentes de celles de nos oiseaux? Combien aurions nous lieu de nous écrier: Que tu es grand, o Dieu, combien ta sagesse, ta puissance & ta bonté sont-elles grandes! Tous les coins de la terre, les déserts, les mers & toutes les eaux tu les a peuplées de tant de volatiles si variés, & tu leur as enseigné à tous les moyens de leur conservation!

Ce sont ces réflexions, que tout le monde n'a pas l'occasion de faire à la vérité, n'ayant pas celle de se transporter dans des pays étrangers, & d'y admirer les richesses de la puissance & de la sagesse divine - mais souvent la providence nous envoie des autres parties du monde différents oiseaux, comme autant de hérauts des perfections de l'être suprême, qu'il est de notre devoir d'observer avec attention, & de nous élever par ces sortes de considérations vers la divinité à la quelle ces créatures doivent leur existence & leur conservation.

PLANCHE II.

TVRDVS AVREVS Kleinii.
ORIOLVS Brissonii.

LE LORIOT.

N'ayant pas été possible de conserver un certain ordre dans la suite des planches, je pense qu'il sera nécessaire pour l'amour des amateurs, de commencer la description de chaque oiseau par les dénominations génériques & spécifiques sous les quelles Messieurs KLEIN & BRISSON les ont compris dans leurs méthodes, qui sont aussi généralement approuvées que connues*).

B 2

Le

*) Le traducteur voit avec peine, qu'on passe sous silence l'immortel LINNAEVS, dont les mérites sont bien au dessus de ceux de KLEIN. Il range le *Loriot* dans sa seconde famille des oiseaux, au genre de l'*Oriolus*, où il figure comme la première espèce sous le nom de *Galbula*. *Syst. Nat. Edit. 12. Gen. 32. Sp. 1. p. 160.*



Le Lorient est mis par Mr. KLEIN *a)* dans le genre des grives, ou *Turdi*. Il forme dans sa distribution le cinquième genre de la quatrième famille. M. BRISSON *b)* le range aussi dans le genre des grives, mais pour pouvoir conserver, à ce qu'il paroît, les noms génériques des autres auteurs, il établit certains genres inférieurs pour ainsi dire, parmi lesquels se trouve aussi celui des *Oriolus*, et le Lorient se présente à leur tête. Le genre des grives est contenue dans la première sousdivision du cinquième ordre. C'est le vingt-deuxième genre de la suite, & notre oiseau y fait la 57^{ème} espèce *c)*.

On observe dans cette espèce d'oiseaux la même chose qu'on remarque très souvent dans d'autres, c'est que la femelle diffère du mâle surtout dans la couleur. C'est pour cette raison que je donnerai premièrement la description du mâle, à la quelle je joindrai ensuite les différences de la femelle.

La grandeur de cet oiseau (selon Mr. BRISSON p. 247. ou 322 edit. orig.) est de neuf pouces & demi. Mais ceci peut être sujet à des variétés, puisque par différentes causes les individus de la même espèce n'atteignent pas le même degré d'accroissement. Son bec est droit, vouté longitudinalement en dessus, & à-peu-près de la longueur de treize lignes *d)*. Mr. BRISSON remarque dans ses caractères génériques entre autres, que son bec est aussi épais que large à sa base, ce qui l'accorde assez bien avec ce que mon exemplaire me montre. La couleur du bec est d'un beau rouge. La machoire supérieure s'incline un peu vers le bout, faisant un petit crochet, & à chaque côté de la pointe il se trouve une petite éminence *e)*. La surface intérieure de la machoire d'en haut est garnie d'une arrête longitudinale qui peut-être répond à un fillon semblable de la langue. Mr. KLEIN remarque en outre dans ses caractères génériques, que la machoire supérieure est mobile & forme un craquement contre l'inférieure. La machoire d'en bas est plus courte d'une ligne & demie que celle d'en haut, ainsi que je l'ai observé dans l'un & l'autre sexe. Il paroît que Mr. KLEIN a exprimé la même chose, dans sa planche XIV. fig. 8. a. La machoire inférieure rentre dans la cavité de la supérieure. Les narines sont de forme ovulaire; la langue est en gouttière *f)*. Le palais est de couleur jaune. Depuis les narines jusqu'un peu au delà des yeux il y a une tache noire en forme de moustache. L'iris des yeux est rouge *g)*. Les plumes de la tête, de la gorge, des joues, de la poitrine, du ventre et du dos sont d'un beau jaune brillant. Cette couleur sur le dos vers la queue tire sur l'olivâtre, & sur le ventre le jaune est plus pâle, tandis qu'à la tête, au cou & à la poitrine il est plus foncé. La longueur de la queue est de trois pouces quatre lignes, au rapport de Mr. BRISSON (p. 247. ou 322. de l'origin.) mais moi je ne l'ai pas trouvée si grande. Elle est composée, ainsi que je vois, & que

a) Voy. JACOB. THEODOR. KLEIN. *Stemmata avium*. p. 11. fam. IV. gen. V. ainsi que son *histoire des oiseaux*, corrigée & augmentée, en allem. p. 66. num. 7.

b) Voy. L'Ornithologie de Mr. BRISSON. T. 1. p. 213. & 247. Je me fers de l'édition qui a paru en raccourci à Leyde 1763. in 8vo, seulement avec le texte latin & sans figures. (Dans l'édition originale c'est Tom. II, p. 320. Rem. du trad.)

c) C'est dans ma description de cet oiseau, que je rapporterai à leur place les caractères génériques donnés par ces deux auteurs systématiques.

d) Mr. BRISSON a trouvé la même mesure: celle que j'ai trouvée dans les doigts, s'est de même assez accordée avec celle que Mr. BRISSON a donnée. Je crois donc, qu'on doit faire plus de fond sur la mesure de ces parties, que sur celle des parties ci-dessus rapportées.

e) Mr. BRISSON indique ces éminences, en disant dans ces caractères, que les bords de la mandibule supérieures sont échancrées vers le bout. (Et effectivement ce sont aussi des échancrures & non pas des éminences. Rem. du Traduct.)

f) On pourra comparer la belle figure de KLEIN Tab. XIV. f. 8. d. (mais la langue fendue que Linnaeus lui attribue, n'y est pas exprimée. Je n'ai pas actuellement sous la main un oiseau fraîchement tué, pour examiner de quelle manière cette *lingua bifida* de LINNAEVS doit être entendue. Le continuateur de Mr. de BVFFON dit qu'elle est fourchue & comme frangée par le bout. III. p. 260. Rem. du trad.)

g) Voy. Mr. BRISSON. pag. 248. (324.)



& que FRISCH h) même l'a représentée, de douze rectrices, dont deux du milieu*) & une de chaque côté. Elles sont à-peu-près de longueur égale. Celles d'en bas surpassent latéralement les supérieures, tant soit peu. Les deux pennes du milieu sont presque entièrement noires en haut, il n'y a que les extrémités, qui sont jaunes. Les dix autres sont noires de même au de là de la moitié, ayant vers le bout des taches jaunées, qui sont d'autant plus grandes, que les pennes sont plus extérieures. En bas elles sont d'un jaune pâle. Les ailes appliquées contre le corps atteignent les trois quarts de la queue, selon Mr. BRISSON. C'est ce que je trouve bien dans la femelle, que je possède, mais dans les mâles je vois, que les bouts des ailes surpassent encore la queue de quelque chose**). Les ailes étendues ont selon Mr. BRISSON seize pouces quatre lignes d'un bout à l'autre. La couleur des ailes est noir brillant. A la troisième partie de la longueur des ailes, & au bord du côté extérieur il y a une tache i) d'un jaune pâle, formée par la pointe de quelques plumes des couvertures. Les pennes sont toutes noires en haut, il n'y a que les extrémités & les bords intérieurs, qui sont blanc sale. En dessous les ailes sont recouvertes de plumes jaunées. Les pieds sont garnis de plumes semblables jusqu'au talon, & le tarse est de couleur plombée. Les ongles sont noirs. Il y a quatre doigts, dont trois tournés en avant, & un en arrière. Ils sont séparés dès leur origine***). Le doigt du milieu, selon l'observation de Mr. BRISSON a dix lignes & demie, l'extérieur en a neuf, l'intérieur sept & demi: celui de derrière est long de huit lignes, mesure de Paris. Tout cela je le trouve conforme avec mes propres observations. Le doigt postérieur ensemble avec son ongle est le plus fort.

Voyons actuellement en peu de mots les différences de la femelle. Mr. BRISSON a remarqué que le bec rouge de la femelle se termine en jaune vers la pointe. Dans l'échantillon que j'ai devant moi il est entièrement rouge. Je ne peux pas passer sous silence, que FRISCH a peint le bec de la femelle de la même couleur qu'ont les plumes de la tête. Je ne déciderai pas si c'a été une variété, ou bien si c'est une erreur du peintre: ce qu'il y a de certain c'est que Mr. BRISSON & moi nous l'avons observé différemment.

Les plumes de la tête, celles de la partie supérieure du cou, & celles du dos sont de couleur olivâtre. Le jaune perce un peu plus à la tête & au cou, mais sur le dos il devient plus obscur: vers la queue il commence à reparaitre. La gorge, le dessous du

C

cou

b) Voy. *Les Figures des oiseaux d'Allemagne* par JEAN LEONHARD FRISCH. II. Division. IV. Genre. Planche III.

*) (Elles sont appelées dans le texte allemand *Deck-federn*, ce qui signifie *Couvertures*. Mais ce n'est pas là ce qu'on appelle ainsi. Les couvertures sont les plumes plus courtes, qui couvrent la base des pennes soit des ailes soit de la queue, & cela tant en dessus qu'en dessous. Rem. du trad.)

**) (Je les trouve dans le mâle comme dans la femelle. Dans la figure de cet ouvrage elles ont la même proportion. Peut-être l'oiseau empaillé, qui a servi de modèle à l'auteur, n'étoit-il pas bien monté, ainsi qu'il n'arrive que trop aisément quand on ne conserve pas l'os de l'humerus. Je remarquerai aussi, que dans la figure le front est de couleur noire, ce qui ne s'accorde ni avec la description, ni avec les oiseaux, que j'ai eu occasion d'examiner. Rem. du trad.)

†) Outre cette tache la figure de FRISCH en montre encore deux autres dans la planche nommée, l'une un peu plus bas. La première peut bien s'être formée des plumes du ventre, qui se sont appliquées contre le bord de l'aile: l'autre est une ligne oblique, dont je ne sçais que faire. Je soupçonne, que ce sont les bouts couleur blanc-sale de plusieurs plumes, qui dans mon individu se réunissent d'une manière à-peu-près parallèle près de la huitième penne de l'aile, en commençant à compter par en bas. Je ne trouve pas qu'ailleurs il soit fait indication de ces taches, et elles manquent dans mes échantillons. (Dans une paire d'ailes étendues que je conserve, je remarque que le bord antérieur de la seconde et de la troisième penne est de couleur jaune, & que deux ou trois des plumes des couvertures derrière la grande tache ont pareillement la pointe jaune. C'est peut-être ce que FRISCH a voulu exprimer. Rem. du trad.)

***) Mr GUENAU DE MONTBÉLIARD dit, que la première phalange du doigt extérieur est soudée à celle du doigt du milieu. Mais cela n'est pas fort apparent. Rem. du trad.)



cou & le commencement de la poitrine sont parsemés de plumes blanches tirant sur le cendré. Sur la poitrine les plumes verdâtres s'entremêlent de nouveau, & vers le bas-ventre se terminent en jaune, qui près des ailes & de la queue devient très beau. Je remarque à la queue, que les deux rectrices du milieu sont noires tirant sur l'olivâtre. Dans les dix autres, dont cinq de chaque côté, on observe distinctement, comment le bout jaune devient plus grand à mesure, que les rectrices sont plus extérieures. En dessous elles sont jaunes vers le côté intérieur & noires vers le bord extérieur. La couleur des ailes est noir sale, & la couleur olivâtre du dos s'y perd petit - à - petit. La tache des ailes dont il a été parlé dans la description du mâle, est plus petite dans la femelle.

Le Lorient arrive chez nous très tard, communément vers la pentecôte, quand les feuilles des arbres se sont développées, & il habite dans des petits bois, où les arbres à larges feuilles se trouvent mêlés avec les arbres toujours verts*). Sa voix ressemble au chant du merle, à l'exception qu'elle est un peu plus grave, & se termine en I, O. c'est à cette occasion, que FRISCH fait la remarque ingénieuse, que ces lettres, i, o, sont contenues dans la plupart des noms de cet oiseau^k). Son nid est fait de toiles d'araignées de dépouilles de chenilles**), & d'herbe tendre, jaune: il est suspendu à une ou plusieurs branches bifurquées. Peut-être aurons nous l'occasion d'en dire d'avantage dans un autre endroit. Il est de la longueur de deux travers de main, & se termine en haut en une espèce de col recourbé, dont l'ouverture est assez ample pour permettre l'entrée à l'oiseau***). Cette courbure le garantit en quelque manière contre la pluie.

*) Le traducteur l'a vu nicher plus d'une fois dans des villages même sur le sommet des plus hauts noyers.

k) FRISCH a traité amplement cette matière dans sa description du lorient, & il mérite d'être consulté à cet égard; car c'est sur tout ici que paraît son grand génie, qu'il a montré partout dans la recherche de l'étymologie des noms. Dans quelques uns de ces noms, la chose est claire†) comme le jour, ainsi que dans celui d'*Oriolus*, *Chlorio*, *Lorient*. Dans d'autres cette origine est plus cachée, quoiqu'on ne puisse pas lui refuser son approbation, comme dans le mot de *Byrole* & ceux, qui en dérivent. Mais dans d'autres il y a guères d'apparence qu'on puisse les en dériver, comme p. e. *Pfingst-vogel*, (oiseau de pentecôte) *Kirsch-vogel*, (oiseau de cerise) *Gold-Amsel* (merle doré,) *Gelbe-Drossel*, (Grive jaune), mais ils paroissent plutôt tirer leur origine, du tems de l'arrivée, de la nourriture, du genre et de la couleur de l'oiseau. FRISCH est obligé d'en convenir lui même, avec tout cela il trouve tant de plaisir aux lettres i, o, dans les mots de *Kirsch-vogel* & *Pfingstvogel*, qu'il feroit tenté de les en dériver par reillement.

†) Avec la permission de l'auteur, il me paroît que c'est par un très grand hazard, que les lettres i et o se trouvent dans ces noms. Celui de *Chlorio* lui a été donné évidemment par les grecs, dans l'intention d'en exprimer la couleur, & de là dérive le françois *Lorient*. *Oriolus* au lieu d'*Auriolus* marque encore la couleur d'or de cet oiseau. Le nom de *Witternal*, *Galbedro* et autres ne contiennent pas ces deux lettres.

**) Mr. SALERNE (dans son *Ornithologie*, p. 186.) reprend FRISCH avec raison, en assurant que ce n'est pas tant de dépouilles de chenilles que de laine que le nid est construit. Celui que nous conservons est fait de filasse et de laine. Mr. GUENAU DE MONTBELIARD substitue de même des brins de chanvre aux toiles d'araignées, qui certainement donneroient peu de solidité au nid (Rem. du trad.)

***) Voilà une observation, que nous ne trouvons dans aucun auteur, & que nous n'avons jamais faite nous même. Le nid que nous conservons dans notre collection & plusieurs autres que nous avons vus, sont à découvert, & suspendus à une bifurcation simple de la branche. Le nid représenté dans les planches de FRISCH, & celui de la 47 planche des nids de WIRSING ne montre point de couverture non plus. Y auroit-il de la variété dans la structure de ce nid, ainsi que Mr. de BUFFON a remarqué dans celui du moineau, qui couvre son nid d'une calotte quand il le fait en pleine campagne? Au reste il n'est pas parlé dans cet article des oeufs du Lorient, dont on trouvera la description & la figure dans l'ouvrage sur les nids, et Pl. IX. fig. 2. des oeufs de KLEIN. (Remarque du Traducteur.)



B.R. Dietzschin pinx.

Eisvogel.

A.L. Wirsing Sc. et excud. Nürnberg.

pluye. Il fait deux couvées *l)*, qui se suivent de très près l'une l'autre, selon l'observation de FRISCH; car il nous quitte déjà au mois d'Aôut. Ses petits sont au nombre de trois à quatre. Quand on s'approche de son nid, il l'indique lui même par ses cris plaintifs. Il mange des petits vers & des chenilles avec les quelles il nourrit aussi ses petits. Il est de même très friand de cerises dont il ne mange cependant, que la chair: car il rejette le noyau, qu'il abandonne pour ainsi dire aux gros becs & à d'autres animaux. Qui est - ce qui n'admira pas ici, comme dans une infinité d'autres exemples, la sage providence du créateur, qui souvent destine le même fruit pour la nourriture de plusieurs animaux, en distribuant sa part à chacun.

FRISCH remarque encore à l'égard des petits, que dans l'un & l'autre sexe ils ressemblent à la femelle, & que ce n'est pas dans notre pays, mais dans le climat où ils passent l'hiver, que les mâles obtiennent leur belle couleur jaune.

PLANCHE III.

ISPIDA Kleinii, Brissonii, Linnaei.*)

MARTIN-PESCHEUR en françois.

KINGFISHER en anglois. EISVOGEL en allemand.

Notre *Martin - Pescheur* se trouve dans l'ornithologie de KLEIN *a)* au quatrième genre, de la troisième famille. Dans celle de Mr. BRISSON *b)* il fait la première espèce, du cinquante huitième genre, de la troisième section, 14^{ème} ordre.

En voici la description. Sa longueur d'après Mr. BRISSON (*T. II. p. 177. ou T. IV. p. 473. de l'édit. orig.*) est de six pouces & demi, mesure de Paris^{**}). La longueur du bec

C 2

l) ZORN dans sa *Petinotheologie T. II. p. 322.* assure qu'il ne fait qu'une seule couvée, & cela par la raison qu'il nous quitte de bonne heure. Il paroît donc que Zorn ne le dit que par conjecture, & je suis d'autant plus porté à ajouter foi à l'affertion de FRISCH, qui dit expressement, que ses deux couvées se suivent de très près, parceque son départ est plus hâté. Je me suis beaucoup servi au reste de l'ouvrage de ZORN, & assez ordinairement j'ai trouvé ses descriptions très vraies.

**)* LINNAEVS n'appelle pas cet oiseau *Ispida*, mais *Alcedo Ispida*. C'est contre les règles de ce grand naturaliste même, de se servir d'un nom de guerre, (qu'il appelle nomen triviale) sans le faire précéder du nom générique. Cela doit être observé d'autant plus, que souvent des animaux de différents genres portent le même nom trivial; comme *Coracias Garrulus*, & *Ampelis Garrulus*, *Tringa Calidris*, & *Charadrius Calidris*; *Cervus Pygargus*, & *Falco Pygargus* &c. Au reste le *Martin - Pescheur* fait la troisième espèce du 62^{ème} genre, dans la dernière édition du *Systema naturae*. (*Rem. du trad.*)

a) *Stemmata Avium. p. 6. & hist. des oiseaux allemande par le même. p. 34. 35. & p. 33. de la première édition latine.*

b) *Ornitholog. T. II. p. 176. ou T. IV. p. 471. de l'édit. orig.*

***)* Cette allégation n'est pas tout-à-fait juste. En copiant d'autres on devoit du moins copier exactement. Mr. BRISSON donne selon la coutume deux dimensions, l'une du bout du bec jusqu'à celui de la queue, qui est de 6 pouces, 9 lignes; l'autre jusqu'au bout des ongles, qui est de 6 pouces, 7 lignes. (*Rem. du Traduct.*)



bec, selon le même, est d'un pouce onze lignes, mais dans mon échantillon il a deux pouces accomplis. Les coins de la bouche s'étendent jusques dessous les yeux. Le bec est droit *c*), allongé, comprimé latéralement, en sorte qu'à sa base il n'a que trois lignes d'un côté à l'autre, tandis qu'il en a quatre du haut en bas. Au reste il est fort, & se termine en une pointe obtuse. Sa couleur est noire en dehors, (au rapport de Mr. BRISSON, au même endroit,) avec la différence, que dans les angles & vers en bas elle tire sur le blanc. En dedans il est jauné. La machoire supérieure est un tant soit peu plus courte, que l'inférieure, dans mon échantillon*), aussi est-elle tout-à-fait creuse en bas. Ses côtés sont comprimés en sorte qu'elle forme une pyramide triangulaire dont le bord supérieur est tronqué. Le demi-bec inférieur est un peu plus grand, que le supérieur, ainsi qu'il a été dit, il est pareillement creux jusques près de la pointe, qui est arrondie.

La largeur est la même dans toutes les deux, & dans mon**) échantillon le bord de celle d'en haut rentre dessous le bord inférieur à l'un des côtés, au côté opposé c'est le contraire. La langue est large & si courte, qu'on la voit sortir fort peu hors du gozier *d*). La tête & la poitrine sont fort grosses à proportion du reste du corps. Devant & derrière les yeux il y a une tache rouge sale *e*), & plus en arrière il y en a une blanche, & en dessous une autre verd-foncé***). En dessus la tête est verd-noirâtre parsemée de petites lignes transversales bleues, assez rapprochées pour la faire paroître écailleuse. Vers le devant ces lignes tirent sur le verd, & vers le derrière sur le bleu de Berlin. La gorge est blanche. Le dos dans toute sa longueur depuis la nuque jusqu'à la queue montre le plus beau bleu de Berlin, entremêlé de distance en distance d'un verd approchant du bleu foncé *f*). Sur la queue le bleu devient si foncé qu'il ressemble beaucoup au bleu d'acier. Sur le devant au dessous de la gorge il règne un rouge sale, qui s'étend sur toute la poitrine ensemble avec le bas ventre, remonte un peu vers le dos sur les deux côtés, & couvre les ailes tout en dessus****). Un verd foncé accompagne le bleu du dos des deux côtés dans toute la longueur des ailes. Sur les couvertures des ailes je remarque les mêmes lignes bleues transversales, qui se trouvent sur la tête. Le bord extérieur des

c) Ces mots pourroient faire croire, que le dessin est mal fait. Mais la courbure apparente du bec ne vient, que de l'attitude de l'oiseau. (Le traducteur a beau tourner son oiseau en tous sens, le bec ne paroît jamais courbé. On auroit pu ajouter, que les narines se trouvent à la base du bec, & sont recouvertes en partie par une membranule.)

*) Dans deux oiseaux empaillés, que j'ai devant moi, je trouve précisément le contraire. La machoire supérieure surpasse l'inférieure d'une demi ligne environs. (Rem. du trad.)

**) Cela vient probablement de ce que l'oiseau, qui a servi de modèle n'étoit pas bien monté. Dans les miens la machoire supérieure débordé l'inférieure des deux côtés. (Remar. du traduct.)

d) Voyez la *Petinothéologie* de Zorn. T. II. pag. 439.

e) Le rouge de ces taches & du bas ventre est proprement couleur de brique. De là nos lecteurs comprendront aisément, pourquoi Mr. BRISSON l'appelle rouge, ZORN au contraire le nomme couleur d'orange.

***) Je ne trouve cette tache verd-foncé ni dans la figure, ni dans mes échantillons. La tache blanche n'est pas exprimée non plus dans la figure, au contraire elle en montre de rouges sur la nuque, qui n'existent pas dans la nature. (Rem. du trad.)

f) A l'égard de cette couleur verte il faut, que je remarque qu'elle passe aisément au bleu foncé: de là vient que ZORN (*Petinothéologie* T. II. pag. 439. l'appelle bleu foncé, Mr. BRISSON au contraire (*Ornithologie* T. II. pag. 176. T. IV. pag. 471. ed. orig.) la fait vert-foncé. L'un & l'autre de ces auteurs a raison, car le verd-foncé & le bleu-foncé sont si voisins, que selon la position différente de l'oiseau, ou selon le jour plus ou moins clair, il paroît tantôt bleu tantôt verd. Il se peut encore, que dans quelques individus le verd a le dessus, & dans d'autres le bleu. C'est ce que mon propre échantillon me fait soupçonner, qui quoiqu'ayant pris la couleur bleue, a cependant toujours conservé la verte en même tems.

****) C'est ce que je n'observe pas dans mes oiseaux dont l'un est monté ayant les ailes étendues. On pourroit dire avec plus de raison, que les couvertures inférieures des ailes, ainsi, que celles qui recouvrent la queue en dessous, & dont le bout atteint peu s'en faut celui des rectrices, est de la même couleur rousse. (Rem. du traduct.)

des pennes des ailes, qui se présente à la vue, est verd foncé ou bleu. Le bord intérieur caché par les pennes supérieures est noir, dont on peut s'assurer par les pointes faillantes. En dessous elles sont gris de fer, ainsi qu'elles sont ordinairement. La queue, selon Mr. BRISSON (p. 177. T. II. ou 473. T. IV.) a quinze lignes de long. Elle n'est pas partagée à la manière de celle de la plus grande partie des oiseaux, mais les rectrices se terminent en un bout émoussé. Les couvertures de la queue sont bleu d'acier en dessus, ainsi que nous avons déjà remarqué; les rectrices placées dessous sont noires par dessus, & c'est cette même couleur qu'elles ont toutes ensemble sur la surface inférieure. Les ailes, à ce que dit Mr. BRISSON, lorsqu'elles sont pliées ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Dans mon échantillon elles la surpassent*). Selon le même, l'oiseau a dix pouces de vol. Les pieds sont fort courts, recouverts de plumes jusqu'au talon, de couleur rouge, à l'exception des ongles, qui sont noirâtres. Trois des quatre doigts qu'il a, sont tournés en avant, & un en arrière^g). Ce qu'ils offrent de plus remarquable, c'est que celui du milieu est étroitement uni au doigt extérieur jusqu'à la troisième articulation, & au doigt intérieur jusqu'à la première^h). C'est de cette conformation, que Mr. BRISSON a tiré les caractères de ses familles, & KLEIN le plus grand nombre de ses caractères génériques. Mr. BRISSON fixe avec raison la longueur du doigt du milieu & de l'extérieur à sept lignes & demie, & celle de l'intérieure & de la postérieure à quatre lignes.

Cet oiseau demeure le long des eaux, surtout des fleuves & des ruisseaux. Il se nourrit de poissons, qu'il guette perché sur un saule ou autre buisson, ou qu'il attrape en rasant l'eau. Rarement il manque sa proie, mais ordinairement il s'en empare en fondant dessus. Il reste chez nous toute l'année, & fait sa couvée de très bonne heure; en sorte, que ZORNⁱ) a trouvé dans le bord d'une rivière des jeunes à demi drus, déjà vers la fin de Février. Il fait son nid le long de l'eau, dans des trous de la profondeur d'une aune, pratiqués dans les rivages élevés. Il fait six à sept petits, qu'il nourrit de poissons qu'il macère auparavant dans son gosier. Dans tout le voisinage il ne souffre pas son semblable^k).

PLANCHE

*) Cela vient probablement encore de ce que l'oiseau, qui a servi à l'auteur, n'a pas été bien monté, & de là il vient aussi sans doute, que les plumes rouffes des flancs ont recouvert l'articulation du coude. Dans le mien & dans beaucoup d'autres, que j'ai vus, je trouve la proportion donnée par Mr. BRISSON.

^g) KLEIN place cet oiseau dans la famille de ceux, qui ont deux doigts devant & deux derrière, par la raison, que quand il est perché, les doigts ont cette disposition (Voy. ses *Stemmata Avium* p. 6.). Et pour plus de certitude, il a représenté l'oiseau perché sur une branche (Planche V.) Avec tout cela je ne suis pas de son avis, mais je place, avec Mr. BRISSON, trois doigts en avant, un en arrière. Voilà mes raisons, que je soumets au jugement des lecteurs. Le doigt intérieur, que KLEIN prétend se tourner en arrière, n'a que deux articulations, dont l'une est tout-à-fait réunie avec le doigt du milieu. Comment donc est-il possible, que ce doigt puisse être tourné en arrière? Il peut bien le tourner vers le dehors, & cela lui est déjà d'un assez grand secours, quand il grimpe le long des rochers: mais qu'il le retourne tout-à-fait, cela est absolument impossible. L'insertion même du doigt postérieur s'y oppose, car il prend son origine en dedans, ainsi que dans tous les oiseaux, qui ont trois doigts devant & un derrière.

^h) Pour être exacte, je dois remarquer, que cela est bien vrai, à l'égard du doigt extérieur, mais non pas pour l'intérieur. Car le premier est composé de quatre articulations, l'autre au contraire ne l'est, que de trois, dont la longueur supplée au nombre du premier.

(Le traducteur avoue, qu'il ne comprend pas, ce que l'auteur veut dire par là. Le doigt intérieur certes est plus court, que l'extérieur de près de la moitié, ainsi, que plus haut l'auteur en convient lui même).

ⁱ) Voy. Sa *Petinothéologie* T. II. p. 90.

^k) De tous ces faits nous avons pour garant. ZORN Tome II. p. 440.)

P L A N C H E I V.

T U R D U S C R I S T A T U S. Klein.
B O M B Y C I L L A B O H E M I C A. Brisson.
A M P E L I S *) Linn.

LE JASEUR ou GRIVE DE BOHEME. Franç.

Cet oiseau se trouve dans les ouvrages de KLEIN, (tant dans les *Stemmata avium*, que dans *l'histoire des oiseaux augmentée*,) placé dans la quatrième famille, genre cinquième, parmi les *grives*, sous le nom allemand de SEIDENSCHWANZ (*Queue de soye*,) et sous le nom latin de TURDUS CRISTATUS VULGO BOHEMICUS.

Mr. BRISSON le réunit pareillement à la vérité avec les grives (*Ornithologie. Ordre V. Sect. II.*) avec la différence cependant, qu'entre autres genres inférieurs il établit celui de *Bombycilla*, dans le quel notre oiseau se trouve comme la première espèce, sous le nom de *Bombycilla bohemica*. (la 63^{ème} espèce en tout.)

La longueur du Jaseur est de plus de sept pouces *a*) (voy. Mr. Brisson. T. I. p. 250. ou T. II. p. 333 in 4^{to}). Le bec a neuf lignes de long (selon le même. l. c.), il est de couleur noire, avec un peu de blanc, qui se montre en dessous & sur les côtés. Les coins de la bouche s'étendent jusques derrière les yeux. Le bec est droit, & ce n'est, que la pointe, qui est un peu courbée. Le demi bec supérieur est plus grand, que l'inférieur *b*), convexe en dehors, concave en dedans, & vers la pointe il y a deux petites eminences, que Mr. BRISSON T. I. pag. 213. (T. II. pag. 200. ed. orig.) regarde comme un des caractères génériques. Le long du milieu de la mandibule supérieure on observe la même ligne dont j'ai fait mention dans l'histoire du Loriot. Les bords de la mâchoire inférieure sont recouverts par ceux de la supérieure, aussi est elle plus courte, que la supérieure d'une ligne & demie *c*), & les petites eminences s'y trouvent *c*) comme dans celle d'en haut.

La

*) Ampelis (*Garrulus*) occipite cristato, remigibus secundariis apice membranaceo colorato.

Si de toutes les espèces nous avions des caractères aussi bien marqués, l'histoire naturelle seroit ou ne pourroit pas plus aisée. (*Rem. du Traduct.*)

a) Mr. BRISSON met 7 $\frac{1}{2}$: & moi je mets tout simplement -- au delà de sept pouces, parceque je croyois qu'il étoit superflu de regarder à trois lignes en donnant la longueur de l'oiseau, qui peut varier à mesure qu'on étend plus ou moins le col & la tête de l'oiseau.

b) Mr. de LINNE s'accorde avec nous, dans sa description belle & concise, qui se trouve dans son *Fauna Suecica*.

c) Le bec de cet oiseau étant très court, les deux mâchoires seroient très disproportionnées certainement, si la différence de la longueur des deux mandibules étoit aussi considérable. Dans mon individu la mâchoire supérieure surpasse l'inférieure à peine d'une demi-ligne. (*Rem. du trad.*)

e) Mr. de LINNE est encore du même sentiment, au passage allégué. Voilà ses propres mots: *utraq. apice utrinque emarginata*. (Mais toujours cela ne signifie pas un tubercule, comme nous l'avons déjà observé, mais une échancrure. *Rem. du trad.*)

Tab. IV. *Le Jaseur de Bohême.*



B.R. Dietzschin pinx.

Seidenschwanz.

A.L. Wirsing Sc. et excud. Norimberg.

La voute du palais est de couleur jaune, ainsi que KLEIN l'a très bien remarqué (*Stemmat. Avium* p. 11.). Les narines sont placées des deux côtés de la base de la mâchoire supérieure, de forme ovale, & recouvertes par des poils noirs dirigés en avant^d). La langue est formée en gouttière, au rapport de KLEIN (p. 11. *loc. cit.*) & selon Mr. de LINNE (*F. suec.* p. 6.) elle est cartilagineuse & fendue à la pointe. Une bande noire s'étend depuis les narines jusques vers les yeux.

Sur la tête il y a une hupe, que l'oiseau dresse à volonté. Les plumes du front vers la base du bec sont de couleur brun-rougeâtre, sur le sommet & vers la nuque elles sont cendrées. Derrière les yeux commence une bande noire, qui entoure la hupe, par la quelle cependant elle est cachée en grande partie. Une grande tache noire se trouve sous la gorge, & les côtés de la mâchoire d'enbas^{*)} sont garnis de plumes blanches & brunes tirant sur le rougeâtre. Dans toute la longueur du dos à commencer depuis le cou les plumes sont de couleur cendrée, avec la différence, que vers en haut elle tire plus sur le brun, sur le blanc au contraire vers en bas. La même couleur cendrée quoique moins foncée regne à la partie antérieure du cou vers la poitrine, & sur le ventre & les cuisses le blanc devient très sensible. Le croupion^{**}) est recouvert de plumes rouffes. La longueur de la queue est très bien fixée à deux pouces trois lignes par Mr. BRISSON (T. I. p. 250. ou T. II. p. 334.). Les rectrices sont au nombre de douze, de longueur égale, de couleur noirâtre, terminées de jaune éclatant dans une étendue de quatre lignes. FRISCH & Mr. de LINNE^e) ont remarqué, que leurs bouts ont quelques fois la même couleur rouge, qu'on voit aux écailles oblongues & cartilagineuses des ailes. J'en ai observé moi même un commencement dans un individu. Les ailes appliquées contre le corps s'étendent jusqu'au bout jaune des rectrices, & quand elles sont déployées elles ont treize pouces d'une extrémité à l'autre (voy. Mr. BRISSON l. c.). Les couvertures supérieures & deux pennes des ailes sont cendrées, les autres de l'une & de l'autre espèce sont noires. Quelques unes des couvertures forment par leur bout blanc, une tache oblongue. Les pennes sont au nombre de 17 ou 18.

Les deux supérieures sont entièrement de couleur cendrée, ainsi qu'il a déjà été observé. J'ai remarqué plus d'une fois, que la seconde est terminée par une membrane rouge de la même manière que les suivantes. Les sept pennes, qui viennent ensuite sont noires à l'exception d'un peu de blanc sur le bord extérieur vers le bout, & la tige en se prolongeant forme les écailles membraneuses, oblongues & rouges, qui sont d'autant plus petites qu'elles se trouvent en plus grand nombre. Les six autres sont noires de même, bordées extérieurement de jaune de soufre, & de blanc sur la marge postérieure, de manière, que ces deux couleurs où elles se rencontrent font un angle droit. Au quatre inférieures je ne remarque rien de particulier, à l'exception du blanc sale dont elles sont bordées en dedans comme en dehors. ZORN (*Petinotheolog.* T. II. p. 317.) observe qu'il y a quelque différence entre le mâle & la femelle. Il dit, que le mâle est un peu plus grêle & moins long, que la femelle, & que les écailles rouges, & la couleur jaune de la queue & des ailes sont plus belles & plus éclatantes.

D 2

Cet

d) Mr. de LINNE indique ceci dans la description citée plus haut, par les mots: *Tectrices narium*. (Dans la dixième édition du *Systema Naturae*, il dit, que la base du bec est couverte de foyes comme dans les corbeaux. *Rem. du traduct.*)

*) Dans l'original allemand on s'est servi du mot, qui signifie le menton, & cela au nombre pluriel: expression, qui nous paroît être assez impropre. (*Rem. du trad.*)

**) Pour parler plus juste, il faudroit dire les couvertures inférieures de la queue. (*Rem. du traduct.*)

e) Voy. l'hist. des oiseaux d'Allemagne par FRISCH, la famille des grives: & l'ouvrage de Mr. de LINNE, que nous avons déjà cité plusieurs fois. Ce dernier auteur a si bien exprimé la chose, que je ne puis pas m'empêcher de rapporter ses propres paroles: *Rectrices nigrae, aequales, apice flavae, costa rubicunda*. (Cette couleur rougeâtre de la côte le traducteur ne la trouve pas, aussi d'autres auteurs n'en font-ils pas mention).



Cet oiseau arrive chez nous par grandes volées, mais tard & rarement. ZORN a remarqué surtout, qu'on l'a vu dans nos environs en 1741 & 1742; je sçais aussi pour sûr, qu'il a été pris en 1767. Quand il se fait voir chez nous, ce n'est qu'en Decembre, & il s'en va en Avril.

La conjecture de FRISCH, qui croit que c'est la disette de nourriture, qui l'oblige de la venir chercher chez nous, me paroît très probable. La rareté de cet oiseau jointe à ses écailles rouges ont sans doute engagé le peuple superstitieux à le regarder comme oiseau de mauvais augure, qui présagoit la guerre & la peste, & de le nommer en conséquence. Dans son passage il arrive par la Bohême, ce qui a donné lieu à la fausse idée qu'il habitoit ce Royaume^{f)}. Mais nous le savons des gens du pays même, qu'il n'en est rien. Il se trouve plus loin vers le Nord - Est^{*)}, ainsi que FRISCH a appris de Mr. DE STRAHLENBERG lui même, qui a rencontré ces oiseaux dans les rochers de la grande Tartarie. Ce n'est pas seulement du côté de la Bohême, que cet oiseau arrive dans son passage, mais il vient aussi de la Suisse^{g)}, d'où il dirige son voyage surtout vers le pays de Hesse. Le nom de *Seidenschwanz* (Queue soyeuse^{h)}) lui a été donné par les Saxons. Il se nourrit de bayes de genièvre, de raisins, & d'insectes. On peut l'élever en cage avec du son de millet pétri avec du lait, à quoi on peut ajouter des carottes, des bayes de genièvre & de forbier sauvage, du pain, des graines de chen-nevis & autres choses reduites en pâte. Il se jette avec avidité sur sa nourriture, & quand une volée s'est abattue sur les genévriers, elle ne s'élève pas facilement. C'est pour cette raison qu'on l'atrape sans peine. Son chant n'est qu'un gazouillement, & c'est de là que SCHWENCKFELD lui a donné le nom de *Zincirella* ou *Bombycilla incendiaria*^{**)}.



PLANCHE

f) C'est pour cela même qu'il est appelé en allemand *Boehmlin*, *Boehme*, en latin *Garrulus* aut *Turdus Bobemicus*, en françois *Geay* ou *Jaseur de Bohème*.

*) Dans l'original allemand il est dit Nord - Ouest, ce qui probablement est une faute d'impression. LINNAEUS dit qu'il niche dans les alpes des pays du nord: *Syst. Nat. ed. XII. p. 298*. On peut consulter aussi ce que Mr. GUENAU DE MONTBELIARD en a dit dans *l'hist. Nat. Univers. Ornithol. T. III. p. 432*.

g) On pourra consulter sur ceci la *Chronique de Brunsvic* par BÜNTING. A. 1752. pag. 1.

h) Il paroît que le nom de *Queue soyeuse* ne vient pas tant de la bande jaune, qui se trouve sur le bout des rectrices, & qui feroit l'effet d'une étoffe de soye jaune, ainsi que ZORN se l'est imaginé: il est plus probable, que les plumes, qui sont douces au toucher comme de la soye ont donné lieu à cette dénomination. Il se peut aussi qu'on se soit imaginé faussement, que les appendices des ailes, qui sont d'un rouge éclatant comme de la soye, appartiennent à la queue, & que de là dérive le nom en question. C'est peut-être par la même raison, que SCHWENCKFELD & Mr. BRISSON l'ont appelé *Bombycilla*.

***) (Le traducteur avoue, qu'il lui est impossible de trouver la moindre analogie entre le sens du terme *incendiaire*, & le gazouillement d'un oiseau).



B.R. Dietzschin pinx.

Nusheher.

A.L. Wirsing sc. et excudit Norimberg

PLANCHE V.

G A L G U L U S. Briffon.

GARRULUS*) Linn.

PICA ARGENTORATENSIS. Klein.

PICA COERULEA. Frisch.

L E R O L L I E R.

Cet oiseau est la première espèce du genre du *Rollier* (ou *Galgulus*) qui est le dix-huitième de la seconde section du quatrième ordre de l'ornithologie de Mr. BRISSON p. 173. (T. II. p. 64. ed. in 4^{to}).

KLEIN le rapporte au troisième genre de sa quatrième famille, qui porte le nom de *Pie* ou de *Geai*. Dans ses *Stemmata Avium* p. 10. il se trouve sous le nom de *Pica argentoratensis*, & dans son *histoire des oiseaux revuë, corrigée & augmentée*, (écrite en allemand) elle est désignée p. 61. par les noms allemands de *Mandelkraehe*, *Raeker*, *blaue Raake*.


Mr. DE LINNÉ le met dans le genre de *Coracias*, en le distinguant des autres espèces par l'épithète de *Garrulus*

La longueur de cet oiseau est de douze pouces six lignes : en grosseur il égale le geai : le bec, à compter depuis les coins de la bouche jusqu'à la pointe, a un pouce cinq lignes de long. La forme du bec est celle d'un cône allongé, droit, à pointe recourbée. Le demi-bec supérieur est un peu plus long & plus tranchant que l'inférieur, & vers sa base qui joint le front, sont placées dans une direction oblique les narines qui sont découvertes. La langue au rapport de KLEIN & Mr. LINNÆVS est fendue & cartilagineuse. La tête, le cou & le ventre sont verd de Berlin, la quelle couleur approche beaucoup du bleu qui porte le même nom. De là vient que les auteurs ont décrit ces parties les uns comme étant bleues, les autres de couleur verte.

En dessus l'oiseau est d'un jaune brunâtre. Il a deux pieds de vol, & les ailes lorsqu'elles sont pliées s'étendent jusqu'aux deux tiers de la queue. Sur leur surface supérieure elles sont d'un bleu de bluet, qui change plus ou moins au violet : le milieu est verd de Berlin, du côté du dos elles sont jaunes, & noires vers le bas. La queue a quatre pouces sept lignes de long. Elle est composée de douze pennes, dont les deux du milieu sont, verd-foncé, les dix autres verd-clair. Les plumes qui couvrent les jambes sont de la même couleur que le bas-ventre ; les tasses sont jaunefale. Les doigts sont au nombre de quatre, dont trois tournés en avant, & un en arrière. Ils sont séparés dès leur origine. Les ongles sont noirâtres.

Cet oiseau se nourrit de blé, dont dans le tems de la moisson il fait tirer les grains des épis, & de la terre dans le tems de la semaille. Il mange pareillement des scarabés, & des

*) Voyez la remarque du traducteur, au commencement du chapitre du Martin-pêcheur, & la 12^{ème} ligne de cette description du Rollier même.



& des vers, & au défaut d'autre nourriture il s'accommode aussi de bayes. Sa demeure la plus ordinaire est dans les forêts & les buissons épais, surtout dans les forêts noires ou pinayes, où il fait aussi son nid.

Il est très abondant aux environs de Strasbourg, & c'est pour cela que plusieurs auteurs lui ont donné le nom de *Geai de Strasbourg*.*)

P L A N C H E VI.

C O C C O T H R A V S T E S. Klein.

Linn.**) Brisson, Frisch, & alior.

L E G R O S - B E C.

Nous trouvons notre *Gros-bec* dans les *Stemmata Avium* de KLEIN rangé dans la IV^{ème} famille, XI^{ème} genre, des *moineaux*, IV^{ème} tribu celle du *Passer Coccythraustes*, sous le nom de *Coccythraustes*, *Ligurius major*, *Enucleator*. Dans son *histoire des oiseaux* au contraire il est à la tête de la troisième tribu. Mr. BRISSON lui laisse le même nom, en le plaçant au commencement du 34^{ème} genre, ordre IX^{ème}, Section première.

La longueur du *grosbec* au témoignage de Mr. BRISSON est de 6 $\frac{1}{2}$ pouces. Le bec, selon le même, a neuf lignes de long; son épaisseur est d'un peu au dessus de huit lignes, au rapport de KLEIN***). Il est de forme conique & se termine en une pointe très aiguë. Il est de couleur de chair mêlée de cendré a).

Les deux mandibules sont presque d'égale longueur, seulement la pointe de cette d'en haut surpasse l'inférieure de très peu. Leurs bords se joignent par une ligne droite, en sorte toutesfois que le tranchant de la mandibule supérieure se trouve plus dirigé vers le dehors, & celui de l'inférieure plus vers le dedans.

Les deux narines sont placées à la base du bec, & recouvertes de petites plumes noires. La base du -bec est entourée d'une bande noire peu large, qui des deux côtés s'étend derrière les yeux & sur la gorge vers le bas. Le front est blanc rougeâtre.

La nuque, la partie supérieure du cou, & les joues sont brun rougeâtre, sous laquelle couleur il se montre une large bande transversale cendrée. Derrière ces bandes cendrées

*) On pourra voir dans la description que Mr. GUENAU DE MONTBELIARD a donné de cet oiseau, (*hist. nat. univ. & partic. T. III. p. 136.*) que cela est absolument faux. C'est aussi dans le même endroit qu'on trouvera bien des faits qui pourront servir à compléter le présent article qui est très maigre, & qui ne répond pas à l'extension forcée qu'on a donnée au premier. *Rem. du trad.*)

**) Il auroit fallu ajouter que le nom générique de LINNAEVS est *Loxia*. (R. d. tr.)

***) N'auroit-il pas mieux valu, de prendre la mesure soi même, que de la compiler de deux auteurs qui certainement ne se sont pas servis du même pied? (R. d. tr.)

d) ZORN dans sa *Petinothéologie* T. II. p. 326. rapporte au sujet du bec de cet oiseau, qu'au printemps il est bleu foncé vers en haut & blanchâtre vers en bas & des deux côtés, ainsi qu'intérieurement à la voute du palais. Il dit que cela s'observe également dans les deux sexes, mais qu'il est plus marqué dans le mâle.



B.R. Dietzsch pinx.

A.L. Wirsing scet excud. Norimberg.


Kernbeiser.

drées il règne une couleur brun noirâtre le long de tout le dos, & des deux côtés près de l'insertion des ailes jusques vers la queue. Vers le haut elle se perd insensiblement dans le brunrougeâtre de la tête. Le bas ventre est cendré tirant sur le rouge. Le croupion est blanc. Les ailes pliées s'étendent jusqu'aux deux tiers de la queue, étendues elles ont onze pouces quatre lignes d'un bout à l'autre. Vers la partie supérieure des ailes on remarque une tache blanche. Les plumes des ailes sont noires en grande partie & bleu d'acier vers l'extrémité. Il y en a huit à neuf dont les bouts sont comme mutilés*) & chiffonnés. A la surface intérieure des plumes qui est cachée par celles de dessus, il y a une grande tache blanche.

La longueur de la queue, selon Mr. Brisson est de deux pouces une ligne. Les rectrices sont noires en général, leur bout est blanc, à l'exception des couvertures qui sont brun rougeâtres. Les pieds sont garnis de plumes jusqu'au talon, & de couleur rouge pâle, ainsi que les ongles. Les doigts sont au nombre de quatre, dont trois tournés en avant, un en arrière, & séparés depuis leur origine. Celui du milieu, selon Mr. Brisson, a onze lignes de long : les deux latéraux sont sensiblement plus courts ; le postérieur est de la longueur de l'extérieur.

La femelle diffère en quelque manière du mâle. Elle a des couleurs en partie moins vives, & en partie différentes. Nous avons dit dans la description du mâle, qu'en dessous il est, rouge - cendré, la femelle au contraire est tout - à - fait cendrée. La calotte brun - rougeâtre & les taches blanches des ailes sont cendrées de même ; & les pieds, qui dans le mâle sont rouge pâle, sont d'un brun clair dans la femelle.

La nourriture du gros - bec consiste en noyaux de cerises, prunes sauvages, graines d'Erable, glands, chenuevis, graines de raves, de choux, & de navets, & en faine, surtout en hyver. La grosseur de son bec, le tranchant de ses mâchoires, leur structure intérieure & la force de leurs muscles répondent merveilleusement à cette manière de se nourrir. Il couve deux fois par an, dans les bois & forêts, où il ne s'attache pas à de certains arbres particuliers, mais il fait son nid tantôt sur un tel arbre tantôt sur un autre. La structure & les propriétés de ce nid ainsi que ce qu'il conviendra de savoir à l'égard des oeufs, tout cela sera rapporté en son tems dans l'histoire particulière des nids. Ordinairement cet oiseau nous quitte en hyver, quelques fois cependant il arrive, qu'il en reste aussi chez nous. Il se prend aisément à l'appas des graines sur l'aire de l'oiseleur. Son ramage n'est pas le plus agréable, mais sa chair est bonne à manger.



*) Elles sont plutôt tronquées ; & Mr. BRISSON a exprimé la chose avec plus de vérité, en disant qu'elles sont coupées quarrément. (Rem. du trad.)

PLANCHE VII.
SITTA EUROPAEA Briss. Linn.
PICVS CINEREVS Frisch.
PARVS FACIE PICI Klein.
THE NUTHATCH. en Anglois.
SPECHTARTIGE MEISSE, BLAUSPECHT, KLEIBER,
 en Allemand.

LE TORCHEPOT, GIEMPEREAU.*)

Le Torchepot se trouve sous le nom latin de *SITTA* dans l'*Ornithologie* de Mr. BRISSON *Ordre XI. Genre 42. Espèce 1* : Dans les *Stemmata Avium* de KLEIN p. 16. & dans son *histoire des oiseaux corrigée* p. 89. il est mis dans la quatrième famille, seconde tribu, neuvième genre, qui porte le nom de *mésange* (*Parus*) où il fait la 15^{ème} espèce, & porte le nom de *spechtartige Meisse* (ç. à d. Mélange — pic) ou *Blau-specht*, (ç. à d. mélange bleue). Dans le *Système de la Nature* de LINNÉ *T. I. p. 115.* (actuellement p. 177. de la dernière édition) je le rencontre dans l'ordre des *Pies*, genre 55 (aujourd'hui 60) qui porte le nom de *Sitta*, avec l'épithète *d'europaea*.

Toute la longueur de l'oiseau va à cinq pouces & demi : celle du bec est de 10 1/2 lignes. La couleur du bec est cendrée, ou plutôt couleur de plomb, sa forme est conique, sa direction droite, ses bords tranchants ; la pointe du demi bec d'en haut est obtuse, & la langue qui se trouve dans le gosier est déchiquetée comme dans les mésanges. Pour ce qui est de la couleur de l'oiseau, elle est bleuâtre en dessus mêlée de cendré, & rougeâtre en dessous, mais cette teinte est plus forte vers les parties inférieures. A la tête il y a une bande noire, qui regne depuis le bec le long du cou jusqu'au dos, & qui fait pour ainsi dire la séparation du bleu & du rouge. La gorge & les joues sont blanchâtres. Les ailes ont pour la plupart la couleur du dos, à l'exception des grandes plumes qui sont noires, avec une bordure blanche en bas. La queue est longue d'un pouce trois quart, & formée de douze plumes, qui toutes en général ont les bords noirs, & les pointes cendrées. La plume extérieure en outre est traversée d'une bande blanche oblique, & les trois suivantes ont à leur bord intérieur une pointe blanche. Les pieds sont garnis jusqu'à l'articulation du tarse de plumes de la même couleur qu'a le ventre, le reste est de couleur jaunâtre. Ils se fendent en trois doigts antérieurs bien séparés, & un doigt postérieur.

C'est pour cette raison, ainsi que pour la forme du bec & de la langue, qu'on ne peut pas le mettre dans le genre du pic, quoique quelques auteurs l'y aient rapporté, à cause de l'habitude qu'il a de grimper comme eux. Le doigt du milieu, & le postérieur

*) Ce nom se trouve ajouté dans l'original allemand. Il ne convient pas à l'oiseau, (car il ne s'agit pas ici des noms de province, mais des noms universellement reçus parmi les connoisseurs) mais le traducteur n'a pas voulu le retrancher n'ayant rien voulu changer au texte, pour la certitude de l'allégation.



B.R. Dietzschin pinx.

Klauber.

A.J. Wising sculpsit. Norimberg 1766.



B.R. Dietzsch pinx.

Blaukehlchen.

A.L. Wiering sc. et excud. Norimberg 1766.



rieur ont dix lignes en long au rapport de *Mr. Brtsson a)* mais les deux latérales sont sensiblement plus courts.

Cet oiseau se trouve en Europe. Il fait sa demeure dans les forêts, où il se nourrit d'insectes *b)* qu'il trouve dans les fentes des écorces d'arbres. Son bec, quoiqu'il n'approche pas de la force de celui du pic, en a cependant assez pour faire un trou dans les troncs des arbres pourris, où il a coutume de faire son nid. Si l'ouverture est plus grande qu'il ne lui faut pour entrer & pour sortir, il en ferme le superflu avec du limon, & ne lui laisse que la capacité nécessaire. Delà le nom allemand de *Kleiber c)*. Il grimpe le long des troncs des arbres à la manière des pics, en quoi les penes de la queue lui font de quelqu'usage.

P L A N C H E V I I I .

CYANECVLA. Briss.

PHOENICVRVS PECTORE COERVLEO Frisch.

SYLVIA GVLA COERVLEA THORACE EX ALBO
VARIEGATO. Klein.

MOTACILLA SVECICA. Linn.

BLAUKEHLCHEN. en allem.


L A G O R G E B L E U E .

Dans l'Ouvrage de Mr. BRISSON on trouvera l'oiseau mentionné dans l'Ordre X. Genre 40, (*Ficedula*) espèce 19, avec le surnom latin de *Cyanecula*. Dans l'histoire corrigée des oiseaux de KLEIN il se trouve (p. 18.) dans la IV. famille, III^{ème} tribu, dans le genre des *Sylvia*, où il fait la quatrième espèce, avec l'épithète de gorgebleue à pourpoint à tache blanche. Le Système de la Nature de LINNAEUS

a) Pour rendre la description de cet oiseau plus complète, il auroit fallu ajouter que le doigt postérieur est plus épais & plus fort que celui du milieu, & qu'il en est de même avec l'ongle qui termine ce doigt. C'est ce qui à mon avis constitue le vrai caractère de cet oiseau ainsi que les foyes qui couvrent les narines, dont notre auteur n'a pas fait mention non plus. (*Remar. du trad.*)

b) Il est dit *Vers* dans le texte, sans doute par inadvertance. Mais il se nourrit aussi principalement de noix & autres fruits semblables. C'est ce qui est rapporté par *Linnaeus*, & ce que nous avons vu nous même. Aussi porte-t-il pour cela en allemand le nom de *Nuss-bicker*, que notre auteur a oublié, & qui signifie becqueteur de noix, ce qui diffère du nom qu'on donne au casse-noix. Le nom anglois est fondé sur la même propriété. (*Rem. du trad.*)

c) *Kleiber* signifie en allemand coller, mastiquer, torcher. Delà vient aussi le nom françois de cet oiseau *torchepot*, parcequ'il ferme avec un torchis son nid fait en forme de pot.




NAEVS T. I. p. 187. (pl 336. de la dernière édition) le met dans le 99^{ème} genre (aujourd'hui le 114^{ème}) qui est celui de *Motacilla*, avec le surnom de *fuecica*.

Au temoignage de Mr. BRISSON toute la longueur de cet oiseau est de 5 $\frac{1}{2}$ pouces, & celle du bec séparément est de 8 lignes. Il a la forme d'une alène. Les deux mâchoires sont droites, & à-peu-près de la même longueur. Les narines sont placées à la base du demi-bec supérieur, & sont ouvertes. La couleur de l'oiseau est noir cendrée en dessus & grisrougeâtre en dessous. Devant & derrière les yeux on remarque une bande noirâtre, accompagnée d'une tache blancrougeâtre en dessus & en dessous *d*). La gorge, la partie inférieure du cou & le commencement de la poitrine sont bleu de bluet. Dans son milieu il y a une tache ronde d'un blanc éclatant *e*). Le bleu de la poitrine se termine en bas par une bordure noire festonnée, qui se termine en une autre couleur de brique, la quelle se perd elle même dans la couleur cendrée du bas ventre. Les ailes sont de la même couleur que le dessus du corps, & leurs extrémités vont jusqu'au milieu de la queue, quand elles sont étendues il y a huit pouces un quart d'un bout à l'autre. La queue est composée de douze rectrices, qui sont assez longues à la manière de tous les oiseaux du genre de *Sylvia* *f*) au point que cette longueur qui est de deux pouces une ligne, fait près de la moitié de celle de l'oiseau entier. Les deux rectrices du milieu ou supérieures sont noirâtres dans leur milieu, & rougeâtres vers les bords : Les dix autres sont rouffes à la base, & se terminent en une pointe noire. Les pieds sont couverts de plumes jusqu'aux talons, & sont de la couleur du bas ventre. La peau nue qui recouvre le talon & les quatre doigts, est de couleur noire, & de ceux-ci trois sont tournés en avant & séparés, le quatrième est tourné en arrière. Les ongles qui terminent les doigts sont pareillement noirs. Le doigt du milieu surpasse les autres en longueur, & porte huit lignes selon Mr. BRISSON, après la quelle vient le postérieur qui approche le plus de la longueur du doigt nommé, enfin viennent les deux doigts latéraux qui sont considérablement plus courts.

FRISCH avoit remarqué à l'égard des jeunes de ces oiseaux & notamment du mâle, qu'avant d'atteindre à leur parfait accroissement ils ont au lieu du plastron bleu, le cou gris blanchâtre, sur les deux côtés du quel il y a deux rangs de taches grises tirant sur le noir, qui descendent de la gorge vers la partie inférieure du cou, & le commencement de la poitrine, & qui se perdent en différentes bandes transversales formées de semblables taches, qui sur le cou sont grisnoirâtres, & bleues sur la poitrine.

La gorgebleue, au rapport de FRISCH, n'est pas aussi rare en Allemagne qu'on le croit communément, mais sa timidité & son amour de la solitude font qu'on la voit rarement ; car le plus souvent elle se trouve seule, & elle s'envole aussitôt qu'elle aperçoit quelqu'un. On la rencontre surtout dans les champs & les jardins, où il y a des pois dans les quels il aime à nicher. Sa nourriture consiste en mouches & en bayes. On la nourrit en cage avec des oeufs de fourmis & du coeur de boeuf haché à la manière des rosignols, dont elle imite aussi le chant. Elle se tient volontiers dans les endroits, où elle est à portée de l'eau, parcequ'elle aime à se baigner.



PLANCHE

d) Je ne conçois pas quelle variété l'auteur doit avoir eu devant les yeux. Pour moi je ne vois rien de tout ceci dans l'individu que j'ai présent, au contraire tout s'accorde parfaitement avec la description de Mr. Brisson. (Rem. du trad.)

e) On trouve quelquefois, mais rarement des individus, où cette tache blanche manque absolument. (Rem. du trad.)

f) KLEIN avoit donné le nom générique *Sylvia*, & en allemand *Brustwenzel*, à tous les petits oiseaux à bec effilé, qui portent la poitrine haute & voutée, & qui l'ont marquée d'un plastron de couleur différente du reste du corps. (Rem. du trad.)



Tab. IX. *Le Chardonneret.*



Stigeliz.

A.L. Wirsing fec. et excud. Norimberg.

PLANCHE IX.

C A R D U E L I S. Brisson. Klein.

Linn. aliorumque.

G O L D - F I N C H. en Angl.

D I S T E L F I N C K. S T I E G L I Z. en Allemand.

LE CHARDONNERET.


Cette espèce d'oiseaux se trouve dans l'Ornithologie de Mr. BRISSON Tab. I. pag. 320. 321. (Tab. III. p. 53. de l'édit. orig. in 4^{to}.) dans le IX Ordre, I. Section, 32^{ème} genre, où elle est la première espèce. Dans KLEIN je le rencontre tant dans les *Stemmata Avium*, que dans la nouvelle édition corrigée de son *histoire des oiseaux* à la quatrième famille, genre 16, tribu quatrième sous le nom allemand *Distelfinck*, *Stiegliz*, & sous le nom latin *Fringilla Jovis*, *Carduelis*. Le Chevalier de LINNE' le met dans l'ordre des moineaux, au genre des pinçons, où il lui donne la neuvième place, (aujourd'hui la septième, dans la dernière édition *R. d. t.*) en le distinguant des autres espèces du même genre, par l'épithète de *Carduelis*, & par les caractères tirés de la qualité des penes des ailes & des rectrices.

La longueur de tout l'oiseau ne va guères au de là de cinq pouces : mais celle du bec séparément est de six lignes environs, & celle de la queue à peu près de deux pouces. Le bec a la figure d'un cône pointu, qui se termine en une pointe grêle & allongée. Les deux mâchoires sont de longueur égale^g, & vont en ligne droite depuis la base jusqu'à la pointe, sans la moindre échancrure qui dans d'autres espèces d'oiseaux se rencontre fort souvent. La couleur du bec est blanche, ce n'est que la pointe qui montre un peu de noir. La gorge & le front sont rouges ; l'occiput & le commencement de la partie supérieure du cou sont noires, la partie inférieure du col & le dos sont brun-noir, ainsi que les ailes, à l'endroit où elles joignent le corps. Le cou par en bas & latéralement ainsi que la poitrine & le ventre sont blanchâtres mêlés de roux, de manière que cette dernière couleur devient plus sensible sous le croupion & proche des ailes. Devant les yeux & vers l'ouverture de la bouche il y a une petite bande noire. Les ailes appliquées contre le corps vont jusqu'au milieu de la queue, étendues elles portent neuf pouces d'un bout à l'autre. Les grandes plumes des ailes sont noires pour la grande partie, l'extrémité en est blanche, & le bord extérieur à-peu-près au milieu est de couleur jaune. De là vient que les ailes pliées montrent une tache large, oblongue, de couleur jaune dans leur milieu, & que vers le dos il y a des taches blanches élevées par gradation. La queue est composée de douze plumes, qui font la fourche dans leur milieu. Les deux extérieures de chaque côté^h ont une tache blanche sur leur bord intérieur

F 2

g) Dans l'échantillon que j'ai devant moi, je trouve que la mâchoire supérieure surpasse un peu l'inférieure & qu'elle est courbée un peu en bas. (*R. d. tr.*)

h) Quelques fois ce sont les trois extérieures qui ont ces taches, & les amateurs distinguent ces deux variétés du chardonneret, par les noms de *chard. à quatre miroirs*, & à six miroirs. Aussi dans l'échantillon que j'ai devant moi, je ne trouve cette extrémité blanche dont il est parlé, que dans les deux rectrices du milieu de chaque côté, la troisième montre à peine un petit point, & la quatrième est absolument noire. (*Rem. du trad.*)



térieur, les suivantes ont l'extrémité blanche. Les pieds sont garnis de plumes jusqu' au genou. & les tarses sont garnis comme à l'ordinaire d'une membrane nue, écailleuse & noire *i*). Les pieds sont fendus en quatre doigts séparés, dont trois dirigés en avant, un en arrière. Celui du milieu a sept lignes de long, les deux latéraux sont un peu plus courts, & le postérieur égale en longueur le doigt extérieur; mais tous en général sont garnis d'ongles noirs *k*).

Cette espèce d'oiseaux ne vole pas seule mais par troupes, & se trouve surtout en hyver sur les têtes des chardons*) d'où elle tire les graines à coups de bec. Mais elle fait aussi retirer les graines des capsules du pavot & d'autres plantes, & c'est de cette manière en les nourrissant de semblables graines qu'on peut les tenir en cage.

Le plus souvent, comme chacun le fait, on peut élever cet oiseau avec des graines de chenuevis, quoique cela ait l'inconvénient, que l'oiseau engraisse beaucoup par cette nourriture & devient en chaleur. Mais il est aussi souvent attaqué du mal caduc, ce qui cependant ne vient pas toujours de la graine de chenuevis dont on le nourrit, comme on croit communément, mais aussi d'un ver oblong *l*) qui se trouve dans ses cuisses. On nourrit le chardonneret dans les appartements tant à cause de son ramage, (qu'il fait entendre pendant toute l'année, ce qui avec raison a fait soupçonner Mr. FRISCH, qu'en tout tems il est propre à la multiplication de son espèce) qu'en considération de son adresse qui le rend propre à être dressé de plusieurs manières. Au reste c'est une chose connue, qu'il y a différentes variétés de cet oiseau.



PLANCHE

-
- i*) La couleur des pieds je ne la trouve pas noire, mais marron, & Mr. BRISSON dit pareillement qu'ils sont bruns. (*Rem. du trad.*)
- k*) Je les trouve encore bruns ces ongles, & non pas noirs. Mr. BRISSON de même. (*Rem. du trad.*)
- l*) C'est de là même qu'il a tiré la plupart de ces noms, comme on le voit par son nom allemand *Distel - Finck*, le latin *Carduelis*, & le français *Chardonneret*. Quoique le nom allemand de *Stieglitz* ne paroisse pas en tirer son origine, cependant FRISCH a montré que ce nom n'en dérive pas moins: & cela par la raison qu'il croit, que ce nom de *Stieglitz* vient des Bohèmes & des Vandales, qui dans les tems les plus reculés se sont appliqués beaucoup à l'oisellerie, & qui appellent cet oiseau *Stichlik*. Mais peut-être ce nom lui a-t-il aussi été donné d'une partie de son ramage. (*Rem. de l'original.*)
- l*) L'Epilepsie viendrait-elle effectivement d'un ver logé dans les chairs, comme elle vient souvent des vers des intestins? Et ce ver ne serait-il pas par hasard la chanterelle ou le *Gordius* de Linnaeus? (*Rem. du trad.*)

Tab. X. *La grosse Mésange ou la Charbonnière.*



B.R. Dietzschin pinx.

Kohlmeise.

A.L. Winsing Sc. et excud. Norimberg.

PLANCHE X.

PARVS MAIOR SEV FRINGILLAGO.

Klein, Brisson, Linn. aliorumque.

KOHL - ou SPIEGEL - ou BRANDMEISSE


en Allemand.

LA GROSSE MESANGE ou la CHARBONNIERE.

Cette espèce de Mésange se trouve dans l'Ornithologie de Mr. BRISSON au X^{ème} Ordre, Section II. Genre 41. Elle y occupe la première avec le surnom de *Parus maior* feu *Fringillago*. KLEIN la place dans sa IV^{ème} famille, genre 9^{ème}, où elle obtient la première place dans sa seconde tribu. Il lui a donné dans les *Stemmata Avium* p. 16. le nom latin *Parus fringillago maior*, en ajoutant le caractère propre à cette espèce, *capite nigro buccis albis*, dans la nouvelle édition allemande de son *histoire des oiseaux* p. 87. elle obtient les noms allemands *Kohlmeisse*, ç. à. d. *Mésange charbonnière*, *Spiegelmeisse*, ou *Mésange à miroir*, *Brandmeisse*, ç. à. d. *Mésange noire*. Mr. de LINNÉ dans son *Systema naturae* la place au second rang (aujourd'hui au troisième dans la nouvelle édition) du genre de la Mésange qui est compris dans l'ordre des Passeraux: il la distingue des autres espèces contenues dans le même genre par l'épithète de *major*, & les caractères de la tête noire, les tempes blanches, & la nuque jaune.

La longueur de tout l'oiseau est de six pouces; celle du bec est de 6 lignes & demie. La forme du bec est en alène; les deux mâchoires sont droites & tranchantes; les narines placées des deux côtés de la base du demibec supérieur sont recouvertes de petites plumes. Le bec est de couleur noire & la langue se termine en une pointe obtuse dechiquetée. La partie supérieure de la tête & de la gorge est noire. Deux taches blanches se montrent des deux côtés derrière les yeux, qui sont entourées par le noir de la tête & de la gorge. Depuis le col, & tout le long du dos les plumes sont verd-olivâtre, & jaunâtres à la partie inférieure du col & au ventre. Ce jaune est partagé dans toute sa longueur en deux parties égales par une large bande noire. Les ailes près du dos sont de la même couleur que lui, vers le ventre elles sont noires. Au côté supérieur les ailes ont une bande jaune transversale. Quelques unes des grandes pennes des ailes ont le bord extérieur noir, & l'intérieur blanchâtre, quoique la plupart des plus grandes pennes tirent sur le cendré-bleuâtre. Les deux ailes pliées sur passent la base de la queue d'un pouce, mais quand elles sont étendues l'oiseau a 8 pouces quatre lignes de vol. Le croupion est verd olivâtre par en haut, mais par en bas il est blanc, ainsi que le basventre & les cuisses. La queue est composée de douze pennes, dont la couleur est mêlée de gris, de bleu & de noirâtre, avec la seule différence que les extérieures sont blanches au bord extérieur & à la pointe, les intérieures au contraire n'ont que la pointe blanche. La queue se fend par derrière en deux parties égales. Sa longueur porte à-peu-près deux pouces & demi.

Pour ce qui est des pieds enfin, j'y remarque la même chose qu'on observe dans beaucoup d'autres oiseaux, savoir que les pieds sont garnis de plumes jusqu'au talon, & que la partie dénuée est recouverte d'une membrane écailleuse de couleur plombée. Ils sont divisés comme dans bien d'autres en quatre doigts, dont trois tournés en avant, un en arrière. Les ongles sont pareillement couleur de plomb.



La mésange charbonnière grimpe le long des arbres à la manière des pics; elle demeure dans les forêts aussi bien que dans les jardins ^{m)}, & elle se nourrit principalement de proye. Elle fréquente surtout les endroits patibulaires & les voiries, où elle se nourrit de cadavres. Elle se jette même sur ses semblables, & leur arrache la cervelle, particulièrement quand elles sont vieilles ⁿ⁾, & que les forces les ont abandonnées. Elle est fort aisée à élever dans les maisons, parcequ'elle s'accommode de presque toute espèce de nourriture. On peut encore la nourrir de graines de chenuevis concassées. Dans les bois elle se nourrit de vermineux & d'insectes, qu'elle retire avec son bec des fentes des arbres. Ce même oiseau paroît avoir le goût plus délicat que d'autres, parcequ'il ne mange rien sans l'avoir goûté auparavant. La manière de la prendre est connue. C'est ou dans des trébuchets, ou mieux encore à l'aide des breulets, qu'on étend au dehors des petites huttes, construites exprès de branches d'arbres. On en trouve une description claire & circonstanciée dans l'*histoire des oiseaux* de FRISCH, à l'article général des mésanges. C'est là que les amateurs qui souhaiteroient là dessus un plus grand détail, pourront être satisfaits. En général tous les noms allemands de cet oiseau, *Mésange charbonnière, noire, à miroir, mésange - pinçon*, sont tirés, ainsi que FRISCH, l'a très bien remarqué, de sa tête noire & de la bande longitudinale du ventre, de ses taches blanches en forme de miroir, & de sa voix.




PLANCHE XI.

P Y R R H V L A Briffon. Linn.

COCCOTHRAVSTES SANGVINEA Klein.

FRINGILLA RUBECULA Frisch.

BULFINCH en Angl.

GIMPEL: DOMHERR: DOMPFAFF: BLUTFINCK en Allemand.

BOUVREUIL en François.

C'est par cet oiseau que Mr. BRISSON commence son 37^{ème} genre, qui est contenu dans la seconde section du neuvième ordre de son *Ornithologie* T. I. p. 395. (T. III. p. 308. de l'édit. Origin. in 4to.)

Chez KLEIN au contraire le même oiseaux se trouve dans la IV^{ème} famille, au dixième genre des Passeraux, à la troisième tribu des *Grosbecs* (Coccothraustarum). Dans ses *Stemmata Avium* il porte le nom latin de *Coccothraustes sanguinea* sive *Rubicilla*: & dans la nouvelle édition allemande de son *histoire des oiseaux* p. 94. il est désigné sous le nom allemand de *Dompfaff*. Dans le *Système de la nature* de LINNAEVS, il se trouve dans le sixième ordre des oiseaux, qui porte le nom des moineaux (*Passeres*) où dans le 104^{ème} genre appelé *Loxia* il figure comme la 4^{ème} espèce. (Tom. I. p. 300. de la dernière édition.)

La longueur de l'oiseaux entier est de 5 $\frac{1}{2}$ pouces *) mesure de Paris: le bec à cinq lignes, & la queue deux pouces six lignes. La forme du bec est conique & se termine

m) Ce n'est cependant qu'en automne qu'elle entre dans les villes, & qu'on la voit dans les jardins. (Rem. du Trad.)

n) Elles font cela surtout quand elles sont enfermées, en quoi elles approchent en quelque manière de la méchanceté du hamster, & de sa fureur de se battre. (Rem. du Trad.)

*) La longueur de cet oiseau ne peut guères être déterminée avec précision, puisque FRISCH en a observé trois variétés de différente grandeur.

Tab.XI. *Le Bouvreuil.*



B.R.Dietzschin pinx.

Gümpel.

A.L.Wirsing sc.et excud.Norimberg



termine en une pointe affilée. Sa surface supérieure & inférieure est voutée, & la pointe de la machoire supérieure est un peu courbée en bas. L'Iris des yeux est couleur de noisette. La partie supérieure & antérieure de la tête est d'un noir brillant; mais le dessus du cou & le dos sont noirs tirant sur le cendré. La gorge, le dessous du col, la poitrine & la partie antérieure du ventre est rouge, la partie postérieure du ventre au contraire, où elle s'approche de la queue, est blanche. Les ailes appliquées contre le corps vont à peine jusqu'au milieu de la queue, mais étendues elles ont neuf pouces trois lignes d'un bout à l'autre. Vers en haut & vers en bas quelques plumes participent de la rougeur du col & du ventre dont les ailes sont voisines: mais au reste elles sont noires, avec une bande blanche qui traverse les ailes fermées: vers l'extrémité elles deviennent violettes ^o). La queue est composée comme à l'ordinaire de douze pennes, dont l'assemblage se partage vers l'extrémité en deux parties. En général ces pennes sont noires avec quelques reflets de violet: mais étant examinées séparément, les latérales ont le bord extérieur plutôt noir grisâtre, & les deux dernières ont la pointe blanche du côté intérieur. Les pieds sont garnis de plumes jusqu'au talon, & la peau écailleuse des talons est noire. Ils sont fendus en quatre doigts, dont trois tournés en avant & un en arrière. Les ongles dont ils sont garnis sont noirs. Le doigt du milieu & le postérieur ont sept lignes & demie en long; l'intérieur & l'extérieur au contraire sont plus petits.

C'est une chose connue d'ailleurs, que la femelle se distingue du mâle par la couleur rouge du ventre beaucoup plus pâle ^p) dans la première que dans la seconde.

Notre bouvreuil habite communément, dans les forêts, où il cherche sa subsistance. On peut juger de la qualité de sa nourriture par la conformation de son bec, qui est fort, épais & crochu. Il mange donc, de même que d'autres oiseaux pourvus de pareils becs, des baies, des grains, du millet, du sarrazin, de la graine de navet & de chen-nevis, &c.

Il porte, ainsi qu'il est connu, plusieurs noms. p. e. *Roth-Finck* (c. à. d. pinçon rouge), *Blut-Finck* (c. à. d. pinçon sanguin), *Gold-Finck* (c. à. d. pinçon doré) ^q), *Thumpfaff* (ce qui veut dire, Chanoine réglé) *Thumherr*, (c. à. d. Chanoine) *Hahle*, *Quetsch*, *Gimpel* ^r). Tous ces noms lui ont été donnés probablement de sa poitrine rouge, de son sommet noir qui ressemble à une calotte ^s) de sa voix qui approche de quelques uns de ses noms, & de sa prétendue stupidité. Quoiqu'il ne soit pas si difficile d'apprivoiser cet oiseau avec le temps, & de le nourrir en cage, il est pourtant très farouche au commencement, & ne peut être conservé en vie, qu'en lui mettant des graines

G 2

de

^o) C'est plutôt bleu d'acier. (Rem. du Trad.)


^p) On ne peut sûrement pas dire, que la belle couleur rouge du ventre du mâle, (qu'on peut encore exalter, en arrachant ces plumes pour en faire venir de nouvelles) soit plus pâle dans la femelle. C'est plutôt une couleur toute particulière, que Mr. BRISSON exprime par cendré tirant sur la vineux. (Rem. du Trad.)

^q) Ce nom est assez mal appliqué, l'oiseau n'ayant rien de doré, & le même nom étant aussi donné quelquefois au Bruant. (Rem. du Trad.)

^r) Je ne fais pas ce que veut dire *Hahle*, & *Quetsch*; sûrement dans ce dernier nom on n'a pas eu dans l'idée le damas, espèce de prune qui porte le même nom en allemand. D'ailleurs ces deux noms ne peuvent pas avoir été donnés à l'oiseau l'un & l'autre, du son de sa voix, car ils sont trop différents. On nomme quelquefois en allemand *Gimpel*, un homme imbecille, stupide: mais il paroît que cette dénomination a plutôt été transférée de l'oiseau à l'homme stupide, au benêt, que vice versa. Mais je m'étonne, que notre auteur ait oublié entièrement un nom très répandu en Allemagne, celui de *Goll*, ainsi que celui de *Rothvogel*, qui signifie oiseau rouge; et *Blutbrüschchen* ce qui veut dire, poitrine sanguine. (Rem. du Trad.)

^s) C'est ainsi que la fauvette à tête noire a été appelée pareillement le *Moine* par les allemands. Les espèces de Foulques portent le nom de *Pfaff*, c. à. d. Moine prêtre, à cause de leur calotte dénuée de plumes. Il y a des mauvais plaisants, qui dérivent la dénomination du Chanoine donné à cet oiseau, de ce qu'il mange bien, & chante peu.

(Rem. du Trad.)



chennevis dans le fond de sa cage, ainsi que FRISCH l'a très bien remarqué. On fait cela dans la vuë, afin qu'il trouve sa nourriture plus aisément, en marchant sur les graines. Car si on négligeoit cela, & si on lui offroit sa nourriture dans de petites auges pendues à l'extérieur de la cage ainsi que cela se pratique avec d'autres oiseaux, il mourroit de faim, avant que d'avoir appris à la chercher dans l'auge: chose qu'on peut attribuer tant à son indocilité, qu'à sa stupidité. Mais étant apprivoisé une fois il n'est plus si délicat, mais il peut être fort bien élevé dans des volières. La remarque fondée de FRISCH mérite d'être répétée, que cet oiseau nourri en cage noircit aisément tout-à-fait, ce qui doit être un effet des graines de chenuevis dont on le nourrit: mais après la mue on dit qu'il reprend ses premières couleurs. Le chant de cet oiseau, soit naturel soit acquis, n'a rien de particulier, & ce n'est guères dans la vuë d'en jouir, qu'on le nourrit dans les maisons. Car quand même il apprend à siffler quelque air, ce qui toutes fois ne peut réussir qu'à la première mue, il le chante si bas, qu'il faut être bien attentif pour l'entendre. On en trouve cependant quelques uns, qui apprennent à chanter très agréablement, parceque leur ramage n'est pas aussi fort, que celui des serins de Canarie, & d'autres espèces de Pinçons. Ils ont avec cela le même défaut, que nous avons remarqué plus haut dans le chardonnet, qu'ils meurent subitement, & quelque fois au milieu de leur chant. De là le peuple s' imagine, qu'ils attirent les maladies en les mettant dans une chambre de malade. En hyver on n'en voit pas, d'où il est à présumer qu'ils voyagent dans d'autres pays.




PLANCHE XII.

PSITTACULA GVINENSIS. Briss.

PSITTACUS PVLLARIUS. Linn.

PSITTACUS MINIATUS VIRIDIS, FRONTE ET
GVLA RVBRIS. Klein. Frisch. aliorumque.

LITTLE RED - HEADED PARRAKET Angl.

KLEINER ROTHKOEFIGTER PAPAGEY. Allem.

PETITE PERRUCHE DE GUINÉE.

Cette petite espèce se trouve dans l'ouvrage de Mr. BRISSON dans le 13^{ème} ordre, 4^{ème} Section, genre 53, qui est celui de Perroquet, où elle fait la 85^{ème} espèce. Chez KLEIN elle est dans la troisième famille, premier genre, Perroquet, p. 26. n. 25. & dans l'appendix p. 164. n. 10. où elle a obtenu le nom de *petit perroquet à tête rouge*, ou bien aussi celui que nous venons de donner plus haut. Le Chevalier de LINNE la range dans le second ordre, au genre du Perroquet, en lui y assignant la 45^{ème} place (dans la dernière édition) sous le nom que nous avons rapporté, en la distinguant des autres espèces par la queue courte & verte, le front rouge, & la bande rouge & noire de la queue.

La longueur entière de cet oiseau est de cinq pouces six lignes. Selon Mr. BRISSON le bec a une épaisseur de six lignes, & a cinq lignes & demie en long. Le demibec supérieur est fort à sa base, vouté, crochu & pointu. L'inférieur est formé à-peu-près de la même manière, seulement il est plus court. La couleur du bec est rouge, mais plus vers la base, que vers la pointe. Les narines placées à la base de la mâchoire supérieure, sont placées dans une membrane qui entoure le bec. Dans la bouche il se trouve ainsi que dans les autres espèces du même genre, une langue épaisse, charnue, longuette, & arrondie, dont la surface ressemble à du velours ras. Les yeux sont entourés d'une membrane bleue. L'Iris est de la même couleur.

Pour

Tab. XII. *La petite Perruche de Guinée.*



Indianische Spatz.

A. J. Wiering fecit et excudit Norimberg.

Pour ce qui est du plumage de notre oiseau, nous trouvons qu'il est verd-foncé en dessus, & verd-jaunâtre en dessous; le front & la gorge rouge-vermeil: le croupion & le bord inférieur près de l'origine des ailes bleu de Prusse, dans une étendue de huit à neuf lignes en long, & une ou deux lignes en large. Les seize grandes plumes de l'aile sont de couleur grise en dedans, mais verd foncé en dehors, ainsi que les deux plumes du milieu de la queue. Le reste des plumes de la queue est premièrement rouge, ensuite noire & enfin verd à la pointe. La queue de cet oiseau en comparaison des autres espèces de ce genre, est assez petite, & peut aller à-peu-près à dix-huit lignes, ce qui ne fait pas tout-à-fait un tiers de la longueur, tandis qu'il y a d'autres espèces, dont les queues vont bien au-delà de la moitié de la longueur de tout le corps *t*). Les jambes au reste sont couvertes de plumes jusqu'aux talons, la partie dénuée est garnie d'écailles cendrées. Elles se partagent en quatre doigts, qui ne sont pas réunis par des membranes, dont deux tournés en avant deux en arrière. Ces doigts sont de longueur inégale. L'extérieur de ce devant a huit lignes de long, l'intérieur cinq lignes & demie. Des doigts postérieurs l'extérieur a six lignes & demie de longueur, l'intérieur qui a la même direction en a quatre. Les ongles sont fort crochus, & sont de même couleur que le pied.

A l'égard de la femelle on remarquera encore, d'après le témoignage d'ALBIN & de Mr. BRISSON, que la plaque rouge du front & de la gorge dans la femelle n'est pas d'un rouge aussi vif, que dans le mâle, & que les bords des ailes sont plus jaunes.

La patrie de notre petite perruche est la Guinée. C'est improprement que sa taille lui a fait donner le nom de moineau des Indes. Je n'ai rien à dire sur sa façon de vivre, mais il est probable qu'étant conformé comme les autres perroquets il aura aussi le même genre de vie. Car c'est une chose connue des autres espèces de Perroquets, qu'ils aiment à manger des fruits, ainsi que de la viande, qu'ils grimpent sur les arbres, & y reposent; en quoi leur bec crochu, leurs ongles & la position de leurs doigts leur sont d'un grand secours. On sait ensuite, qu'ils suspendent leur nid au bout d'une branche mince & recourbée, à l'aide d'un cordon mince, qu'ils lui donnent la forme d'une boule pourvue d'une ouverture étroite & pas plus large qu'il ne le faut pour leur permettre le passage, & tout cela pour empêcher que les couleuvres & les serpents ne s'emparent de leurs petits dont ils sont friands. On sait aussi qu'ils pondent deux oeufs, qu'ils ont la mémoire bonne, & que surtout les mâles ont une grande facilité à imiter la parole humaine, à quoi ils sont propres surtout à cause de la structure de leur langue. En outre on dit, qu'ils vivent fort longtems, qu'on remarque en eux différentes passions, & qu'ils sont sujets à plusieurs maladies, principalement au mal caduc. Aussi ne sont-ils pas aisés à conserver quand on les met seuls, mais il faut les mettre par paires ou plusieurs ensemble *u*), & si l'un de deux ou de la compagnie vient à mourir, les autres ne survivent pas fort longtems, mais ils périssent tous ordinairement, à moins qu'on ne prenne de grandes précautions.

PLANCHE

* Je ne fais pas ce que l'auteur a prétendu dire par là. C'est une chose connue, qu'il y a des espèces de perruches & de perroquets dont les queues sont deux ou trois fois plus longues que le corps. S'il entend parler d'autres individus de cette même espèce, il n'aurait pas dû les qualifier d'espèce différente. (Rem. du Trad.)

n) Ceci ne doit s'entendre sans doute que des petites perruches, car tout le monde sait, qu'on élève assez de grands perroquets & de moyenne taille, dans la plus grande solitude.

(Rem. du Trad.)

PLANCHE XIII.

HIRUNDO RUSTICA. Linn. Frisch. Klein.

DOMESTICA. Briss. Albin.

HOUSE - SWALLOW, en Anglois.

INNERE HAUS-SCHWALBE; RAUCH-SCHWALBE en Allemand.

HIRONDELLE DE CHEMINÉE.

Cette espèce d'Hirondelle est décrite dans l'ouvrage de Mr. BRISSON dans le huitième ordre, trentième genre, qui est celui de l'*hirondelle*, où elle fait la première espèce. Dans l'histoire des oiseaux de KLEIN (de l'édit. allem. augmentée) je la trouve dans la quatrième famille, au huitième genre qui porte le nom d'*hirondelle*; elle y est rangée comme la première espèce de la seconde tribu, qui est à queue fourchue, & y porte le nom allemand marqué ci-dessus. Le chevalier de LINNE lui donne la première place dans le genre de l'*hirondelle* contenu dans le sixième ordre des oiseaux. Il lui donne le surnom rapporté plus haut & la distingue des autres espèces du même genre par la tache blanche qui se trouve aux rectrices, à l'exception des deux du milieu.

La longueur entière de cet oiseau peut aller à six pouces & quelque chose de plus. La longueur du bec ne surpasse pas sept lignes. La base du bec est plus large qu'épaisse, & par conséquent le bec est aplati. L'ouverture de la bouche s'étend jusque derrière les yeux, ce qui fait que son gozier qui est de couleur jaune est d'une capacité considérable. Le bec au reste est noir, la pointe un peu courbée en dedans, sa substance est tendre, & les bords sont émoussés.

Les couleurs y sont distribuées de la manière qui suit. Le front, la gorge & les joues sont marron. La nuque, le cou en dessus & en dessous, les ailes à l'exception des grandes plumes qui sont couleur de fer, tout le dos, croupion & la queue sont couleur d'acier. La poitrine, le ventre les couvertures des ailes en dessous, ensemble avec les pieds en tant qu'ils sont garnis de plumes, sont blanc rougeâtre. Avec cela on remarque une tache blanche aux plumes de la queue, à l'exception des deux intermédiaires ou supérieures.

A ces caractères nous joignons encore le reste de la conformation des ailes, de la queue & des pieds. Les ailes sont composées de dix-huit plumes, & appliquées contre le corps elles atteignent le bout de la queue; étendues elles portent $11\frac{1}{2}$ pouces d'un bout à l'autre. La queue est formée de douze rectrices, dont les deux inférieures ou extérieures *x*) sont très longues, & les autres intérieures diminuent par degrés, ce qui donne à la queue une forme fourchue. Les pieds sont très courts, garnis de plumes jusqu'au talon le quel est nu & couvert d'une peau écailleuse noire. Ils sont partagés en quatre doigts, dont trois tournés en avant, & un en arrière. Celui du milieu est le plus long, & réuni avec l'extérieur jusqu'à la première articulation. Les deux doigts latéraux & le postérieur sont de même longueur; au reste ils sont tous ensemble munis d'ongles noirs.

L' hiron-

x) C'est par une méprise assez étrange, qu'il est dit dans l'original, que ce sont les deux plumes du milieu ou les supérieures qui sont fort longues & formées en fourche.

(Rem. du Trad.)



B.R. Dietzsch pinx.

Die Schwalbe.

A.L. Wiering sculpsit et excudit Norimberg



L'hirondelle de cheminée fait son nid le plus ordinairement dans l'intérieur *y)* des maisons dans des chambres où elle est le moins inquiétée, & à l'abri des oiseaux de proie. C'est aussi pourquoi on la rencontre plus fréquemment en campagne que dans les villes: car dans celle-ci elle trouve rarement *z)* l'occasion d'entrer dans les maisons, ou bien on ne l'y souffre pas. En campagne au contraire elle la trouve assez souvent, & on ne l'y inquiète pas. On pourroit donc avec assez de raison la nommer hirondelle de campagne ou de village. Elle a la coutume d'attacher son nid à des chevilles de bois qui réunissent les pièces de charpente, de lui donner une forme hémisphérique, de le construire de limon entremêlé de paille & de laisser à découvert, étant assez garanti entre la pluie & le mauvais tems, par la couverture & les murs de la maison. Elle fait aussi son nid sous des amples cheminées, d'où elle a obtenu le nom d'*hirondelle de cheminée*, (en allemand *Rauch-Schwalbe*, ce qui veut dire hirondelle de fumée).

Au cas qu'elle ne peut pas entrer dans la maison, elle fait son nid sur la pointe des pignons. Elle couve deux fois par an, en pondant cinq à six oeufs pour la première fois, & quatre à cinq à la seconde couvée. Elle se nourrit de moucherons & d'autres insectes, qu'elle attrape sans peine dans l'air, à l'aide de son grand gozier. Quand il n'y a point d'insectes dans l'air, elle prend les araignées qui se trouvent dans leurs toiles auprès des maisons, & va gagner les eaux dormantes, où en trempant sa queue dans l'eau, elle oblige les insectes aquatiques *a)* de s'élever, pour pouvoir alors s'en emparer d'autant plus aisément. Son gazouillement approche assez du chant, mais il ennuie bientôt par sa monotonie. Le mâle cependant chante un peu mieux que la femelle. Celle-ci prend grand soin de ses petits, c'est pourquoi quand elle voit un oiseau de proie, elle les avertit par un cri particulier, & même elle vole témérairement autour de l'oiseau pour le détourner. Elle ne voyage pas pour passer l'hyver dans des pays plus chauds, ainsi qu'on croit communément, mais plutôt elle se tient pendant cette saison dessous l'eau accrochée contre les roseaux. *b)*, ou bien dans des grottes & des fentes de rochers.



y) De là le nom allemand rapporté au commencement de ce chapitre: *innere Haus-Schwalbe*, s. à. d. hirondelle de maison intérieure. (Rem. du Trad.)

z) Il mériterait l'attention des naturalistes, de rechercher pourquoi ces hirondelles n'entrent pas dans les greniers dans les villes, où pourtant elles pourroient s'établir tout aussi bien que dans les corridors & les chambres. Ce ne peut être à cause des chats, ni du vent coulis, car elles pourroient s'établir dans des endroits où elles n'auroient rien à risquer ni de l'un ni de l'autre. (Rem. du Trad.)

a) Il s'entend que ce ne peuvent pas être des insectes aquatiques nageants, qui au premier mouvement de l'eau plongeroient, mais des mouches, des coufins, & des tipules, qui reposent sur la surface de l'eau. Ce seroit pourtant une peine inutile, que les hirondelles se donneroient de faire lever de la sorte les insectes, qui sans cela voltigent assez sur l'eau, ou sont chassés par le vent des ailes. Elles font d'ailleurs la même chose sur les eaux courantes, sur lesquelles les insectes ne reposent pas. C'est plutôt pour se baigner, ou selon d'autres pour se vautrer ensuite dans la poussière, pour former du limon propre à la construction du nid, qu'elles semblent frapper l'eau. (Rem. du Trad.)

b) Ce seroit une digression inutile & déplacée, si je voulois discuter ici cette question qui partage encore les naturalistes. Elle fourniroit assez de matière pour un ample commentaire. (Rem. du Traduct.)

PLANCHE XIV.
 MOTACILLA REGVLVS Linn.
 REGVLVS CRISTATVS Klein. Catesb.
 TROCHILVS CRISTATVS. Frisch.
 CALENDVLA, REGVLVS CRISTATVS VULGO
 DICTA, Brisson.
 GOLDEN - CROWND WREN. Angl.
 GEKROENTES KOENIGCHEN, GOLDVOEGELEIN, GOLD-
 HAENLEIN. Allem.
 ROITELET HUPÉ. c)

Le Roitelet hupé se trouve dans l'Ornithologie assez connue de Mr. BRISSON, dans le dixième ordre, seconde section, genre 41, qui porte le nom de *Mésange*, où il fait la 17^{ème} espèce, sous le nom marqué tantôt, en commençant le genre inférieur de *Calendula*. Le chevalier de LINNE le met de son sixième ordre d'oiseaux, intitulé *moineaux*, où dans le 114^{ème} genre nommé *Motacilla*, il figure comme la 48^{ème} espèce sous le nom mentionné ensemble avec l'énumération des caractères qui le distinguent, savoir des plumes de la seconde articulation de l'aile, dont le bord extérieur est jaune & le milieu blanc, ainsi que du sommet de la tête qui est jaune. Dans l'histoire des oiseaux de KLEIN, il se trouve dans la quatrième famille, septième genre, deuxième tribu, où le nom de *Zaun-Koenig* (ç. à. d. *Roitelet*) marque l'espèce c*).

Le Souci est un de plus petits oiseaux, ne surpassant pas trois pouces & demi en longueur; aussi ne pèse-t-il pas plus qu'environ trois gros. Le bec a cinq lignes de long, il est en forme d'âlène & de couleur noire. La langue est longue à pointe déchiquetée. En dessus il est de couleur olivâtre, en dessous blanc-brunâtre. Sur le sommet de la tête il y a une espèce de couronne d'un jaune doré entremêlé de rouge, bordé de noir. Les ailes appliquées contre le corps vont jusqu'aux deux tiers de la queue, mais étendues elles ont cinq à six pouces d'un bout à l'autre. Elles sont recouvertes en dessus de petites plumes qui ont la couleur du dessus du corps, & dont les pointes blanches placées parallèlement l'une contre l'autre & d'égale longueur, forment sur l'aile une bande transversale. Les plumes de l'aile elles mêmes sont noirâtres, olivâtres en dehors, & en dedans bordées de blanc. La queue a un pouce cinq lignes de long. Elle est composée de douze grandes rectrices qui en général sont d'un noir grisâtre, & les bords d'un verd olivâtre. Les pieds jusqu'aux tarses sont recouverts de plumes d'un blanc tirant sur le cendré, & les tarses dénués de plumes sont recouverts d'une membrane écailleuse brunâtre. Ils se partagent en quatre doigts séparés l'un de l'autre, dont trois tournés en avant, un en arrière: tous en général, & surtout le postérieur, sont armés d'ongles noirs & forts. Le doigt du milieu des antérieurs est à-peu-près de la même longueur avec le postérieur, mais les deux doigts latéraux sont plus petits. Quoique la femelle ne soit pas différente du mâle d'une façon marquée, elle en diffère cependant ordinairement, par la tache du sommet qui est d'un jaune plus pâle, & la couleur du dos plus foncée d).

Le

c) Ce petit oiseau est beaucoup plus connu en France, sous le nom de POUL ou SOUCI.
 (Rem. du Trad.)

c*) Cette allégation n'est pas trop exacte. Dans la tribu du *Roitelet* KLEIN comprend le roitelet, & le pouillot, & le souci: ce dernier y constitue la troisième espèce.
 (Remarq. du Trad.)

d) Le traducteur possède une variété, qui a une bande blanche au dessus des yeux. C'est une femelle.

Tab. XIV. *Le Poul ou Souci.*



B.R. Dietzschin pinx.

Goldvögelein.

A.L. Wüwing Sc. et excud. Nuremberg



Le poul ne demeure pas uniquement en Europe, mais aussi en Amérique. Il se tient ordinairement dans les forêts sur les sommets des arbres les plus hauts, e) tels que chênes, pins & sapins, où il grimpe ça & là. Chez nous il fait son nid sous des buissons épais de pins, près de terre, en forme de four; allongé en haut en voute & fermé, avec une petite ouverture par devant.

Il prépare ce nid d'herbe menue, longue, & sèche, ainsi que de mousse; qu'il entrelace étroitement. Aussi donne-t-il une grande capacité à son nid à proportion de son corps, mais aussi le fait-il bien ferré, pour que sa couvée nombreuse y trouve place, & puisse éclore avec plus de facilité. Communément il pond cinq, six, à sept oeufs, qui sont de la grandeur d'un pois, & tachetés de roux vers le gros bout. Sa nourriture consiste en moucheron, vermineux & autres insectes, qu'il cherche partout à l'aide de son bec effilé & de sa langue.

PLANCHE XV.

U P V P A. Briffon. Klein. Frisch.

UPVPA EPOPS. Linn.

HOOPOP en Anglois. WIEDEHOPF en Allemand.

L A H U P E.

La Hupe est classée chez Mr. BRISSON dans le 27^{ème} genre (*Upupa*, *Hupe*) septième ordre, section première. Elle y est l'unique espèce. Le chevalier de LINNE désigne à la vérité son 64^{ème} genre par le même nom, dans le quel notre oiseau fait la première espèce: mais comme il range encore d'autres oiseaux dans le même genre, il le distingue des autres espèces par le surnom de *Epops*, & par le caractère spécifique de sa couronne ou panache bariolée. KLEIN retient pareillement le nom de *Hupe* pour désigner toute la tribu, qui dans son histoire des oiseaux augmentée, est la seconde du quinzième genre, famille quatrième, & où il le distingue d'autres espèces par l'épithète de *commun*. e*)

La longueur entière de la Hupe est de onze pouces. Son bec est long de deux pouces trois lignes, mince, vouté, un peu arqué, comprimé latéralement, à pointe obtuse, noirâtre par devant, & d'un rougeâtre pâle vers le derrière. Dans le palais il y a une langue courte, obtuse, & triangulaire.

Sur

e) Il demeure aussi en quantité sur les faules, quand il y en a plusieurs plantés bien près l'un de l'autre dans les prés humides. Le traducteur se rappelle très bien, que parmi les oiseaux que ses camarades d'Ecole avoient tirés à la farbacane dans de semblables endroits, ces oiseaux se sont toujours trouvés en grand nombre.

e*) C'est égal dans le fond que cette classification de KLEIN, la plus mauvaise de toutes, & absolument contraire à la nature, sur tout aussi à l'égard de l'oiseau dont il s'agit, soit bien ou mal alléguée. Mais je crois être de mon devoir, de ne pas laisser subsister d'erreur, autant qu'il dépend de moi. Voici donc ce qui en est. La quatrième famille des oiseaux de KLEIN contient ceux qui ont quatre doigts. Le quinzième genre de cette famille contient les oiseaux qu'il appelle *falcator*, à cause de leur bec formé en faucille. Ce genre contient deux tribus, dont la première contient les petits oiseaux qu'il nomme *Falcinellus* (les grimpeaux & les colibris, la seconde tribu, nommée *Arquata* contient les grands oiseaux à bec en faucille. Cette tribu est subdivisée en trois peuplades, celle du courli, celle du guépier, & celle de la hupe; ou *arquata stercoraria*, qui comprend de son côté la hupe commune, le promerops hupé des Indes, & le coracias hupé ou le sonneux. Qu'on juge de la connoissance & du jugement d'un Auteur qui peut mettre les courlis & la hupe dans un même genre, qui miscet *quadrata rotundis*! (Remarq. du Trad.)



Sur la tête on voit une panache de la longueur de deux pouces, que l'oiseau peut élever & coucher en arrière selon son plaisir. Mais il la dresse surtout, quand il est épou-vanté. Elle est formée de deux rangs de plumes, qui commencent sur le devant du front & s'étendent jusqu'à la nuque. Ces plumes sont d'un rouxbrunâtre, & l'extrémité en est noire. La gorge, les joues, & le cou tant en dessus qu'en dessous, ainsi que la poi-trine sont d'un blanc-rougeâtre; le ventre est d'un blanc sale, rayé de noirâtre. Le dos près du cou est gris, & noir au reste. Les ailes sont noirâtres entremêlées de taches blan-ches, ce qui cependant ne doit pas s'entendre uniquement des couvertures, mais aussi des grandes pennes des ailes elles mêmes, qui sont également tachetées de blanc, de la manière suivante selon le chevalier de LINNE (*Faun. Suec.*) La première qui est un peu plus petite, & les cinq suivantes qui sont un peu plus longues & de longueur égale, ont une raye transversale blanche; la septième qui est un peu plus petite à son tour a une grande tache blanche sur le bord intérieur; la huitième a sur le bord extérieur, trois pe-tites taches blanches, avec une raye blanche près de l'extrémité; la neuvième & la dixième ont quatre bandes transversales blanches; & la dix-huitième a une petite tache blanche à son extrémité *). Les ailes, comme on fait pareillement, vont jusqu'au milieu de la queue; étendues elles ont seize pouces d'un bout à l'autre. Les pennes de la queue sont au nombre de dix: elles sont noirâtres de même, & ont au milieu une tache transver-sale blanche. Les pieds sont courts, forts & garnis de plumes jusqu'aux talons, la par-tie dénuée est garnie d'une membrane écailleuse noirâtre. Ils sont partagés en quatre doigts séparés l'un de l'autre, dont trois tournés en avant, & un en arrière. Le doigt antérieur du milieu est le plus long, & de la longueur de neuf lignes & demi; les deux latéraux sont plus courts de quelque chose, & le doigt postérieur, y joint l'ongle droit & long, est presque égal à celui du milieu.

La Hupe demeure en Europe f) & aux Indes orientales. Il doit avoir obtenu son nom, selon la remarque de FRISCH, tant en considération de son cri, que de sa hupe ou toupet g). Outre le nom allemand de *Wiedehopf*, on lui donne encore dans quelques endroits celui de *Koth-Hahn* (ç. à. d. *Coq de merde*) à cause de sa malpropreté. Sa nourriture consiste en vermineux & en d'autres insectes, qu'il fait trouver partout, même dans les matières excrémentices. Il en nourrit aussi ses petits. Même les oeufs de four-mis deviennent sa proie, qu'il fait retirer de fourmillères à l'aide de son bec long & effilé. Il aime la solitude & les endroits écartés, où à la manière des pics il niche dans les arbres creux, sur la vermoulure & le bois pourri. Et c'est là la raison pourquoi on ne le rencontre pas souvent avec ses petits, quoique cela n'arriveroit pas si rarement sans doute, si l'odeur infectée de son nid n'en chassoit pas tous ceux qui l'approchent. Il est bon cependant de rapporter ici l'observation de ZORN, qui dit avec raison que cette puanteur ne vient pas des excréments humains, dont on dit ordinairement qu'il bâtit son nid, mais aux crotins de ses petits, que ceux là ne sont pas en état de jeter au dehors, ce que les vieux pourroient bien faire s'ils n'étoient pas accoutumés aux saletés, à la malpropreté & à la mauvaise odeur. On trouve dans ces excréments une grande quantité de corps & de peaux écailleuses de différentes espèces de scarabées, & de leurs larves ou vers blancs, comme on les appelle communément, dont les vieux comme les jeunes se font nourrir. Il n'est pas sans vraisemblance, que la mauvaise odeur qu'on prétend avoir observée aux environs de ces nids, vient de ces restes d'insectes h).

L'oiseau

*) Les taches vertes, qu'on voit en outre dans notre figure, ne sont pas naturelles & propres à l'oiseau, mais viennent plutôt de sa malpropreté.

f) Il n'est pas bien connu partout. En Angleterre il paroît être rare. CHARLETON l'a fait graver, comme un oiseau rare. MERRET dit pareillement qu'il se trouve rarement. Les curieux & les brocanteurs anglois font quelque fois provision chez nous de ces oiseaux empaillés, pour les transporter chez eux comme des pièces rares.

(Rem. du Trad.)

g) FRISCH entendoit parler de son nom allemand. Mais la chose est plus vraie encore à l'égard de son nom français.

h) Certainement pas. Les insectes se dessèchent en plein air sans répandre aucune mauvaise odeur. Et pour les larves qui sont plus tendres & plus susceptibles de pourriture, je ne vois pas, pourquoi ces oiseaux devroient laisser périr la nourriture qui leur a coûté de la peine à chercher. (Rem. du Trad.)



B.R. Dietrich pinx.

Steinröthel.

A.L. Wessing sc. et excud. Norimberg.

L'oiseau lui même sent pareillement mauvais, ainsi que des chasseurs m'ont assuré; mais uniquement pendant le tems qu'il couve: car d'ailleurs il est mangeable, & je connois des personnes qui en ont mangé, sans lui avoir trouvé ni mauvaise odeur ni mauvais goût. Il pond ordinairement six à sept oeufs qui sont allongés & de couleur jaunâtre. Ce que l'on fait encore de lui, c'est que non seulement il grimpe parfaitement bien le long des arbres, mais qu'il court aussi par terre assez légèrement, choses dont la première lui est facilitée par sa queue, & son doigt postérieur long & fort, ainsi que par ses pieds courts, & son bec, & la seconde par ses trois doigts tournés en avant & droits. Il n'est pas aisé à élever dans les maisons.

PLANCHE XVI.

TVRDVS SAXATILIS,
CAPITE COERVLEO, CAVDA FERRV-
GINEA. Linn.

TVRDVS RVBER CYANEO CAPITE. Klein. Frisch.
MERVLA SAXATILIS MINOR. Briss.
BLAUKOEPFICHTE ROTHE DROSSEL: ou STEIN-
ROETHEL. en Allem.

LE PETIT MERLE DE ROCHE.

Cette espèce se trouve dans le cinquième ordre de Mr. BRISSON, Section première, au genre de la *Grive*, dans la sousdivision du *Merle*. Elle y forme la quatorzième espèce & porte le nom ci-dessus mentionné. Dans la dernière édition du Système de la nature du chevalier de LINNE elle est comprise dans le sixième ordre, qui est celui des *passeraux*, genre 107. (*grive*) espèce 14, avec le nom & les caractères que nous venons de rapporter. Dans l'histoire allemande des oiseaux par KLEIN, je la rencontre dans la quatrième famille, cinquième genre (*grive*), où la quinzième espèce porte le nom allemand que nous lui avons conservé.

Le petit merle de roche à sept pouces & un peu plus en longueur. Sa largeur égale celle de l'étourneau *i*). Son bec a un pouce de long, & est de couleur noirâtre très fortement vouté à la base, & pour cela plus épais qu'il n'est large. On remarque en particulier dans les mandibules, qu'elles ont des bords tranchants l'une & l'autre, & que la supérieure est échancrée à chaque côté vers la pointe. En haut près du front, & près de la gorge en bas, ainsi que latéralement autour de l'ouverture extérieure de la bouche, il y a des poils longs semblables à des sourcils *k*). La langue se termine en plusieurs

I 2

i) L'auteur a voulu dire sans doute, avec Mr BRISSON, qu'il est de la grosseur de l'étourneau. Il n'auroit pas manqué de termes en allemand; pour dire cela. Mais enfin il a dit *largeur*, en termes clairs. Une traduction ne doit pas servir seulement à faire connoître la chose au lecteur, mais aussi la façon de s'enoncer de l'auteur. (Rem. du Trad.)

k) S'il étoit permis à un traducteur, de rien changer, & même de corriger dans son original, à moins d'un contresens ou d'une fausseté évidente, comme à la note *x*) on auroit mis *cils* au lieu de *sourcils*. On auroit même placé ces cils différemment de ce qu'a fait l'auteur. On ne les auroit pas qualifié de longs; car du moins dans l'échantillon que le traducteur a devant soi, ces poils sont fort courts, & ne méritent pas le nom de *vibrisse*, que LINNE attribue à quelques autres oiseaux, mais peuvent passer tout-auplus pour ce que cet auteur appelle *faux ciliata*, c. à. d. l'angle de la bouche garni de cils. (Rem. du Trad.)



sieurs pointes. La tête, & le cou sont bleu-cendré, avec des taches rouges tirant sur le noir *l*). Le dos & les ailes sont de la même couleur, mais plus foncée, & les taches noirâtres sont plus marquées principalement sur le dos. La poitrine & le ventre sont d'un roux orangé mêlé de taches blanchâtres & noirâtres. La queue a deux pouces quatre lignes de long, & est composée de douze pennes, dont les deux du milieu & supérieures sont noirâtres, les autres qui sont placées en dessous & latéralement sont rouffes & noires au bout. A l'égard des ailes il faut remarquer encore, qu'étendues elles ont treize pouces six lignes d'un bout à l'autre & que pliées elles vont jusqu'à l'extrémité de la queue. Les pieds sont garnis de plumes jusqu'aux talons, le reste est couvert d'une peau noirâtre. Ils sont fendus en quatre doigts séparés, dont trois tournés en avant, un en arrière. De ceux de devant l'intermédiaire est le plus long, & de la longueur d'un pouce, car les deux doigts latéraux & le postérieur sont notablement plus courts.

Le petit Merle de Roche habite les hautes montagnes du Tyrol, de l'Autriche, de la Suisse & de la Prusse, & se tient préférablement sur les rochers escarpés, où il fait son nid dans des trous profonds. En Allemagne il est très rare. Son chant, qu'on dit être très clair & net, & qu'on dit ressembler en quelque manière à celui de la fauvette, fait qu'il est fort recherché pour le nourrir en cage, & qu'on le paye cher, principalement parce que les petits qu'on élève dans cette vue, doivent être retirés des trous des rochers avec grand danger de vie. Il a non seulement la bonne qualité d'avoir un chant très mélodieux, mais aussi qu'il le fait entendre avant la pointe du jour, & qu'il le continue jusqu'à la nuit. Quoique le mâle ne se voye que rarement, il est pourtant plus rare encore d'observer la femelle. C'est la raison pour laquelle nous n'en saurions rien dire ici. Toutes fois FRISCH suppose qu'elle diffère considérablement du mâle *m*). Selon le même, notre oiseau perd quelque chose de sa beauté pendant l'hiver, & on le nourrit avec des vers & avec la même pâtée, qu'on donne aux rossignols.



PLANCHE

l) Mr. BRISSON aussi bien que Mr. GUENAU DE MONTBELIARD parlent de semblables taches. La figure cependant de Mr WIRSING n'en marque pas; & dans un échantillon qui me vient des Pyrénées, j'ai de la peine à remarquer quelque chose d'approchant des taches. (*Rem. du Trad.*)

m) Mr. GUENAU DE MONTBELIARD se contente de dire, que les couleurs de la femelle ont moins d'éclat que celles du mâle. Comme je possède une femelle, je m'en vais rapporter en quoi elle diffère du mâle. Elle ne lui ressemble à la vérité que par la couleur de la queue. La tête n'a rien de bleu. Le sommet & la nuque sont revêtues de plumes grises, qui dans le milieu ont une petite tache longitudinale & noirâtre. Les plumes de la partie latérale de la tête au dessous des yeux sont d'un blanc sale, celles de la poitrine & du ventre sont d'un roux clair mêlé avec du blanc sale. Les unes & les autres sont bordées de noir, ce qui fait paroître l'oiseau comme couvert d'écailles. A la gorge il y a une petite tache blanche sans mélange d'autre couleur. On ne voit rien de blanc sur le dos entre les ailes, comme on en voit dans le mâle. Les ailes sont moins noires mais d'un brun grisâtre, leurs courtes pennes & les couvertures sont terminées de blanc, ce que je ne remarque pas dans le mâle. Dans l'un & dans l'autre sexe je ne peu pas observer cette petite échancrure du demi-bec supérieur, dont LINNAEUS & Mr. BRISSON tirent le principal caractère du genre de la grive. De semblables exceptions ne doivent pourtant pas nous indisposer contre les méthodes, & toute classification en général, au point de les rejeter toutes.

(*Rem. du Traduct.*)

Tab.XVII. *Le Rossignol de muraille.*



B.R. Dietzsch jun. pinx.

Rothschwanz.

A.L. Wirsing sc. et excud. Norimberg

PLANCHE XVII.

MOTACILLA PHOENICVRVS. Linn.

RVBECVLA GVLA NIGRA, Frisch.

SYLVIA RVTICILLA, Klein.

RVTICILLA. Briss. Albin, aliorumque.

REDSTART en Anglois.

SCHWARZKEHLEIN, KLEINER ROETHEL en Allemand.

LE ROSIGNOL DE MURAILLE.

Mr. BRISSON place le Rossignol de muraille dans le dixième ordre, section première, genre quarantième du *Becfigue*. Il lui y assigne la quinzième place, en le mettant à la tête du genre inférieur de *Ruticilla* (rouge-queue). LINNE le met dans le sixième ordre, des *Passeraux*, & dans le 114^{ème} genre, celui de *Motacilla*, selon la XII^{ème} édition corrigée de son *Système de la nature*. L'oiseau y obtient la 34^{ème} place, & pour le distinguer des autres espèces de son genre, il est caractérisé par sa gorge noire, le ventre & la queue rouge, le dos & la tête gris cendrée, & désigné sous le nom rapporté au commencement de cet article. KLEIN dans son histoire des oiseaux, de l'édition allemande, le place dans la 4^{ème} famille, genre 7^{ème}, tribu 3^{ème} *Brustwenzel n*), dans la quelle il lui assigne la seconde place, & le nom de *Schwarzkehlein* (ç. à. d. gorge - noire).

Le *Rossignol* de muraille a cinq pouces trois lignes de long. Le bec en a sept lignes, il est noir, droit, & formé en alène. Les deux narines qui se trouvent à sa base sont ovales & découvertes. La langue est déchiquetée. Les coins de la bouche sont jaunes, & l'iris couleur de noisette. En dessus du corps la couleur principale est gris cendrée, & rouille en dessous. Le sommet ^{*n}) de la tête est blanc; les joues, la gorge & la partie inférieure du cou sont noires, le croupion est rouge, & le dessous du ventre est blanchâtre; Sa queue a deux pouces de long, elle est fourchue, mobile ^o), & composée de douze plumes, dont les deux du milieu sont d'un noir tirant sur le gris, les autres sont rouffes. Les ailes sont composées de dixhuit pennes qui sont de couleur noirbrunâtre, bordées de gris, recouvertes en partie de petites plumes noires en dessus, & de plumes rouffes en dessous. Lorsqu'elles sont pliées, elles s'étendent jusqu'à la moitié de la queue; étendues elles ont huit pouces d'un bout à l'autre. Les jambes sont couvertes de plumes jusqu'au talon, & de la même couleur que le bas ventre, le reste du pied est couvert d'une membrane

ⁿ) Cela signifie à-peu-près un becfigue à poitrail, à plastron, ou à pourpoint. KLEIN avoit compris sous ce nom tous les oiseaux du genre du becfigue, qui ne sont pas les plus proches parents du Rossignol & de la Fauvette, ou des Roitelets. Il avoit distingué cette tribu, à la quelle il avoit donné le nom latin de *Sylvia*, par la poitrine élevée & voutée, colorée différemment du reste du corps, & comme revêtue d'une espèce de pourpoint. (Remarq. du Trad.)

^{*n}) C'est plutôt le front ou le Synciput. (Remarq. du Trad.)

^o) L'auteur a voulu dire sans doute, que l'oiseau remue souvent sa queue; car il n'y a point d'oiseau qui ait la queue immobile. (Remarq. du Trad.)



membrane couleur de plomb. Les pieds sont terminés par quatre doigts séparés, dont trois tournés en avant, un en arrière. Celui du milieu & le postérieur ont la même longueur, s' avoir celle de sept lignes; les deux latéraux sont un peu plus courts, mais tous en général sont garnis d'ongles longs en forme de croissant.

Ce qui vient d'être rapporté du mâle doit à peu de chose près s'entendre aussi de la femelle, à la réserve, que celle-ci est plus grisâtre en dessus, d'un roux plus pâle en dessous, qu'elle a moins de blanc sur le sommet, & qu'elle est moins noire sous la gorge p).

On fait aussi que cet oiseau fournit quelques variétés, dont l'une paroît provenir & tenir du mâle, l'autre de la femelle: la première se distingue par la raie blanche du sommet plus allongée, par le dos qui est de couleur plus cendrée, & par le ventre roux; l'autre se distingue par la poitrine marquée de taches rousses. L'une & l'autre a été distinguée & désignée par un nom particulier q), par Mr. BRISSON, & la dernière a été bien représentée par FRISCH.

Notre Rossignol de muraille, mène un genre de vie semblable à celui des autres oiseaux preneurs de mouches, aux quels il ressemble par la conformation du bec. Il se nourrit de mouches & de vermineux, mais en automne il mange bien aussi des bayes de genévre, de sureau, & d'alizier; c'est pourquoi il peut s'arrêter chez nous fort avant dans l'arrière saison. Il se tient communément près des maisons, quelquefois aussi dans les jardins & les forêts, & fait son nid sous les toits bas, sous des poutres & des murs, & quelquefois dans des arbres creux; mais uniquement dans les endroits, où il croit être en sûreté contre les souris & les rats. Son chant est fort agréable r); il le fait entendre surtout de grand matin & le soir; & le commence, dès le mois de Mars: aussi aime-t-on à l'écouter préférentiellement à d'autres. On lui a donné en allemand différens noms, qui signifient: *Rouge queue de maison*, *Rouge queue de ville*, *Rouge queue de jardin*, *Rouge gorge à gorge noire*, (le nom allemand qui équivaloit à celui de Rouge gorge signifie proprement *Poitrine Rouge*, par conséquent il n'y a point de contradiction. *Remarq. du Trad.*) *Rouge queue à front blanc*. Tous ces noms sont tirés ou de l'endroit qu'il fréquente, ou de sa gorge noire, ou de la bande blanche sur la tête, ou de la poitrine & de la queue rouge. ALBIN, dans le premier volume de son *Histoire naturelle des oiseaux* page 48. a raison de dire, qu'il est d'un naturel farouche, capricieux, & ami de la solitude. C'est pourquoi il ne souffre pas son semblable, dans le voisinage, & il est difficile à nourrir dans les maisons, à moins qu'il n'ait été pris tout jeune. Car les premiers quatre à cinq jours il s'abstient de tout aliment, & pendant un mois entier il cesse de chanter. Par la même raison, il quitte le nid qu'il avoit commencé à construire, aussitôt qu'il s'aperçoit qu'on le guète: il abandonne aussi ses oeufs quand quelqu'un les a touchés: & par la même raison il laisse périr de faim ses jeunes mêmes, ou les jette hors du nid. Les Rossignols de muraille étant donc difficiles à nourrir en cage, on préfère à cet effet les jeunes qui ont à-peu-près dix jours. De cette manière ils s'appriivoisent aisément, & font entendre bientôt non seulement le ramage, qui leur est propre, mais aussi celui des autres oiseaux. Ils chantent aussi de nuit.

Une chose qu'on connoît encore au Rossignol de muraille, c'est qu'il fait deux couvées par an, chacune de six à sept oeufs, qui ont la grosseur de ceux du pinçon, & une couleur verd-clair uniforme. Son nid n'est composé que de matériaux très tendres, de laine, de poils, de plumes, & ce que d'autres oiseaux ne font pas ordinairement; pour la seconde couvée, il se sert de son premier nid.

PLANCHE

p) La femelle diffère assez pour avoir imposé au commencement au célèbre Linné, qui sous le nom de *Motacilla Titys* l'avoit regardée comme une espèce distincte. Celle que j'ai devant moi a le dos gris tirant moins sur le cendré que dans le mâle; le sommet de la tête est de couleur grise uniforme, la gorge tachetée de blanc & de noir terminée par une petite bande ou collier blanc: la poitrine & le ventre roux clair mêlé de blanc, surtout vers en bas. Les plumes des ailes surtout celles du second ordre bordées de blanc sale, ce que je ne trouve pas dans le mâle. (*Remarq. du Trad.*)

q) Comme variété seulement, & non pas comme espèce. (*Remarq. du Trad.*)

r) ZORN dans sa *Petinothéologie* dit, que la femelle chante également. (*Remarq. du Trad.*)



B.R. Dietrich pinx.

Canarien-Vogel.

A.L. Wiering sc. et excud. Norimberg

PLANCHE XVIII.

SERINVS CANARIVS. Briss.

PASSER CANARIVS, Klein. aliorumque.

PASSER CANARIENSIS, Frisch, Albin.

FRINGILLA CANARIA. Linn. Brown.

CANARY - BIRD en anglois.

CANARIEN-VOGEL, CANARIEN-SPERLING en allemand.

LE SERIN DE CANARIE.

Le Serin des Canaries se trouve dans le IX^{me} ordre de l'Ornithologie de Mr. BRISSON, Section 1^{re}, genre 33, qui est celui des moineaux, où il est placé dans la sousdivision des Serins. Il y occupe la 52^{me} place, & pour le distinguer des autres espèces de la même sousdivision il y est désigné par le nom susdit. Le Chevalier de LINNE lui donne sa place dans le VI^{me} ordre, qui est celui des Passereaux, dans le genre du Pinçon, dont il est la 23^{me} espèce. Il porte le surnom que nous venons de rapporter, & est distingué des autres espèces du même genre par le corps jaune blanchâtre, & les plumes des ailes & de la queue de couleur verdâtre. KLEIN l'a rangé dans sa IV^{me} famille; X^{eme} genre, qui est celui des moineaux; 1^{ere} tribu, moineaux de champ. Il y est le troisième en nombre, & porte le nom de Moineau des Canaries.

La longueur du Serin est de cinq pouces trois lignes. Le bec est de quatre lignes & demie, sa couleur est blanche, sa forme conique terminée par une pointe courte & forte. L'une & l'autre des mandibules sont droites, & n'ont aucune échancrure. Quoique dans aucun oiseau la couleur du plumage ne soit plus inconstante, que dans celui-ci s), l'ordinaire cependant est, que la partie de la plume, autant qu'elle est couverte par la plume voisine, est de couleur blanchâtre, la partie qui paroît au contraire est jaune citron; avec la différence toutesfois, que sur le dos cette couleur est plus foncée, & plus pâle & tirant sur le verd du côté du ventre. Les plumes des ailes & de la queue sont de couleur blanchâtre vers la base & en dessous, en dessus au contraire & tout à l'entour au bord elles tirent sur le verd. Les ailes pliées atteignent le milieu de la queue, étendues elles ont huit pouces d'un bout à l'autre. La mesure de la queue est de deux pouces & six lignes; elle est composée de douze plumes & de forme fourchue. Les pieds sont garnis de plumes jusqu'à la genouillère, de couleur blanc rougeâtre. Les quatre doigts sont séparés, trois sont tournés en avant, & un en arrière. Celui du milieu est le plus long, & de la longueur de huit lignes, les deux latéraux & le postérieur sont plus petits & de longueur égale.

K 2

Le

s) Car il y en a de blands, jaune - pâle, jaune - citron, jaune - doré, (ou jonquille des amateurs françois) degris, de panachés, &c. (les principales couleurs comprises par l'auteur dans cet &c. sont l'agathe, & l'isabelle. Remarq. du Trad.) Mais souvent aussi la queue & le ventre sont d'une couleur tout-à-fait différente du reste du corps. Quelquesfois aussi il y a de la variété dans la couleur du bec, de l'iris, & des pieds.



Le mâle se distingue de la femelle par une couleur plus vive, par la tache jaune de la gorge, nommée la fève, qui est plus grande & descend plus bas, que dans la femelle: il est plus haut sur jambes, sa tête est plus élevée & plus allongée: mais communément on le distingue par son chant. Pendant qu' il est jeune on le connoît à son gazouillement, qui va en augmentant de jour en jour, tandis que la femelle n' en fait entendre absolument rien avant l' âge d' un an.

Les vieux serins se reconnoissent d' avec les jeunes par la couleur plus foncée & plus vive, les pieds rudes & tirant sur le noir, (ce qui s' observe surtout dans les serins gris): puis aussi par l' ergot ou l' ongle plus long. Enfin les vieux mâles diffèrent des jeunes par le chant plus fort & plus soutenu; les vieilles femelles gazouillent plus fortement que les jeunes.

Les Serins ne sont pas à la vérité indigènes de nos climats, mais viennent originellement des îles Canaries, d' où ils ont aussi été dénommés dans toutes les langues. Malgré cela, grâces aux couvées artificielles qu' on leur fait faire, ils ont été comme naturalisés chez nous, ainsi, que par toute l' Europe, de manière qu' on peut les ranger avec raison parmi les oiseaux privés de notre pays. Car aujourd' hui on ne rencontrera plus guères de Serins venant des îles Canaries même, mais tous ont été élevés en Europe. Aussi n' y a - t - on rien perdu, ceux d' Europe ne le cedant en rien pour la beauté & le chant aux oiseaux natifs de ces îles; chose dont il ne faut pas s' étonner, les couvées artificielles ayant produit les plus belles variétés dans leur genre.

C' est pour cette raison que je le juge d' autant plus nécessaire de donner une relation succincte, de tout ce qui doit être observé en tout tems, soit pendant l' incubation, soit autrement, tant à l' égard des jeunes, que par rapport aux vieux. Je me servirai pour cet effet des meilleurs auteurs qui ont écrit sur cette matière, parmi les quels *le nouveau traité des Serins de Canarie par M. I. C. HERVIEUX DE CHANTELOUP* ^{t)} mérite assurément une place distinguée.

Avant d' accoupler les Serins, il s' agit de choisir un bon mâle & une bonne femelle, & de les familiariser l' un avec l' autre. Il faudra donc savoir premièrement bien distinguer le mâle d' avec la femelle, afin que soit par sa propre ignorance, soit par la mauvaise foi d' un autre, on n' enferme pas deux mâles ou deux femelles dans la même cage, & qu' on ne s' expose pas par là à la risée des connoisseurs & à des pertes réelles. On s' attachera donc à bien étudier les caractères exposés ci - dessus, pour apprendre à distinguer le sexe. Une seconde attention qu' il faut avoir pour réussir, c' est de savoir choisir les plus propres pour la propagation tant parmi les mâles que parmi les femelles.

Les meilleurs sont ceux qui sont gais & familiers, qui par conséquent ne sont ni farouches ni paresseux. On dit, que les plus propres sont les gris, puisqu' ils s' appariant volontiers, font des pontes fréquentes, ont grand soin de leurs petits, & se rendant mutuellement tous les services & secours possibles: mais on n' en obtient pas la plus belle race. Les panachés ou contraire appareillés avec ceux de couleur uniforme engendrent des jeunes d' une beauté particulière. Il ne faut pas en être étonné, les jeunes tenant tant du père que de la mère. Mais c' est précisément par cette raison, qu' on est en état de produire les plus belles variétés; si tant est qu' on a bien su faire son choix.

Pour avoir trois ou quatre couvées par an, dont aucune n' ait rien à risquer du froid, on appaie les Serins qu' on a choisis vers la fin du mois de Mars ou au commencement d' Avril. On les met à cet effet dans une cage commode, où on les laisse, jusqu' à ce qu' ils commencent à s' aimer, c. à. d. à se becqueter, ce qui ordinairement arrive au bout de huit jours. Alors on les met dans une cabane faite exprès, dont la structure peut être la

t) Ce petit traité a paru à Paris 1709. in 12^{mo}. et a été reimprimé en 1713. la deuxième édition, autant que je le fais, est de 1766. HALLER l' appelle un joli petit livre. On en a une traduction allemande, qui pourroit être meilleure.



la suivante. Il faut qu'elle soit, spacieuse, assez haute, de la forme d'un quarré allongé : le plancher ou la base sera de bois de chêne ou de noyer, les côtés & le dessus seront de fil d'archal. Au bas il y aura un tiroir qu'on puisse tirer par derrière, dans le quel se trouveront les augets pour la nourriture. A une certaine hauteur on mettra des juchoirs faits de branches de sureau dont on aura ôté la moëlle & l'écorce. Cette cabane sera exposée au levant, & pourvue de petits paniers d'ozier, ou reseaux. Il faut aussi leur donner des matériaux pour faire le nid, tels que la bourre de cerf ^{u)} du chien dent sec & propre, du foin delié séché au soleil pour lui faire perdre son odeur forte, & un peu de mousse : mais on évitera de leur donner du coton ou d'autres matériaux qui sont en usage. Leur nourriture sera composée de douze parties de graine de navette, deux parties de millet, une partie d'alpiste, & autant de graine de chenuevis. On y ajoutera quelquesfois un petit morceau d'échaudé ou de biscuit dur, & les huit premiers jours de la graine de laitue. Pour boisson on leur donne de l'eau fraîche.

La cabane étant préparée de la manière mentionnée, on y met les deux oiseaux, auxquels on rogne auparavant les ongles jusqu'à la moitié, au cas qu'ils fussent trop longs, afin qu'ils n'en puissent endommager ni les oeufs ni les petits. On leur renouvelle l'eau & les aliments tous les jours, ou des deux jours l'un, selon la qualité de la dernière ou le degré de chaleur. En même tems il faut avoir toute sorte d'attentions pour eux, venir à leur secours quand ils se trouvent dans quelque embarras, nettoyer la cabane, & ôter les oeufs aussitôt qu'ils ont été pondus, ou qu'on les observe pour la première fois. On les ferre dans une boîte remplie de fable fin, afin qu'ils ne soient pas endommagés, en attendant qu'on les fasse couvrir ensemble avec les autres. Mais à leur place il en faut substituer d'autres faits d'ivoire. Aussitôt que la femelle cesse de pondre on lui rend ses oeufs, & c'est alors qu'il faut avoir soin qu'elle ait sa nourriture à portée, afin qu'elle n'ait pas besoin de s'éloigner trop de ses oeufs. On observera aussi la femelle, pour s'assurer si elle est assidue à couvrir. Si elle ne l'étoit pas, comme c'est quelquesfois le cas dans de jeunes femelles, il faut donner les oeufs à d'autres couveuses qui le soient depuis un tems à-peu-près pareil. Mais si ce sont des femelles qui auparavant ont bien couvé, & qui ne s'y refusent que pour le moment, il faut voir si ce n'est pas par hazard parceque les oeufs sont clairs, chose dont les vieilles femelles s'aperçoivent souvent, les abandonnant alors, ou les mangeant, ou les jettant hors du nid, s'ils sont gâtés absolument, & détruisant le nid. Voit-on au contraire que la couveuse s'y prend comme il faut, alors il faut examiner au bout de six à sept jours, si tous les oeufs sont féconds, ou s'il y en a quelques uns de clairs. Si regardés contre la flamme d'une bougie ils sont opaques, & si on sent au poids qu'ils sont devenus plus pesants, c'est une marque bien sûre, qu'ils sont fécondés : mais ceux qui après ce tems sont encore clairs, le seront certainement pour toujours, & il n'y a qu'à les jeter.

Si un oeuf ne se trouvoit pas assez couvert & qu'il se refroidît, il faut le changer de place & le mettre au milieu. Au bout de treize jours accomplis, les jeunes éclosent ordinairement, quoique cela puisse arriver quelquesfois un jour plutôt ou plus tard, selon que la chaleur ou le froid accélère ou retarde le développement du germe. La veille de la naissance il faut nettoyer la cabane & renouveler en outre la nourriture & l'eau. Cette nourriture peut consister pour lors en la brioche rassise & chapelée, ou en un petit morceau d'échaudé ou de biscuit dur, quand on peut en avoir, & on ne leur en donnera pas de nouveau à moins que le premier n'ait été consumé. On peut aussi leur composer une nourriture de leurs graines ordinaires qu'on aura fait bouillir auparavant & lavés dans de nouvelle eau; on y mêlera le quart d'un oeuf dur, & un morceau de brioche trempé dans l'eau & pressé entre les mains. Par fois on ajoutera quelque verdure, selon la saison, telle que le fenéon, la morgeline, le plaintain, le coeur de laitue pommée. On leur présentera tout cela dans une petite écuelle, trois fois par jour, principalement dans la saison des grandes cha-

u) HERVIEUX cependant, dont l'auteur recommande le traité, n'approuve pas l'usage du poil de cerf, ou du moins il ne le permet qu'avec certaines restrictions. Chap. VI.



chaleurs où tout se gâte bien vite, surtout la verdure. Quelquesfois on peut aussi leur donner séparément un peu de graine d'oeillet & d'argentine. Il est nécessaire en outre, quand il fait chaud, de leur donner de l'eau fraîche quelquesfois par jour, & d'y mettre de tems en tems un peu de racine de réglisse, pour rendre l'eau plus agréable & plus rafraichissante. Les jeunes serins étant éclos, ou les abandonne aux soins de leurs parents, jusqu'au dixième, douzième ou quatorzième jour, selon qu'on voit qu'ils profitent, & qu'ils se couvrent de plumes: alors on les retire du nid, & cela pendant la nuit, ainsi qu'ALBIN le conseille, afin que les père & mère ne s'effrayent & ne s'effarouchent pas. On les met à part dans un petit panier couvert, rempli de mousse, de coton haché, & d'autres substances tendres & échauffantes. C'est là qu'on les tient bien chaudement, car en les touchant seulement d'une main froide ils peuvent être attaqués de spasmes. On les nourrit à la brochette, en leur donnant pour aliment un mélange de petit miettes d'une brioche rassise, d'un peu de biscuit dur pulvérisé, & d'un jaune d'oeuf d'ur & haché qui fera la moitié de tout le mélange, lequel sera pétri & réduit en une pâte molle au moyen d'un peu d'eau, ou bien d'une émulsion de graines de chenuevis, quand les oiseaux sont malades. Après les trois premiers jours on ajoutera un peu de graine de navette entière, qu'on aura fait cuire dans de l'eau à deux bouillons, & lavée dans de l'eau fraîche. On y mettra aussi une amande douce pélée & concassée, & au cas que les oiseaux foyent échauffés, un peu de morgeline, dont la composition doit être renouvelée deux fois chaque jour, pendant le tems des grandes chaleurs. Cette nourriture est présentée aux oiseaux depuis le six ou sept heures du matin, jusqu'à huit ou neuf heures du soir, en mettant entre chaque fois un intervalle d'une heure & demie. On se servira pour cet effet d'une plume taillée en pointe, ou, ce qui vaut mieux, d'une brochette arrondie et creusée en gouttière. Chaque fois on leur donnera quatre becquées. Quand par vos soins les jeunes seront parvenus au point de pouvoir manger seuls; ce qui arrivera au bout de vingt quatre jours à ceux qui sont forts, & au bout de trente, à ceux qui sont tendres & délicats, comme p. e. dans les jaunes, vous les mettrez alors dans une cage sans juchoirs, dont vous aurez garni le plancher de mousse sèche & de foin. On les nourrit alors pendant le premier mois de graine de chenuevis concassée, de jaune d'oeuf dur & haché, de petites miettes de biscuit ou de brioche rassise broyée, & d'un peu d'herbe tendre de morgeline. Tout cela leur est mis séparément dans la cage avec de l'eau où on trempera un peu de racine de réglisse. On leur jettera aussi un peu de graine de navette sèche. Lorsqu'enfin ils sont devenus assez forts, vous les sevrerez aussi de cette nourriture, en ne leur donnant plus que les alimens ordinaires. Les mâles qu'on a l'intention d'instruire au flageolet doivent être mis à part dès les premiers quinze jours qu'ils auront commencé à manger seuls, & aussitôt que par leur gazouillement on se sera assuré que ce sont des mâles. On les mettra séparément dans des cages, qui pendant les premiers huit jours seront recouvertes & obscurcies au moyen d'une simple toile d'un tissu peu serré, & après ce tems par un drap plus épais de couleur rouge ou verte. On les suspendra dans des chambres à l'écart, loin du bruit, où il n'y ait point d'autres oiseaux. Il n'y en aura qu'un seul dans chaque chambre, ou du moins un très petit nombre, & dans ce cas chaque oiseau aura sa cage à lui. Tout les deux jours on leur donnera au soir, à la lueur d'une bougie, leur nourriture ordinaire, & en même tems on leur donnera cinq à six leçons par jour, sur un flageolet qui ne rende pas des sons trop hauts. On choisit ordinairement des ariettes & des marches, comme Hervieux en a donné des exemples. Il suffit aussi que chaque élève en apprenne une de chaque espèce. Quelques uns retiennent fort vite leurs leçons, & les font déjà entendre au bout de quelques mois: d'autres au contraire sont beaucoup plus lents à les comprendre, et ne se font pas entendre avant six mois. On doit donc sentir aisément qu'il faut beaucoup de patience pour les enseigner. Aussi ne doit-on pas cesser ses leçons à moins qu'ils n'ayent parfaitement appris leur air. Si dans le nombre des mâles il y en avoit quelques-uns, des quels d'avance on ne se promet pas beaucoup, ou qu'on n'eût pas le tems de leur donner leçon, on n'a qu'à les mettre en apprentissage auprès des vieux oiseaux qui chantent bien, des quels ils apprendront avec le tems à chanter assez joliment.

De même que par les couvées artificielles on peut avoir des petits d'un mâle & d'une femelle de Serin de Canarie, il y a aussi moyen d'obtenir des bâtards de Serins mâles ou femelles



femelles appariées avec l'autre sexe d'un oiseau, qui soit d'un genre différent mais voisin, tel que le Chardonneret, la Linotte, le Bruant, le Bouvreuil. Les plus communs de ces bâtards sont ceux qui proviennent d'un chardonneret, parceque surpassant les autres en beauté du plumage & du chant, on les choisit préférentiellement. On se sert du même oiseau, quand on a des oeufs ou des jeunes Serins de Canarie, qui ont été abandonnés de leur mère, ou qui l'ont perdue par la mort, ou par quelque maladie. C'est alors que le Chardonneret doit achever de couvrir les oeufs, ou de soigner les petits. Mais il faut avoir l'attention de choisir une femelle chardonneret dont les oeufs soient couvés à-peu-près au même degré, ou dont les jeunes soient d'un âge à-peu-près pareil à celui des Serins. Si on avoit une femelle de Canarie même, ou qu'on en scût une ailleurs, à la quelle les oeufs puissent être donnés, elle seroit préférable: ou bien, si vos jeunes serins étoient déjà assez gros, pour pouvoir se passer de mère, vous les éleveriez à la brochette. Au cas que les jeunes oiseaux soient encore d'un âge trop tendre, & qu'ils aient encore fort besoin d'être couverts & chauffés par une femelle dont on ne puisse rencontrer aucune, il faut leur donner pour compagnons de jeunes moineaux du même âge, qui ayant plus de chaleur les échaufferont suffisamment. On peut en outre, si il feroit bien froid, les couvrir d'un morceau de peau tendre d'agneau, principalement la nuit.

Voilà à-peu-près ce qu'on a à observer quand on veut élever des Serins. Il nous reste à parler en peu de mots, de leurs maladies, & de la manière de les guérir.

Il y a plusieurs maladies aux quels les Serins sont sujets, soit qu'ils couvent, soit qu'ils ne couvent pas. En voici les plus communes. Pendant l'incubation le mâle tombe communément malade pour avoir pris trop de nourriture succulente & échauffante, ou bien aussi pour couvrir avec trop d'ardeur. Dans l'un & l'autre cas il convient généralement, que le mâle soit retiré incontinent & qu'il soit mis dans une cage à part, pour pouvoir se rétablir par le repos. En outre il faut dans le premier cas lui donner des alimens moins nourrissans, p. e. de la graine de navette: et dans le second, il faudra indépendamment du repos, chercher à rétablir ses forces par la chaleur par une bonne nourriture, & en l'arrosant de vin. S'il tomboit malade de rechef, après avoir été rendu à sa femelle, ce seroit une marque qu'il est trop foible, et il ne faudroit plus s'en servir à l'avenir, pour la couvée.

La femelle n'est pas moins sujette à des infirmités pendant le tems qu'elle couve. Souvent elle a de la peine à pondre, surtout quand c'est une primipare, et que le conduit des oeufs est trop resserré. On voit donc que son corps se gonfle subitement dans le tems où elle devroit pondre, que quelquesfois elle tombe comme en défaillance, & que manquant de force, elle se couche sur le plancher ou sur le sable de sa cabane. Elle mourroit même, si on ne venoit pas à tems à son secours. Aussitôt donc, qu'on s'en aperçoit, il faut mettre la femelle dans l'infirmerie ^{*)}, amollir & élargir les conduits à l'aide d'une goutte d'huile d'amandes douces appliquée à l'orifice avec la tête d'une grosse épingle. Si cela n'étoit pas suffisant, il lui faudroit faire avaler une goutte de cette même huile, et au cas que ce remède fût également infructueux, il faudroit tâcher de lui donner des forces par la chaleur, en l'arrosant de vin blanc, ou en lui en donnant intérieurement quelques gouttes avec du sucre, & des alimens bien nourrissans. Souvent aussi il arrive à la femelle de suer pendant l'incubation, chose fort dangereuse non seulement pour elle, mais surtout aussi pour ses petits. Il faut donc, aussitôt qu'on s'en aperçoit, lui laver le ventre avec de l'eau salée, pendant un demi quart d'heure, & la rincer ensuite avec

L 2

de

*) Cette infirmerie est une cage un peu spacieuse, doublée dessus, au fond, & des deux côtés d'une serge épaisse rouge ou verte, pour quelle reçoive le soleil par le devant. On mettra sur le plancher du foin & de la mousse, ainsi que la nourriture et la boisson. Il faut aussi, ce qui est bien à remarquer, en ôter les juchoirs. (Hervieux ne dit rien de ce dernier article; mais il dit, qu'il faut que les barreaux de la cage soient faits d'osier, et non pas de fil d'archal, parceque celui-ci est toujours froid & humide.

(Note du trad.)



de l'eau douce, & la secher au soleil ou près du feu. Ou bien on peut d'après le conseil d'Hervieux, qui en a fait l'expérience lui même, frotter frequemment la tête de l'oiseau, avec de l'os de Seche réduit en poudre; ce qui convient surtout dans le cas où l'oiseau sue principalement à la tête, & fait cesser la sueur bien vite. Mais si l'un & l'autre de ces remèdes étoient sans effet, on ne doit pas tarder à lui ôter les petits, & de les donner à une autre femelle, surtout s'ils sont encore bien jeunes.

La même chose doit être observée, quand la femelle est trop foible pour pouvoir nourrir ses petits, ou bien quand elle refuse de les nourrir. Quelquesfois aussi la femelle privée de son mâle, soit par maladie, soit par la mort, s'afflige tellement, que si elle ne meurt pas, elle tombe du moins malade. Il faut donc, aussitôt qu'on s'en aperçoit, lui donner incessamment un autre mâle, surtout quand c'est dans le tems de la ponte: mais en tout autre tems, si elle ne s'afflige pas beaucoup, & quelle a déjà achevé l'incubation, cela peut souffrir un délai souvent de huit jours; cependant il faut montrer de tems à autre le malade à sa femelle, ou mettre la cage qui l'enferme au milieu de la cabane.

Il y a aussi des accidens fâcheux qui arrivent aux oeufs & aux jeunes. Nous en parlerions plus amplement, si nous ne nous étions pas proposés de ne pas être longs. D'ailleurs nous en avons déjà parlé en grande partie, en faisant mention en même tems de la manière d'y remédier. Nous nous contenterons par conséquent d'avertir, qu'ils ont été pondus, & qu'il leur en faut substituer d'autres d'yvoire. On les conservera dans une boile, couchés sur du sable fin, & couverts de mousse, aussi longtems que dure la ponte: après quoi on les remettra, et cela de grand matin. Quand on voit que le mâle pourroit endommager les oeufs ou les petits, il faut l'enfermer dans une petite cage, que l'on mettra au milieu de la cabane, aussi longtems qu'il aura quelque chose à craindre de sa part.

Le plancher de la cabane sera couvert de sable fin, & avant que de la curer, il faut soigneusement regarder partout & examiner, s'il n'y a pas quelque oeuf de caché quelque part, qui pourroit être cassé. Quand on en trouve, il faut le prendre avec précaution et le serrer avec les autres. Pareillement les oeufs que la mère ne veut pas couvrir & les petits que la mère ne veut ou ne peut pas nourrir, doivent être retirés du nid, & être confiés à une autre femelle, et seront traités en général de la manière expliquée ci-dessus. Au cas que la mère arrachât à ses petits, d'une manière barbare, les plumes qui commencent à poindre, ce qui arrive quelquesfois, il faudra les mettre ensemble avec le nid dans une petite cage, dont les barreaux soient assez éloignés l'un de l'autre, et les placer au milieu de la cabane. C'est ce qu'on fera aussitôt qu'on s'apercevra de la mauvaise habitude de la mère, & sans l'empêcher de nourrir ses petits, on lui ôtera les moyens de leur faire du mal.

Mais les Serins de Canarie n'étant pas seulement sujets à des maladies pendant l'incubation, mais en tout tems, il ne nous semble pas être hors de propos d'en parler aussi en deux mots seulement, et en nous bornant uniquement à celles qui sont les plus ordinaires, et aux remèdes les plus en usage.

La première maladie, la plus commune, & la plus naturelle est la muë. Les jeunes comme les adultes l'ont à essuyer, & c'est un accident inséparable pour ainsi dire, de la nature non seulement des Serins, mais de tous les oiseaux en général. Plus les jeunes oiseaux sont vigoureux, moins avancée que sera l'arrière-saison, et plus chaud, que par conséquent il fera encore, mieux ils se tireront d'affaire. Plus au contraire ils sont foibles encore, & plus il fait déjà froid, plus la muë le leur fera de peine. La manière dont il faut traiter les oiseaux en muë consiste en ce que l'on les met dans l'infirmerie, qu'on les tient chaudement, & qu'on les fortifie par toute sorte de nourriture qu'ils aiment le plus, surtout la graine d'argentine et de plantain, qu'on leur donnera dans un auget particulier; quelquesfois par quelques gouttes de vin avec un peu de sucre ou de biscuit, et en les arrosant extérieurement de quelques gouttes de vin blanc.

Tab. XIX. *Le Pinçon à ailes et queue noires.*



B.R. Dietrich pinx.

Finck

A.L. Wirsing Sc. et excud. Norimberg

Tab.XX. La Mésange à longue queue.



B.R. Dietzschin pinx.

Schwanzmaise.

A.L. Wirsing Sc. et aq. u. d. Norimberg







B.R. Dietzsch pinx.

A.L. Wirring sc. et exc. Norimberg.

Kraut-Perche





B.R. Dietrich pinx.

Berg-Amstel.

A.L. Wiering sc. et excid. Norimberg.

Tab XXV. *Le Rouge-gorge.*



B.R. Dietzschin pinx.

Rothkehlchen

A.L. Wivling Sc. et excud. Norimberg.



See-Lerche.


Al. Winsing excudit Norimberg.





Blauschnäbliche Ente.

A.L. Winring Sc. et excudit Norimberg



Tab. XXIX. *Le Serin de Canarie.*



Canarien Vogel.

A. L. Wiering scet ex Norimberg

Tab. XXX. *Le Chardonneret.*



Stigeliz.

A.L. Wörning excudit Norimberg.



Emmerling...

A. J. Wirsing excudit Norimbergae

Tab. XXXII. *La Mésange bleue.*




Blaumaise.

A. L. Wirsing excudit Norimberg



Trappez.

A. T. Wöhring, Sculp. et. excud. Norimberg.



Tab. XXXIV. *Le petit pluvier doré.*



Kleiner Braach Vogel .


Ad Wirsing ex audit Norimberg,

1 Schuh



Kübitz

A. L. Winking exaudite Norimberg





Austermann.

A. J. Wirsing excudit Norimberg



A. J. Wirsing excud. Norimberg

Der schwarz u. weisbunte Specht.

Tab. XXXVIII. *Le Coucou gris.*




Grauer Kukuk.

A. L. Wiering excud. Norimberg



Brauner Kukuk.

A.L.Wirsing excud. Norimberg.





Al. Wirsing excud. Norimberg

Ein junger Kukuk.

Zoll

1/2 Schu.

Tab.XLI. *Le petit Toucan.*



Der kleine Toucan.

AL. Wirsing excud. Norimberg.

Zoll

1 Schuh




Tab.XLIII. *Le grand Toucan.*



Groszer Toucan.

A.L. Wirsing excud. Norimberg.





Tab. XLIII. Le Perroquet gris-cendré.



Der aschgraue Papageij.

A.L. Wirsing excud. Norimberg.



Tab. XLIV. *Le Martin Pêcheur du détroit de Magellan.*



A. L. Wirsing excudit Norimberg

Der Eißvogel aus der Magellanischen Straafse.

Tab. XLV. *L'Aigle doré.*




Gold-Adler.

A. L. Wiering excudit Norimberg.



A. L. Wiering excud. Norimberg

Der Adler mit weißen Schwanze,



Tab. XLVII. *Le Balbuzard.*



Fisch-Aar.

A.J. Wirsing excud. Norimberg.



Der Milan


A.L. Wirsing excud. Norimberg.





Kirch-Eule.

A.L. Wirving excud. Norimberg.



Tab. I. *Le grand Duc.*




Uhu


A.L. Wirsing excud. Norimberg.

Zu

2 Schu.







39088010324788